

MATERIA MEDICA

S E U

*Cognitionis medicamentorum simplicium epicrisis
analytica* Auctore F. SWEDIAUR M. D.

Prima Edizione Italiana.

La Materia Medica è una di quelle scienze, le quali non si debbono nè anche per un momento perdere di vista, tanto è rapido lo sviluppo che in quest'epoca ricevono. Chi non conosce le scoperte fatte da qualche anno in quà in questo interessante ramo della medicina, non può far a meno di non riconoscersi molto indietro nella Scienza. Nel tempo stesso il linguaggio sistematico, il più gran passo che si sia fatto nelle scienze naturali nel caduto secolo, non ancora portata avea tutta la sua luce nella Materia Medica. Questa scienza era quasi inceppata dalla molteplicità ed equivocità de' nomi officinali, e dall'incongruenza e varietà de' nomi vernacoli presso le varie nazioni.

Il celebre Swediaur, noto pe' suoi talenti, istruito di tutte le scoperte e notizie letterarie dell'Europa, ha pubblicato ultimamente in Parigi un compendio di Materia Medica, nel quale tutti i medicinali vegetabili ed animali si trovano disposti secondo l'ordine sistematico di Linneo, e i minerali e le loro preparazioni coi nomi e col metodo della nomenclatura Chimica Francese. Lo spirito sistematico, la profondità delle viste, l'estensione delle cognizioni in ogni genere, ed il più fino criterio sono le doti che accompagnano quest'Opera. L'aforistico e conciso linguaggio non rende meno intera l'istoria particolare d'ogni so-

50381/B

Per conservarsi la proprietà di quest'opera
l'Editore la mette sotto la protezione della
legge, dichiarando riconoscere per legittime,
solo quelle copie segnate come qui sotto.
Ne sono state consegnate alla Biblioteca na-
zionale due copie, secondo la prescrizione
della stessa legge.

MATERIA MEDICA

SEU

COGNITIONIS MEDICAMENTORUM
SIMPLICIUM

EPICRISIS ANALYTICA

AUCTORE

F. SWEDIAUR M. D.

EDITIO PRIMA ITALICA

Additis Italis simplicium nominibus

VOL. I.



MEDIOLANI 1801

Ex Typographia Mediolanensi

D. Trigi Langerandi



EDITORIS MONITUM.

QUIBUS fuerim motus rationibus, ut nuper Parisiis editum opus, *Italicæ quoque recudi curassem*, sane quisque facile videbit, si attente perpendet, quanta sit necessitas systematicæ methodi in tractanda *Materia Medica*. Multivaga *Officinalia simplicium nomina* dubiam, efficiebant eorum historiam, difficilem cognitionem. Dubium difficultatemque augebat diversitas nominum in variis viventibus linguis recepta. Cl. Auctor labore facile longo ac fastidii pleno vulgaria nomina, et sæpe penitus diversa ad systematica redegit. *Italica* omiserat, omissioni consultum ac prima editione, quo fieri potuit exactius et locupletius. Si quæ attamen inveniuntur substantiæ sinonimo *Italico* carentes, non negligentiae, sed linguae defectui vel substantiarum recentiori inventioni tribuendum.

Minoralibus non vulgo receptissima, non systematica Gallica, sed quæ Cl. Brugnatellius juxta suam novissimam Chemicæ nomenclaturæ reformationem hisce substantiis apposuit, adjunxi. Non quod crediderim hanc nomenclaturam Gallica præstare, hac usus sum: non meum est tantum proferre judicium, tantamque litem componere; sed ratus commodius utiliusque fore hac uti, ut uno intuitu lectores, non modo eam cognoscere, sed cum Gallica quoque conferre valeant. Festinanter hæc redegei, sic ut facile credam mea licubierasse, quæ si inveneritis errata benigni lectores corrigito. Valete.

CONSPECTUS.

SÆCULUM fere dimidum elapsum est, quo prima Materiae LINÆANÆ editio prodiit, in qua auctor lingua eleganti et concisa qualitates et virtutes Vegetabilium medicas exposuit. Multæ plautæ, tunc temporis obscuræ, hodie bene cognitæ et exacte descriptæ sunt: Multa simplicia æque ac præparata, tunc penitus ignota, hodie analysi chemica exactiori stabilita, et non pauca demum quoad usum et præparationem medicamentorum a Botanicis, Chemicis, et Medicis practicis aut nova inventa aut antiqua correctæ fuerunt. Hæc pluribus abhinc annis sedulo et attente in diversis Europæ regionibus notare cœpi, sicque gradatim opusculum natum fuit, in quo fixa a vagis, vera a falsis, dubia a certis acutius distinguerentur, verbo, quod EPICRISIN ANALYTICAM cognitionis omnium quæ ab antiquis ad hodierna usque tempora circa qualitates, vires, et usum Medicamentorum simpliciorum, vegetabilium non solum et animalium, sed et mineralium vere cognita essent, fideliter lingua concisa et magis severe exacta quam quidem hactenus factum fuit, sub uno intuitu exhiberet. Parvulum hunc librum, ultima quantum licuit lima politum, hic publico juni tradō.

Quod nomenclaturam spectat, Medicorum Europæ hodie vix ullum Botanices aut Chemiæ adeo ignarum credo, ut non mecum ardentem desideret, nomina plantarum æque ac præparatorum chemicorum pharmaceutica, vaga et sæpe absurda, ex Medicina et scriptis medicis expungere, eorumque loco magis propria et fixa substituere. Idcirco pro vegetabilibus et animalibus nomina Linnæi systematica, pro mineralibus præparatisque chemicopharmaceuticis nomenclaturam elegantem et omnino philosophicam, ab eximiis Galliæ chemicis nuper confectam, lubens adoptavi; nullusque pronunciare hæsito, essentialem versus perfectionem scientiæ medicæ gradum poni ab epocha, qua practici ac scriptores medici terminos in arte usitatos vagos relinquere, et linguam magis fixam et rationalem in medicinam introducere cœperint.

Medici qui hodierna, in Historia naturali Physica et Chemia inventa spernunt et progressus in scientiis hisce, medicinæ vere auxiliatricibus, recenter factos ad Medicinam adplicare recusant, limites arti ponere, ejusque perfectionem minime curare videntur.

Ordinem in vegetabilibus et animalibus alphabeticum, utpote practico commodissimum; in mineralibus, systematicum cum alphabetico junctum, secutus sum.

Methodo usus sum conformi eaque compendiosissima, plantam unamquamque sub sequen-

ribus titulis complectens, ordine eodem semper positis, scilicet:

1. Nomen Linnæi systematicum. 2. Pars plantæ usitata. 3. Classis et Ordo sub quibus in systemate Linnæano occurrit. 4. Duratio plantæ et locus ubi naturaliter crescit. 5. Nomen pharmaceuticum s. officinale vulgo usitatum, subjuncto ubique nomine Gallico, Germanico, Anglico, et, ubi illud a latino Linnæano differt, Hispanico. 6. Qualitates physicæ, nec non principium **ACTIVUM** in quo præcipua plantæ virtus residet, ubicumque illud analysi chemica exacta determinatum novî. 7. Virtus medica. 8. Usus internus et externus; nec non Forma sub qua communiter propinatur. 9. Dosis. 10. Præparata.

Qualitates physicæ sunt attributa sensibus obvia, ut odor, sapor etc.; Chemia vero analysi principia constitutiva corporum revelat. Ubi qualitates hæ incertæ aut mihi saltem incognitæ erant, nihil potius quam vaga asserere malui.

Quod virtutes seu vires simplicium spectat, in iis admittendis circumspectiorem multo et difficiliorem me esse decuit, quam quidem hactenus generaliter a plurimis materiæ medicæ scriptoribus factum fuit: in hisce designandis quoque vocabula vaga, impropria, aut absurda omnia rejeci; fixis solum et propriis memet adstringens.

VIII

Erunt tamen fortassis quidam qui me in admittendo et numero et viribus plantarum non satis severum fuisse objicient; sed hos meminisse quæso, me non pro solis Medicis magnarum Europæ urbium, ubi optima quæque et efficacissima facile comparantur, sed pro practicis variorum climatum et regionum et qui sæpe in locis a Metropoli longe dissitis, praxin exercent, librum conscripsisse. Hos non raro, præcipue dum optima ad manus non sunt, aut cum pauperibus consulendum est, plantas adhibere juvat quæ aut facilius aut meliori prætio comparantur, etsi virtute paulo inferiori gaudentes: Præterea pro varietate climatum et regionum latitudinem quandam suppellectilis medicæ commodam non solum sed et necessariam esse nemo qui peregrinatus est, inficias ibit.

Cæterum, quod virtutes plantarum in genere spectat, hic pauca quædam observare placet.

Plures in Europa, præprimis in Anglia, medicos novi, qui usum vegetabilium negligunt, plantasque omnes fere, tribus quatuorve solum exceptis, ex praxi medica sine ulla artis jactura exulare posse persuasum habent. Id quidem, re propius investigata, non miror. Multæ plantæ medicinales hodie, in pluribus regionibus prope Metropolim, præcipue lucri causa, in campis aut hortis coluntur, fumigato optime et irrigato in dies solo: Giganteæ sic nascuntur soboles, splendidissima florum

varietate superbientes, sed virtute debiles aut effictæ omnino et oleracæ. Quid mirum si Medicus tales plantas in praxi adhibitas inefficaces inveniat, illasque ut inertes ex thesauro pharmaceutico sine damno proscribendas esse existimet; præprimis si Botanices ignarus easdem in locis natalibus ipse nunquam vidit. Judicium sane longe diversum ferret si easdem plantas in regionibus calidis, in Alpibus aut in locis demum quibuscumque, ubi natura illas sponte producit, proprio anni tempore decerptas examinasset. Hoc quidem adeo verum est ut feles noverim, quæ Valerianam officinalem sibi adeo amicam ut illam continua frictione brevi destruant, æstivo tempore dum effoeta radix est, negligenter prætereant et ne quidem intueri dignentur.

Quæ circa vires plurium vegetabilium ratione anni temporis, regionis et soli natalis mox observavi, id quoque valet ratione curæ in iisdem exsiccandis et conservandis adhibitæ. Si plantæ cæterum efficacissimæ ex solo nativo, proprio anni tempore collectæ, in sole male siccantur: vel etiam in umbra sub atmosphæra sicca et sæpius mutata probe siccata, dein nudæ insectorum corrosioni aut in vasis vitreis radiis solaribus expositæ adservantur, frequenter omnem omnino virtutem perdunt et pulverem terreum potius quam medicamentum æquant.

In locis præterea, ubi pharmacopœæ legibus nullis adstricti, botanices ignari aut ex aliis demum causis, plantas medicinales ipsi nunquam colligunt, sed a mulierculis sub nominibus, quibus offeruntur, promiscue coeunt, sæpe fit, ut planta una pro altera vendatur; aut plantæ recentes in officinis in cumulo diutius asservatæ, fermentantes, corruptæ vel effœtæ pro parandis extractis, tincturis, etc., adhibeantur. Taceo fraudem voluntariam qua medicamenta vel inertia vel corrupta aut noxia bonis et efficacibus, toties in officinis pharmaceuticis, in opprobrium Medici et perniciem ægri, sponte et impune substituuntur. Hoc cum Valeriana officinali, cum Conio maculato, cum Polypodio filice, cum Arnica montana aliisque multis non semel ipse deprehendi. Inde fit ut Medici cæterum sagacissimi sæpissime decipiantur; et inde non raro circa virtutes medicamentorum saluberrimorum male sceptici, aut omnino increduli evadant.

Quæ de viribus simplicium mox memini, non quidem ita intelligi velim, quasi causas allatas solas agnoscerem, nullasque præterea alias, cur remedia cæterum præstantissima toties fallant. Probe enim novi, Empiricos et Medicastrost frequenter ineffaciæ medicamentorum adscribere, quod propriæ ignorantiae aut judicii defectui potius attribuere deberent. Falluntur sæpe practici, quod simplicia aut

inertia aut ambiguae virtutis, vel demum far-
raginem medicamentorum indigestam promi-
sue praescribant: Decipiuntur sapissime, quod
medicamenta, licet efficacissima et vere he-
roica, causa vel natura morbi male cognita,
administrent, minime ut videtur consilii, quod
ad recte medendum non sufficit ut remedia
generi morbi et speciei cuique aut etiam va-
rietatibus quibusdam apprime accommodata
sint; sed quod practico praeterea in adplica-
tione remediorum ratio primaria habenda sit
Habitus aegri, id est, virium naturae reagen-
tium, utpote a quibus effectus medicamento-
rum in corpore aegroto praepriis dependent.
Hi effectus diversissimi sunt in subjecto forti
aut debili, torpido aut morbose irritabili,
cachectico aut antea sano; et inde fit quod
remedia caeterum eximia, male aut praepostere
adplicata, modo nullos modo tremendos, aut
plane exitiales producant effectus. Tyrones
hinc facile mecum sentient, quod ad artem
salutarem probe exercendam, plura omnino
requirantur quam quidem vulgus et aegrorum
et practicorum sibi communiter persuadet.
Non vestitus affectatus, non frons rugosa aut
faciei gravitas, nec superficiale demum pulsus,
linguae, urinae etc. examen, aut servilis for-
mularum imitatio et praescriptio Medicum
constituunt. Ut morbi graviores debellantur,
habitus aegri et natura aegritudinis probe in-
vestiganda, causa morborum rite determinanda.

dæ, et remedia iisdem adamussim applicanda sunt: hæc sedulam post studium multorum annorum, ad lectum ægri attentionem et meditationem, examen profundum, iudicium sanum et ingenium acutissimum sæpe requirunt.

Hæ sunt qualitates quæ Medicum philosophum a practicis vulgaribus, et empiricis (spuriis heu artis filiis), linea acuta distinguunt. Hic solus novit, vires multorum medicamentorum magis certas esse, quam quidem Medicastrum sibi vulgo persuadent: Hic solus, quidquid contra ignari declament, convictus est, multos hodie curari morbos, quos Hippocrates suo tempore curare non potuisset, et gravissima intra paucos sæpe dies debellari mala, quæ ab ignaris non infrequenter vel frustra tentantur, vel per menses et annos misere trahuntur.

Præmissis hisce observationibus quæ Tyronibus satis inculcari non possunt, ad scopum meum redeo.

Qualitates corporum sunt attributa sensibus externis evidētia, aut analysi chemica eruta.

CHEMIA partes plantarum constitutivas reserans: principium eorum activum revelat: *Balsamicum; oleosum fixum, vel volatile; principium extractivum, gummosum seu mucilaginosum, resinosum, gummoso aut extractivo-resinosum, etc.*

SAPOR a lingua percipitur et aquæ aut salivæ solubilia manifestat;

Fatua ; *insipida* , *aquosa* ;
Oleracea , *mucilaginosa* , *pinguis* ;
Aromatica , *acria* , *pungentia* ;
Calida , *fervida* , *urentia* ;
Salsa , *acida* , *austero-styptica* ;
Dulcia , *amara* , *nauseosa* .

ODOR nares ferit et volatilia indicat :

Inodora , *fragrantia* , *suaveolentia* ;
Ambrosiaca , *hircina* , *graveolentia* ;
Fætida , *tetra* . *suspecta* .

Fidem quam merentur simplicia , interdum uno alferove vocabulo indicavi ; sic quod potentiam agendi spectat : *Præstantia* , *eximia* , *hercica* , *suspecta* , *venenata* . De dubiis autem vel omnino inertibus aut nihil dixi , aut signum (?) adjeci . — Cæterum quod nomina virium spectat , per se facile intelliguntur fere omnia , hinc ea hic recensere superfluum esset , præcipue cum eadem ad finem operis recensita sint . Sub *Adstringentibus* vegetabilia principio adstringente seu coriario , chemicis sub nomine *acidi gallici* noto , intelligo ; sub *Stomachicis* ea quæ digestionis vitiatae medentur . *Cardiaca* appellavi quæ motum cordis et systematis arteriosi augent ; *Nervina* quæ actionem systematis nervosi languidam erigunt . Sub titulo *Alterantium* medicamenta intelligo quæ statum corporis cachecticum aut caco-chymicum mutare valent ; sub *Alexipharmacis* ea volo quæ venena in ventriculo aut intestinis parentia aut externe per vulnera adplicata

immutant aut destruunt. *Deobstruentia* denique appello remedia quæ præcipue *Physconia* abdominali medentur; *Resolventia* e contra ea quæ externe adplicata absorptionem humorum ex tumoribus topicis promovere videntur.

Quod nomina morborum spectat, quos sub usu medicamentorum adduxi, Nosologiam Culleni secutus sum, paucis exceptis. Sub *Ataxia* mobilitatem systematis nervosi morbosam intelligo; sub *Physconia abdominali* autem obstructionem viscerum non solum sed et infarctum vasorum abdominalium (morbos in praxi hodie frequentissimos) comprehendo.

Menagogum specificum nullum novi præter terorem subitum. — Ea quæ sub hoc titulo indicavi pharmaca, naturam ad hanc evacuationem dispositam solum juvare videntur.

Signum (?) adjectum dubium indicat an remedium in dato casu revera valeat.

Dosis notata ubique; ubi aliter expressum non est, ætati mediæ convenit.

PRÆPARATORUM nonnisi efficaciorum et vere utilium memini sub titulis sequentibus: Aqua (vulgo *aqua stillatitia*); Alcohol (vulgo *spiritus plantæ*); Oleum volatile (vulgo *oleum essentielle* s. *cæthereum* s. *stillatitium*); Oleum fixum (vulgo *oleum unguinosum* s. *expressum*); Tinctura; Extractum; Succus inspissatus; Conserva; Syrupus. — Composita nulla adduxi, utpote virtutem ab ingrediente simplici maxime activo mutuantia.

Ad finem denique, præmissis indicibus amplis, in opere tali præprimis necessariis, indicem virium adjeci, in quo simplicia juxta virtutes quas in corpore exserunt, ordine alphabetico disposita sunt.

Et hic quidem lectores fortasse plures titulos frustra quærunt a me studio, non negligentia, omissos. Cæterum, ut supra monui, nullus sibi persuadeat, morbos simplici et servili adplicatione remediorum sub diversis titulis insertoram curari. Sed hic labor, hoc opus: Dona naturæ lectura et instructione acuantur; defectum eorum nullus liber supplere valet. Medicamenta præstantissima, imo ipsa heroica, sæpe fallunt si promiscue ut quidem vulgo frequentissime fieri solet, nulla aut naturæ aut causæ aut stadii morbi aut habitus ægri, ratione habita administrantur. Specifica, ut vocant remedia, utpote quæ morbo cuicunque fixo, semper et sub omni temperamentorum et causarum diversitate debellando paria sint, nulla agnosco. Cinchona dialeipyram non semper tollit: Syphilis, sub diversis et morbi et ægri circumstantiis, diversa omnino Hydrargyri præparata poscit; hinc sales et oxyda hujus metalli ad debellandum hunc morbum cæterum efficacissima promiscue, nulla aut ægri aut morbi status ratione habita, adplicata non raro fallunt; et Opium ipsum ex eadem causa spasmum non semper compescit, nec crethismum aut dolorem ubique sedat.

Ultimo demum Elenchum medicamentorum simplicium nuper a sagacissimo medico E. DARWIN in *Zoonomia* sua secundum novam theoriam propositum subjunxi, cujus meritum non discutio, sed practicis philosophis dijudicandum relinquo; sicque opus absolvi. — Intra paucum tempus, si otium favet, Pharmacopœam Medici practici seu Epicrisin analyticam medicamentorum præparatorum et compositorum quæ a Practicis Europæ, ingenio et probitate jure celebribus, efficacissima inventa novi, publico juri tradere intendo.

DE PONDERIBUS.

ET MENSURIS PHARMACEUTICIS.

PONDERA pharmaceutica, in diversis Europæ regionibus usitata, sunt:

GRANUM (grj.) ITALIS un *grano*. G. un *grain*, GE. ein *grain*, A. a *grain* æstimatur pondere æquare granum piperis. Quando igitur pars grani $\frac{1}{2}$ aut gr. $\frac{1}{4}$ præscribitur, granum piperis in duas aut quatuor partes finditur.

SCRUPULUS (ꝰj.) IT. uno *scrupolo*, un *denaro*. G. un *scrupule*, GE. ein *skrupel*, A. a *scruple*, continet grana viginti. In gallia scrupulus continet grana viginti quatuor.

DRACHMA (ʒj.) IT. una *dramma*, un *grosso*. G. un *gros* ou une *drachme*, GE. ein *quentchen*, eine *drachme*, A. a *drachm*, a *dram*, continet scrupulos tres aut grana sexaginta; in gallia vero grana septuaginta duo.

UNCIA (ʒʒj.) IT. un' *uncia*. G. une *once*, GE. eine *unze*, A. an *ounce*, continet drachmas octo, seu grana 480. (a)

(a) Dum asserit Auctor unciam 480 granis constare, procul dubio falso decipitur calculo: nam omnibus patet unciam vel in

XVIII ET MENSURIS

UNCIA SEMIS seu dimidia ($\frac{3}{2}$.) It. *mezz' oncia*. G. *une demi-once*, GE. *cin loth*, eine halbe unze, A. *half an ounce*, continet drachmas quatuor.

LIBRA MEDICINALIS ($\frac{1}{2}$ j.) It. *una libra*. G. *une livre* GE. *ein pfund*, A. *a pound*; continet uncias duodecim, seu grana 5760. (b) — in gallia uncias sexdecim.

LIBRA CIVILIS, continet uncias sexdecim.

Hæc tamen ponderum divisio, apparenter fere æqualis, pro ratione regionum multum differt. Nam Gallorum æque ac Anglorum libra pondere superat libram Germanorum, ita

8, vel in 10 dividi dracmis. Ubicumque terrarum mos invaluit dividendæ uncia in 8 partes, ibimet dragma 72 grana habet, non vero 60, sic ut uncia 576 granis componi censeatur. In illis vero regionibus ut Bononiæ, Romæ, Neapoli et alibi, ubi 10 dracmæ unciam constituunt, ibi dragma 60, et uncia 600 granis constat. Tertia pars dracmæ, scripulus dicta, si uncia in 8 dracmis dividitur 24; si vero in 10 dracmis partitur 20 tantum grana continet.

(b) Facile est eruere hic quoque A. falsitate principii falli, nam eo correcto non 5760, sed 6912 vel 7200 (prout in 8 vel 10 dracmis dividitur uncia) granis constare libram medicam eruitur.

DE PONDERIBUS XIX

ut horum libra medicinalis unciis undecim cum drachmis quinque et semis Gallorum æquivaleat; ac drachmis tribus cum scrupulis

duobus et granis $\text{XIII} \frac{21}{103}$ levior sit libra Anglorum.

Pondera supra dicta, eadem ratione divisa ubique fere etiam pro determinandis liquidis inserviunt.

MENSURÆ pro medicamentis siccis, præcipue herbis, usitatæ, vagæ omnino sunt:

FASCICULUS = unc j.

N. B. juxta alios fasciculus æquivalet unciis sex aut manipulis duodecim.

MANIPULUS = unc β.

PUGILLUS (quantum tribus digitis capi potest) = drachm β vel j.

MENSURÆ pro liquidis usitatæ sunt sequentes:

Cochleare majus = unc β.

Cochleare minus = drach j.

Pinta Anglorum = lib. j seu unc. xvi.

Pinta Gallorum (*Pinte*) = lib. ij. seu unc.

XXXII.

Mensura una Germanorum = lib. ij — iij.

— dimidia (Noessel) = lib. j β.

Mensuræ quadrans = unc. x — xii.

Congius Anglorum (*gallon*) = libris seu pintis Anglicis viij.

Cantharus Suecorum = lib. v β.

Ex dictis patet, in genere præstare, liquida

XX ET MENSURIS

æque ac sicca, pondere potius quam mensura, præscribere.

A D P L I C A T I O

*Novorum Galliæ ponderum et mensurarum
pro usu medico-pharmaceutico.*

Mensuræ novæ quæ æstimandis ponderibus in Gallia nuper in usum publicum introductæ fuerunt, communem ducunt normam a gravitate aquæ, certum quoddam volumen (ad datam temperaturam) occupantis: hocce liquidi volumen definitum est ope novarum mensurarum linearium, quæ ipsæ ex magnitudine terræ deductæ sunt, et ad longitudinem arcus meridiani, a polo ad æquatorem ducti, tanquam ad primigeniam unitatem referuntur.

Pondus centimetri cubici aquæ destillatæ, summe condensatæ, quæ ad gradum glaciei quam proxime accedit, *gramma* audit.

Pondus decimetri cubici ejusdem liquidi nuncupatur *kilo-gramma*, quod idem audit ac *gramma* millies repetitum.

Unitates quæ *gramma* subdividunt, totidem sunt grammatis fractiones decimales quæ designantur nominibus *deci-gramma*; *centi-gramma*; *milli-gramma*; quasi diceres decima, centesima, millesima pars grammatis.

A grammate ad *kilo-gramma* fit progressio per unitates pariter decimales; quæ sunt *deco-*

DE PONDERIBUS XIV

gramma et *hecto-gramma*; quorum prius decem grammatibus, posterius centum grammatibus æquivalet.

Unitas decimalis quam dividit *kilogramma*, insignitur nomine *myria-gramma*; cujus interpretatio est *gramma* decies millies adsumptum.

Unaquæque ex prædictis unitatibus prostat metallo confecta, et in usum communem traditur, ponderibus quibuslibet æstimandis dicata; et ut ponderatio facilior redderetur, unicuique unitati suum Duplum, suus Semis adscribuntur.

Quæ cum ita sint, fuit series haud interrupta novorum ponderum, quorum valores partibus libræ et semi-libræ consignatos et veritati proximos subministrat tabula sequens.

Duplum myriagramma = libris 40.

Myriagramma = libr. 20.

Semi-myriagramma, aut 5 kilogrammata = libr. 10.

Duplum kilogramma = libr. 4.

Kilogramma = libr. 2.

Semi-kilogramma, aut 5 hectogrammata = libr. 1.

Duplum hectogramma = unciis 6.

Hectogramma = unc. 3.

Semi-hectogramma = unc. 1 $\frac{1}{2}$

Duplum decagramma = unc. $\frac{2}{3}$

Decagramma = unc. $\frac{1}{3}$

XIII ET MENSURIS

Semi-decagramma = unc. $\frac{1}{6}$

Duplum gramma = drachm. $\frac{1}{2}$

Gramma = drachm. $\frac{1}{4}$

Semi-gramma = granis 9 ad 10.

Duplum decigramma = gran. 4.

Decigramma = gran. 2.

Semi-decigramma, aut 5 centigrammata = grano 1.

Centi-gramma = grani $\frac{1}{5}$

Præcedentem tabulam vel leviter perlustrant facile patebit, pondus 100 librarum in veter systemate vulgo dictum centenarium (*quintal*) idem esse cum quinque Myriagrammatibus; unam libram parem esse quinque hectogrammatibus; unciam quam proxime accedere ad trientem hectogrammatibus; drachmam ad quatuor grammata; granum ad semi-decigramma aut quinque centigrammata.

His probe intellectis, nullam difficultatem facessere potest conversio veterum mensurarum in novas. Hæc operandi ratio nullas medicis aut pharmacopolis moras causabit. Sat erit hic loci nonnulla referre exempla conversionum quæ magis communitur occurrunt:

Quadrans grani = 1 aut 2 centigramm.

Semi-granum = 3 centigramm.

Granum = 5 centigrammatibus.

2 Grana = 1 decigrammati.

10 Grana = 5 decigrammatibus.

20 Grana = 1 grammati.

50 Grana = 1 $\frac{1}{2}$ grammati.

40 Grana = 2 grammatibus.

1 Drachma = 4 grammatibus.

1 Uncia = 3 decagrammatibus.

1 Libra = 5 hectogrammatibus.

Ex tabula præcedenti patet summam deci-grammatum prodire, quando granorum numerus per numerum 2 dividitur, haud aliter quam in novis monetis Gallicis decimorum (*décimes*) summa obtinetur, dum per 2 dividitur numerus assium Gallicorum (*sous*).

Hinc concluditur grana 4; 6; 8 deci-grammatibus 2; 3; 4: — et grana 5; 7; 9 deci-grammatibus 2 $\frac{1}{2}$; 3 $\frac{1}{2}$; 4 $\frac{1}{2}$ coæquari.

Cæterum nullus existimet, rem ad vivum resecandam esse, atque, quando præscribuntur ex. gr. grana duo tartari stibiati aut drachmæ duæ sulfatis magnesiæ vel uncia duæ aquæ aut tincturæ cujuscumque, incumbere curam, doses consignandi modo qui strictissime cum novis ponderibus conveniat; neminem enim fugiet, nec plus nec minus proficua fore medicamina, si in dosi deficient aut abundant nonnullæ portiunculæ aut corpuscula, quorum præsentia aut absentia vix indicatur trutina perfectissima. Id solum curandum, ut doses consignentur numeris rotundis; hosce autem et quidem solos indicat præcedens tabula.

Quicumque forte doses ponderibus libratas novis numeris exactissime expressas noscere desiderat, illi sequentes observationes servient.

XXIV ET MENSURIS.

In superiori tabella legitur, duo grana æquivalere uni decigrammati; revera autem unum decigramma continet dumtaxat granum unum cum fractione $\frac{89}{100}$; dum ponitur ergo unum decigramma pro duobus granis in dosi quæ adhiberi intenditur, fractio $\frac{1}{20}$ deficit, quæ omnino negligi potest.

Pariter quando dicitur drachmam unam æqualem esse grammatis quatuor, excipitur numerus fractus $\frac{1}{22}$; quatuor quippe grammata unam efficiunt drachmam cum tribus granis et grani triente; hinc, dum præscribuntur quatuor grammata pro una drachma, dosi genuinæ additur fractio $\frac{1}{22}$.

Ubi uncia pro tribus decagrammatibus accipitur, ex legitima dosi detrahitur pars $\frac{1}{51}$.

Porro quisque facile conveniet rem esse plane indifferentem, si pro grano uno pars $\frac{12}{20}$

aut $\frac{19}{20}$ grani; pro drachma una, drachma cum tribus aut quatuor granis, (75 grana pro 72 grauis); pro uncia una, uncia minus granis undecim (565 grana pro 576 granis) sumantur.

tur. Hi sunt tamen limites ultra quos non excurrunt errores quos admittit computandi ratio quæ in superiori tabella proposita fuit.

Insuper considerari meretur, in novo ponderum systemate medicis offerri modum doses accomodandi ætati et temperamentis, longè commodiorem, quam in veteri systemate; calculus enim decimalium, longe facilius quam calculus vulgaris obviam reddit rationem quam habent unitates cujusvis ordinis ad unitates ordinis superioris. Ex. gr. non ita facile videtur quid sint 20 grana ad unciam; contra, quid sit gramma hectogrammati comparatum, sine mora percipitur, nomine quo signatur unitas ordinis superioris, indicante illam esse unitatem ipsissimam ordinis inferioris centies repetitam.

Quod mensuras capacitatis pro liquidis mensurandis attinet, mensuræ novæ veteribus in præscriptionibus formularum commode substitui possunt methodo sequenti:

LITRUM (*le litre*) aquæ destillatæ æquivalet pintæ Parisinæ (*pinte*) $\frac{1}{2}$ seu libris duabus et drachmis quinque gallicis veteribus; et pondere æquat kilogramma.

SEMILITRUM (*demilitre*) æquivalet libræ uni cum drachmis duabus et semis (*chopine*).

DUPLUM DECILITRUM æquivalet unciiis sex cum drachmis duabus (*quart de pinte* ou *demi-septier*) et pondere æquat duplum hectogramma.

xxvi ET MENSURIS.

DECILITRUM æquivalet unciiis tribus cum drachma una et pondere æquat hectogramma.

SEMI-DECILITRUM æquivalet unciz unicum drachmis sex (*gobelet*; cyathus), et pondere æquat quinque decagrammata.

N. B. *Litrum* continet circiter 50 pollices cubicos veteres; hinc *duplum centilitrum* (*double centilitre*) respondet pollici cubico, seu drachmis quinque, seu cochleari majori aquæ destillatæ.

Hic gradum sisto atque præsentibus observationibus finem impono; quæ si nulla ex parte, ut spero, claudicent, medicis offerunt maximam facilitatem mensuras et pondera vetera in nova commutandi.

CANONES.

1. **RADICES** sero autumnno, postquam folia caulesque emarcuere, vel hyeme aut primo vere antequam folia germinant, effodiantur. In delectu radicum, spongiosæ, farinacæ, cariosæ, imprimis vero exsucco cortice tectæ rejiciuntur; Bonitatem enim radicum determinat perfectus torosusque corticis habitus. Quæ principis aromaticis et resinosis præditæ sunt radices, lotionem non purgantur; sufficit, si de modice siccatis pulveres sordesque excutiantur. Prægrandes et succulentæ Radices in taleolas dissectæ, reliquæ quales sunt, cito siccantur, aut loco calido umbroso ventis perflato, aut fornacis leni cautoque calore, siccatae frigido siccoque servantur loco, ne situm mucoremque contrahant, aut putredine atque carie exedantur. Fragrantes vasis clausis, omnes locis umbrosis conserventur. Inquilinæ, tum succulentæ, multum gummosæ, tum etiam subtilibus aut facile avolantibus viribus præditæ, quotannis recenter legantur et arcessantur. Quibus siccatis exigua, recentibus vero multa virtus est, ut Cochleariæ armoraciæ, Iridum, Ari maculati, Scillæ maritimæ, Bryoniæ albæ, illæ opportuna tempestate collectæ, sabulo sicco reconditæ, servantur.

2. **LIGNA** hyberno succidantur tempore, mox findenda. **STIPITES** versus autumnum, quo

tempore succo efficaci, probe cocto scatent, resecantur. CORTICES e fruticibus autumnis, ex arboribus adulta hyeme aut accedente vere, dum facillime a ligno secedunt, aut hyeme deglubantur.

3. TURIONES gemmæque primo vere, quo tempore turgidulæ sunt et ante explicationem foliorum decerpantur. HERBÆ colligantur adultæ cum foliis rite expansis, antequam flores sese explicuerint: Quæ semper virent, quovis tempore colligere licet; verum tamen præstat. FOLIA colligenda sunt tempestate sicca, non diu post ortum solis, simul ac ros, quo noctu canescunt plantæ, solis radiis dissipatus fuerit; decerpantur vero postquam defloruit et antequam semina maturavit planta. Herbæ indigenæ quotannis recentes comparari debent; effætæ superstites, si placet, pro sale alcalino herbarum adhiberi possunt. Exsiccatio herbarum citissime fiat, aut calido, umbroso et ab aëre perflato loco, aut lento cautoque fornacis calore.

4. FLORES, absque calice et pistillo, sola corolla servata, decerpantur nuper expansi, certe antequam antherarum pollinem exploraverint, eo tempore ubi radii solis rorem dissipaverint. COMA floris colligenda dum flos explicari incipit. Siccentur ut herbæ, et quidem quam fieri potest citissime.

5. SEMINA colligantur perfecte maiura, dum sponte a planta secedunt, antequam excident,

locoque ab aëri perflato probe siccentur, sine ignis adminiculo. Quæ capsulas, involucria etc. retinent, ea his munita servantur: Ple-
rorumque autem seminum delectus ita insti-
tuendus est, ut aquæ immittantur, et quic-
quid supernatat abjiciatur; quod vero fundum
petit iterum sicceatur. FRUCTUS nonnisi matu-
ri decerpantur, dum pericarpia sponte sese
aperire incipiunt.

In genere notandum, vegetabilia tempore
anni improprio vel ex solo artificiali, non na-
tivo, collecta, aut male siccata, et negligenter
conservata effæta sæpissime, aut plene
corrupta esse; hinc à medico practico pru-
denti adhiberi nunquam debent nisi ex solo
ubi natura eadem sponte producit, decerpta.
Alpina ex Alpibus, et quæ solum sabulosum
aut paludosum amant ex solo sicco arenoso
aut ex humido palustri colligenda; eaque
probe siccata in locis aut vasis ab accessu
radiorum solarium sollicitè conservanda sunt,
siquidem virtutes earum in curandis morbis
efficaces experiri desideramus.

MATERIA MEDICA

I. VEGERABILIA EORUMQUE PREPARATA.

A.

ACANTHUS MOLLIS. Folia; herba.

CLAS. *Didyn. O. Angiosp. Perennis; Europ. austral.*

OFFICINIS. *Branca ursina. ITALIS. Acanto, o Brancorsina. GALLIS. Pied-d'ours. GERMANIS. Baehrenklau. ANGLIS. Smooth bear's breech. HISPANIS. Pie de oso.*

QUALITAS: mucilaginoso.

VIRTUS: emolliens?

USUS: ambusta?

DOSIS:

PRAEPARATA:

ACHILLEA AGERATUM. Herba.

CL. *Syng. O. Polyg, superfl. Perennis: Europ. austr.*

OF. *Ageratum. IT. Erba Giulia, o Agerato. A. sweet milfoil, or maudlin.*

QUAL. *Odor. suaveolens; sapor amaricans, aromaticus.*

VIRT. *Stomachica.*

USUS. *Dyspepsia.*

DOS.

ACHILLEA ATRATA. Herba.

OF. *Genipi veri herba.* IT. *Millefoglio delle Alpi.*

QUAL. Odor aromaticus; sapor amarus.

VIRT. Stomachica.

USUS. Dyspepsia.

ACHILLEA MILLEFOLIUM. Folia. summities florentes.

CL. et O. præced. Perennis.

OF. *Millefolium.* IT. *Millefoglio.* G. *Millefaile.* GE. *Schaafgarbe.* A. *Milfoil; yarrow.*

QUAL. In oleo volatili et extractivo amaro residens; sapor amarus, subaromaticus.

VIRT. Stomachica; leviter stimulans.

USUS. *infusi*: dyspepsia; colica flatulenta; hæmoptysis; hæmorrhoids; hysteria; dolor spasmodicus post partum.

DOS. Drach. ij-iiij ad lib. j aquæ in infuso.

PRÆP. Extractum.

ACHILLEA MOSCHATA. Herba.

IT. *Lua Moscata.* A. *Musk-smelling.* *milfoil.*

QUAL. Odor moschatus.

VIRT.

USUS.

ACHILLEA PTARMICA. Radix; herba; flores.

CL. et O. præced. Perennis.

OF. *Ptarmica.* IT. *Ptarmica*, o *Sternutella.* G.

L'herbe à éternuer. GE. *Wilde Bertramwur-*

MEDICA.

3

zel. *A.* Common sneezwort. H. *Achelea*
ptarmica.

QUAL. In principio resinoso residens; odor
florum nauseosus; sapor radicis acris, urens.

VIRT. Errhina; sialagoga.

USUS. (Loco radicis anthemis-pyrethri) pa-
ralysis linguæ; odontalgia.

ACHRAS SAPOTA. Semen; cortex.

CL. *Hexandr.* O. *Monog.* *Arborea*; *Americ.*
merid.

OF. *Sapotilla*. IT. *Pero salvatico*. G. *Breyap-*
fel-baum. A. *Common sapota*.

QUAL. *Seminum*: sapor acris, amarus. *Cor-*
ticis: amaro-stypticus.

VIRT. *seminum*: diuretica. *Corticis*: stoma-
chica; roborans.

USUS *seminum*: colica nephritica; dysuria.
Corticis loco cinchonæ: intermittentes.

DOS. *Seminum*: drach. j-ij ad 15j. aquæ in
infuso.

ACONITUM ANTHORA. Radix.

CL. *Polyand.* O. *Trig.* *Alpina*.

OF. *Anthora*. IT. *Antora*, o *Antitora*.

QUAL. Venenata; sapor acris, amarus.

VIRT. Cathartica; anthelminthica.

USUS.

DOS. *Pulveris*: drach. j.

ACONITUM CAMMARUM. Folia; herba.

CL. *Polyandr.* O. *Trig Alpina*; *Europ. austr.*

OF. *Aconitum.* IT. *Pardulianche*, o *Cammero.*

G. *Aconit*; *chaperon de moine.* GE. *Blauer sturmhut*; *Eisenhüttlein.* A. *Purple Wolfsbane*; *monkshood.* H. *Aconito.*

QUAL. *Venenata*; in principio acris residens; sapor acris; odor nauseosus.

VIRT. *Præstantior napello*: *sudorifica*; *diuretica.*

USUS *extracti*: *Rheumatismus chronicus*; *amaurosis*: *ulcus rebelle.*

PRÆP. *Succus inspissatus herbæ recentis junioris* (vulgò *extractum*). Gran. j ij.

ACONITUM NApELLUS. Herba.

CL. et O. *præced.* Alpina.

IT. *Nappello.*

QUAL. et VIRT. *præced.* sed debilior.

N. B. *Antidotum ranunculi thoræ?*

ACORUS CALAMUS. Radix.

CL. *Hexandr.* O. *Mong.* Perennis; in locis humidis, paludosis.

OF. *Calamus aromaticus*, seu *vulgaris*, *acorus verus.* IT. *Calamo aromatico.* G. *Acorus odorant.* GE. *Kalmus-wurzel.* A. *Sweet-acorus*; *sweetflag.* H. *Acoro calamo.*

QUAL. Odor. *fragrans*; sapor *acris*, *aromaticus*, *amaricans.*

VIRT. *Præstans*: *stimulans*; *stomachica.*

USUS. *Dyspepsia.*

MEDICA.

5

DOS. Drach. semis.

PRÆP. Extractum; conditum.

ADIANTHUM CAPILLUS VENERIS.)
 ————— PEDATUM.) Herba.

CL. *Cryptogam. O. Filices.*

OF. *Capillus veneris. IT. Capelvenere, o Adian-
 to nero.*

QUAL.

VIRT?

USUS præcipuus adianthi pedati pro syrupo
 capillorum veneris dicto.

PRÆP. Syrupus: G. *syrup. capillaire.*

ADONIS VERNA.)
 ——— APPENNINA.) Radix.

CL. *Polyandr. O. Polyg.*

IT. *Adonide.*

QUAL.

VIRT. Menagoga (PALLAS.)

USUS.

ÆSCULUS HYPOCASTANUM. Cortex.

CL. *Hexandr. O. Monog. Arborea.*

IT. *Castagno d' India. GE. Wilder kastanie-
 baum. A. Common horsechestnut.*

QUAL. Styptica.

VIRT. Adstringens.

USUS *extracti vel pulveris: intermittentes.*

PRÆP. Extractum.

DOS. Drach. j. Extracti in unc-j aquae cinna-
 momi, cujus gutt. lx. omni trihorio.

ÆTHUSA MEUM.

Radix.

CL. *Pent. O. Digyn.*

*Perennis; alpina;
Europ. austral.*

OF. *Meum; meum radix.* IT. *Meo, finocchia-
na.* A. *Common spignel or bawd-money.*

QUAL. In oleo volatili et principio resinoso
residens; sapor acris, aromaticus, cale-
faciens.

VIRT. Stimulans; carminativa.

USUS. Tertiana; astham pituitosum, leucor-
rhæa.

AGARICUS MUSCARIUS.

CL. *Cryptogam. O. Fungi*

In sylvis.

IT. *Agarico rosso comestibile, Uovolo, Cocco
maledetto.*

QUAL. Venenata.

VIRT. Cathartica; sudorifica.

USUS *succi inspissati*; vulgo ad necandas mu-
scas.

USUS *internus*: Epilepsia; paralysis à morbis
cutis retropulsis. *Externus* pulveris insper-
si: ulcus malignum; gangraena.

DOS. Pulveris gran. x-xxx. cum aceto pro dosi.

N. B. Pars terrae insidens sola, autumnno
colligenda, mundata, siccata, et pulve-
risata in vasis probe clausis usui servetur.

AGAVE AMERICANA.

CL. *Hexandr. O. Monog.*

IT. *Agave.*

MEDICA.

USUS decocti foliorum : Syphilis.

DOSIS : unc j ad libr. I aquae.

AGRIMONIA EUPATORIA. Herba.

CL. *Dodecand.* O. *Digyn.* Petennis.

OF. *Eupatorium veterum*; *agrimonia*. G. *Aigremoine*. GE. *Odermennige*. A. *Common agrimony*.

QUAL. *Substyptica*.

VIRT. *Subadstringens*.

USUS.

AJUGA PYRAMIDALIS. Herba.

CL. *Didyn.* O. *Gymnosp.* *Biennis*; *in nemorosis siccis*.

OE. *Herba consolidæ mediæ seu Bugulæ*. IT. *Agrimonia*, *Eupatorio*. A. *Mountain bugle*.

QUAL. *Amara*; *substyptica*.

VIRT. *Subadstringens*.

USUS.

ALCEA PURPUREA. Flores.

CL. *Monadelp.* O. *Polyandr.*

IT. *Malva Salvatica*.

QUAL.

VIRT.

USUS *chemicus*, ut *eximium reagens*.

ALCEA ROSEA. Flores.

CL. *et O. præced.* *Perennis*; *Asiatica*; *horatensis*.

*

OF. *Malva arborea*. IT. *Alcea*, *Malvoni*. GE.
Stockrosen. A. Common hollyhook.

QUAL. Fatua; mucilaginous.

VIRT. Involvens; emolliens.

USUS *infusi* forma gargarismatis: cynanche.

ALCHEMILLA VULGARIS. Herba; radix.

CL. *Tetradyn*. O. *Monog*. Perennis.

OF. *Alchemilla*. IT. *Alchimilla*, *Stellaria*, o
Piede di Leone. G. *Alchemille*. GE. *Frauen-*
mantel; sinau. A. Common ladiesmantle. H.
Alchemila vulgar; o *pie de leon*.

QUAL. inodora: styptica.

VIRT. Adstringens.

USUS.

ALLAMANDA CATHARTICA. Folia.

CL. *Pentand*. O. *Monog*. Frutex scandens;
Guiana.

A. Willow leaved allamanda.

QUAL. Lactescens; amara.

VIRT. Cathartica; stomachica.

USUS *infusi*: colica pictonum.

ALLIUM CÆPA. Radix recens; succus radicis.

CL. *Hexand*. O. *Monog*. Biennis.

OF. *Cepa*. IT. *Cipolla*. G. *Oignon*. GE. *Zwie-*
bel. A. Common onion. H. *Ajocebolla*.

QUAL. Recentis: odor peculiaris, alliaceus
dictus, volatilis; sapor acris.

VIRT. Diaphoretica; anthelminthica; flatulen-

M E D I C A.

9

ta; aphrodisiaca; diuretica rubefaciens.
Radicis coctæ: emolliens; maturans. *Assa-*
tæ: stimulans.

USUS *externus succi*: otalgia; dysecoea rheu-
 matica. *Radicis* forma cataplasmatidis: phleg-
 mone; bubo; varix ani.

ALLIUM SATIVUM. Radix recens; ejusque suc-
 cus.

CL. et O. præced.

Perennis.

OF. *Allium*. IT. *Agljo*. G. *Ail*. GE. *Knoblauch*.

A. *Cultivated leek*. H. *Ajo sativo*.

QUAL. In principio acri et paucò oleo vola-
 tili residens; odor alliaceus, volatilis; sa-
 por acris, subcausticus.

VIRT. Praestans: diuretica; diaphoretica; an-
 thelmintica; rubefaciens; maturans.

USUS *succi externus*: dysecoea; herpes; clavus.
Radicis recentis, vel succi: quartana; dys-
 pepsia; hydrops; asthma pituitosum; scor-
 butus.

ALOE PERFOLIATA.

—— SPICATA.

Aliaeque VARIETATES.

CL. *Exandr*. O. *Monog*.

}

Sucus extractivo-
 resinosus in pissaturâ

Perennis; *Afric*.

Ind. *occid*.

OF. *Aloë socotrina*: succus optimus incisione
foliorum obtentus in insula Socotora. Hepa-
 tica: vilior expressione in insula *Barbadoes*.
Caballina: pars post expressionem residua.

IT. *Aloe succotrina*, *epatica*, *caballina*. G.
Ge, A. Aloë.

QUAL. Heroïca: in principio extractivo-resinoso residens; sapor intense amarus, nauseosus; odor nauseosus.

VIRT. Cathartica, intestinum rectum praecipue irritans; stomachica; menagoga; anthelminthica.

USUS *internus*: Obstipatio; pyrosis; dyspepsia; haemorrhoids suppressa. *Externus*: ulcus putridum; caries; otorrhoea; epiphora gr. j. pulv. oculo inflatum.

PRÆP. Extractum aquosum; tinctura; vinum aloëtico-alkalinum.

DOS. Succii vel ejusdem extracti aquosi gr. ij.; Tincturae unc. semis-ij. Vini aloët. 3j. ad unc. semis.

ALOEXYLUM VERUM (LOUREIRO.) Lignum.

CL. O. *Arbor. Cochinchina.*

OF. *Lignum aloës S. agallochum verum.* IT. *Legno aloë.*

QUAL. Lactescens; venenatissima; medullitium trunci amarissimum.

VIRT. Inebrians, anthelminthica; excorians.

USUS. Cholera; paralysis.

DOS. Gran. xx.

PRÆP. Resina; oleum volatile.

ALTHAEA OFFICINALIS.

Ratix; herba.

CL. *Monad.* O. *Polyand.* *Perennis; in locis humidis.*

MEDICAE

II

OF. *Althæa*. IT. *Malvavischio*, *Bismalva*,
Altea. G. *Guimauve*. GE. *Eibisch*. A. *Marsh-*
mallow. H. *Malvavico*.

QUAL. Mucilaginoso; insipida.

VIRT. Lubricans; emolliens.

USUS. Tussis; rauco; stranguria. *Externus*
 forma enematis vel cataplasmatidis: tenesmus;
 phlegmone; dolor.

PRÆP. Decoctum; syrupus; pasta; unguentum.

AMMI MAJUS. Semen.

CL. *Pentand*. O. *Dygin*. *Annua*; *Europ. austral.*

OF. *Ammi vulgare*. IT. *Ammi*, o *Pepordio*. G.
L' ammi.

QUAL. Leviter. aromatica.

VIRT. Stomachica; carminativa.

USUS.

AMOMUM. CARDAMOMUM. Semen.

CL. *Monand*. O. *Monog*. *Indiæ orientalis*.
Amomum repens. (SONOERAT.)

OF. *Cardamomum minus*. IT. *Cardamomo*. G.
Cardamome. GE. *Kleine kardamomen*. A.
Lesser cardomom. H. *Amom cardamomo*.

QUAL. In oleo volatili residens; sapor acris,
 fervidus, aromaticus; odor gratus, fragrans.

VIRT. Stimulans; calefaciens.

USUS. Dyspepsia; flatulentia; chlorosis.

PRÆP. Tinctura.

DOS. Pulveris gran. x-xxx. Tincturae ʒj-ij.

AMOMUM GRANUM PARADISI. Semen.
 CL. et O. præced. Perennis; Guinea.
 OF. *Cardamomum majus s. maximum.* IT.
Grani di Paradiso, o Cardamomo maggiore,
G. Amome de Madagascar. A. *Orains*
of paradise.
 QUAL. In principio resinoso, magis quam oleo
 volatili residens; sapor urens instar piperis;
 odor subaromaticus.
 VIRT. Eadem ac præced.
 USUS.

AMONUM ZINGIBER. Radix.
 CL. et O. præced. Perennis; Ind. oriental.
 OF. *Zingiber s. zinziber fuscum et album.* IT.
Zenzero, o Zenzovero. G. *Gingembre.* GE.
Ingwer. A. *Ginger.*
 QUAL. In oleo volatili et paucio principio
 resinoso residens; sapor acris, aromaticus,
 fervidus; odor gratus, subfragrans.
 VIRT. Calefaciens; sialagoga; stomachica.
 USUS. Dyspepsia; tussis stomachica; colica
 flatulenta; diarrhæa. *Externus:* uulæ laxitas.
 PRÆP. Conditum; tinctura.
 DOS. Pulv. v-x-xxx. Conditum ʒj-unc. semis.
 Tinct. ʒj-ʒij.

AMYGDALUS COMMUNIS. Nuclei.
Varietas. a. sativa: dulcis et amara.
 CL. *Icosand.* O. *Monog.* *Arborea; Europ. austr.*

MEDIC A.

13

OF. *Amygdalæ dulces et amaræ.* IT. *Mandorle.*
G. *Amandes douces et amères.* GE. *Bittere und süsse mandeln.* A. *Sweet et bitter almonds.*

QUAL. In oleo fixo unguinoso residens.

VIRT. Nutriens; involvens; emolliens.

USUS. *dulcium*: febres; tussis. *Amararum*: ebrietas; vermes.

PRÆP. Emulsio ex amygdalis dulcibus. Oleum ex dulcibus vel amaris promiscue paratum.

AMYGDALUS NANA. Nuclei.

QUAL. et VIRT. Eadem ac præced.

AMYGDALUS PERSICA. Flores recentes; nuclei.

CL. et O. præced. Arborea; hortensis.

OF. flores persici. IT. *Pesca*, *Persico.*

G. *Pêcher.* GE. *Pfirsichbaum.* A. *Common peach tree.*

QUAL. Nuclei: oleoso mucilaginosi; odor florum peculiaris, nauseosus.

VIRT. Eadem ac amygdal. amararum.

PRÆP. Aqua florum.

AMYRIS ELEMIFERA. Resina.

CL. *Octaul.* O. *Monog.* Arborea; America.

OF. *Gummi Elemi.* IT. *Gomma o Resina Elemi.*

QUAL. Color pellucidus, flavescens.

VIRT. Resolvens; stimulans.

USUS externus in emplastris et unguentis; tumores; punctura.

AMYRIS KATAF (FOERS).

N. B. An Thus s. Oliba supeditat?

AMYRIS GILEADENSIS.) Vide Balsamea
OPOBALSAMUM.) Meccanensis.

AMYRIS ZEYLANICA (RETZIUS). Resina.
CL. et O. præced. - Arborea; Zeylan.
OF. *Gummi Elemi orientalis*. IT. *Commia Elemi orientale*.

QUAL. et VIRT. Eadem ac amyr. clemiferæ.

ANACARDIUM OCCIDENTALE. Nux.
(Testæ melligo).
CL. *Enneandr. O. Monog.* Arbor; Ind. orient.
et Brasil.

IT. *Noce metella*. A. *Cashew-nut*.

QUAL. *Melliginis*: nigra; urens.

VIRT. Excorians, tinctoria.

USUS. Maculæ; impetigo; herpes.

ANAGALLIS ARVENSIS. Herba;

N. B. Colligenda antequam flores explicati
sint.

Varietas: a. flore rubro b. flore luteo.

CL. *Pentand. O. Monogr.* Annua.

OF. *Herba anagallidis rubræ*. IT. *Anigallide maschio*. GE. *Rother hünnendarm*; *rother gauchheil*. A. *Red pimpernell*.

QUAL. Inodora; sapor acris, nauseosus.

USUS. Epilepsia; melancholia. *Extracti anag.*
flore luteo: icterus (STOLL.)

MEDICA.

15

DOS. Pulveris gr. xx. quater de die. *Extracti* :
3j-ij. Pro infuso 3ij. ad ℥j. aquæ.

ANAGYRIS FÆTIDA. Folia; semen.

CL. *Dec. O. Monog.* *Frutex; Europ. austr.*

IT. *Anagiri.*

QUAL. Odor teter, foetidus; sapor amarus.

VIRT. Cathartica; menagoga.

USUS.

ANCHUSA OFFICINALIS. Radix; herba;
flores.

CL. *Pent. O. Monog.* *Perennis.*

OF. *Buglossum.* IT. *Buglossa.* G. *Buglosse.* GE.
Ochsenzunge. A. *Officinal bugloss.*

QUAL. Mucilaginosa.

VIRT.

USUS.

ANCHUSA TINCTORIA. Radix.

CL. et O. *præcel.* *Perennis; Europ. austr.*

OF. *Alcanna spuria s. vulgaris.* IT. *Ancusa.*

G. *Orcanette.* GE. *Rothe ochsenzunge.* A. *Al-*
kanet, or dyer's bugloss. H. *Anchusa de tinte.*

QUAL. Rubra.

VIRT. Tinctoria.

USUS.

ANDROPOGON NARDUS. Fibrae radicis.

CL. *Polyg. O. Monac.* *Perennis; Ind. orient.*

OF. *Spica nardi. s. spicæ indicæ radix.* IT.

Nardo Italiano, o Spico nardo.

QUAL. Eximia: odor fragrans; sapor acris; amaricans.

VIRT. Cardiaca; stomachica.

USUS. Asthenia; Dyspepsia.

ANDROPOGON SCHÆNANTHUS. Herba.

CL. et O. præced. Perennis; Arabia.

OF. Herba schænanthi. IT. Giunco odoroso.

QUAL. Odor fragrans; sapor amaricans.

VIRT. Carminativa; menagoga.

USUS.

ANEMONE HEPATICA. Herba; flores.

CL. Polyand. O. Polyg. Perennis; montana.

OF. Hepatica nobilis. IT. Anemolo, o Anemone Epatica. A. Hepatica,

QUAL. Inodora; insipida.

VIRT.

USUS.

ANEMONE NEMOROSA. Herba; flores recentes.

CL. et O. præced. Perennis.

IT. Anemolo. GE. Waldanemone. A. Wood-anemone.

QUAL. Venenata; in principio acri volatili residens.

VIRT. Corrodens.

USUS externus loco cantharidum: cephalaea; tertiana; arthrodynia rheumatica; ischias.

ANEMONE PRATENSIS. Herba; flores.
CL. et O. præced. Perennis; in locis nemorosis, montanis, arenosis.
OF. *Pulsatilla nigricans.* IT. *Pulsatilla neri-cante.* G. *Pulsatille*; coquelourde. GE. *Kü-chenschelle.* A. *Pasqueflower* or *meadow anemone.*
QUAL. Venenata; in principio acri residens; acerrima.
VIRT. Corrodens; rubefaciens; resolvens; diu-retica.
USUS succi inspissati: amaurosis; paralysis. *Ex-ternus:* ulcus; herpes; caries.
PRÆP. Succus inspissatus vulgo *extractum*; infusum.
DOS. *Extracti:* gran. j-viiij; pro infuso drach. j-iiij ad ℥ j aquae.

ANETHUM FœNICULUM. Semen.
CL. Pentand. O. Digyn. Biennis vel perennis; hortensis.
OF. *Semen fœniculi. s. fœniculum dulce.* IT. *Finocchio dolce.* G. *Fenouil*, ou *anix doux.* GE. *Fenchel-saamen.* A. *Common fennel*; *sweet fennel-seed.* H. *Eneldo hinojo.*
QUAL. Praestans: in oleo volatili, non acri, residens, odor teter; sapor dulcescens, aromaticus.
VIRT. Carminativa; lactifera; resolvens.
USUS. Dyspepsia; flatulentia; colica infantum: defectus lactis; ophthalmia.

DOS. Pulv. gran. xx; pro infuso drach. ij-ii;
ad ℥j. aquae.

ANETHUM GRAVEOLENS. Semen; herba.

CL. *Et O. Præced.* *Annua; hortensis.*

OF. *Anethum.* IT. *Aneto.* G. *Aneth ou fenouil*
puant. A. *Common-dill.* H. *Eneldo de olor*
pesado.

QUAL. Praestans: odor teter; sapor subaromaticus.

VIRT. Hypnotica; carminativa; lactifera.

USUS. Colica; singultus; vomitus.

PRÆP. Oleum volatile seminum; aqua; alcohol *vulg.* spiritus.

DOS. Olei volat. gutt v-x.

ANGELICA ARCHANGELICA. Radix; folia;
semen.

CL. *Pentand.* O. *Digy.* *Biennis; Alpina,*
passim hortensis.

OF. *Angelica sativa.* IT. *Angelica domestica.*
G. *Angélique.* GE. *Angelwurzel.* A. *Garden-*
angelica.

QUAL. In oleo volatili residens; odor fragrans;
sapor acris, aromaticus, calefaciens.

VIRT. Stimulans; sialagoga; carminativa; sudorifica.

USUS. Dyspepsia; flatulentia.

PRÆP. Tinctura.

ANGELICA SYLVESTRIS. Radix.

MEDICA.

19

CL. et O. præced. Perennis; in locis humidis, nemorosis.

IT. *Angelica silvestre*. A. *Wild. angelica*.

QUAL. et VIRT. Eadem ac præced. sed debilior.

ANTHEMIS COTULA. Herba cum floribus.

CL. Syng. O. *Polyg. superfl.* Annuæ; in vasis et locis asperis.

OF. *Cotula fetida*. IT. *Antemide fetida*. G. *Maroute* ou *camomille puante*; A. *Stinking camomile* or *may-weed*.

QUAL. Odor foetidus; sapor amarus.

VIRT. Antispasmodica; stomachica.

USUS. Hysteria; asthma spasmodicum.

ANTHEMIS NOBILIS. Flores.

CL. et O. præced. In locis montosis.

OF. *Chimælum nobile*; *Chamomilla Romana*.

IT. *Camomilla Romana*. G. *Camomille romaine*, G. *Roemische kamillen*. A. *Common camomile*. H. *Manzanilla de Botera*.

QUAL. Eximia: in oleo volatili et extractivo amaro residens; odor suaveolens; sapor amarus.

VIRT. Antispasmodica; carminativa; stomachica.

USUS. Hysteria; colica spasmodica; flatulentia; intermittentes.

ANTHEMIS PYRETHRUM. Radix.

CL. et O. præced. Perennis, Europ. australi

OF. *Pyrethrum verum.* IT. *Piretro*, o *Pilatre*.
G. *Pyrethre* ou *racine salivaire*. **GE.** *Bertramswurzel*; *zahurwurzel*. **A.** *Spanisk camomile*, or *pellitory of Spain*. **H.** *Anthemis pelitre*.

QUAL. Praestans: in principio resinoso residens; sapor acris, penetrantissimus, urens.

VIRT. Sialagoga: errhina.

USUS *masticatorius*: odontalgia rheumatica; paralysis linguae; tumor glandularum salivarium.

ANTHIRRHINUM LINARIA. Herba.

CL. *Didyn.* **O.** *Angiosp.* Biennis.

OF. *Linaria.* IT. *Linaria*, *Urinaria*, o *Osiride*. **A.** *Common yellow toad-flax*.

QUAL. Praestans: odor hircino-urinosus; sapor subamarus.

VIRT. Diuretica; eccoprotica; alterans; resolvers.

USUS. Icterus; hydrops. *Externus*: ophthalmia; varix ani.

PRÆP. Unguentum.

APIUM GRAVEOLENS. Herba; radix; semen.

CL. *Pentand.* **O.** *Trigyn.* Biennis; hortensis.

OF. *Apium.* IT. *Selleri*, o *Sedano*. **G.** *Ache des marais*. **GE.** *Sellery*. **A.** *Smallage*. **H.** *Apio de olor pesado*.

QUAL. Praecipue *seminum*: suspecta; in oleo

volatili residens; odor subteter; sapor dulcescens.

VIRT. Diuretica; carminativa; phthiriaca.

USUS.

APIUM PETROSELINUM.

Radix; herba;
semen.

CL. et O. *præced.*

Biennis.

OF. *Petroselinum*. IT. *Prezzemolo*. G. *Persil*. GE.

Petersilien. A. *Parsley*. H. *Apio peregil*.

VIRT. *Ruticis*: diuretica; resolveas; lactifuga; phthiriaca.

USUS. Icterus; dysuria; ablactatio; contusura; pediculi.

AQUILEGIA VULGARIS.

Herba; flores;
semen.

CL. *Polyand*. O. *Pentag.*

Perennis.

OF. *Aquilegia*. IT. *Aquilina*, *Aquileja*. A. *Com. moni colombine*.

QUAL. Venenata. *Seminum*: mucilaginoso; oleosa.

VIRT.

USUS *Herbae*: icterus; morbi cutis.

ARBUTUS UVA URSI.

Folia.

CL. *Decand*. O. *Mongyn*. *Fruticosa*; *Europ.*
sept. in collibus arenosis.

OF. *Uva ursi*. IT. *Uva ursina*. G. *Arbousier*
trainant; *bousserole*. GE. *Baerentraube*; *sant-*
berren; *steinbeerenblaetter*. A. *Trailing ar-*

butus, or *bears-berry*. H. *Madronna uva de oso*; *gnayuba*.

QUAL. Inodora; sapor amaro-stypticus.

VIRT. Adstringens; diuretica.

USUS. Calculus urinarius; ulcus renum, vesicae.

DOS. Gr. xx. drach. j-ij.

ARCTIUM. LAPPA. Radix; semen.

CL. Syng. O. Polyg. *æqual*. Biennis.

N. B. Duæ varietates.

OF. *Bardana*; *lappa major*. IT. *Bardana*; *Arsio*, *Lappa maggiore*. G. *Bardane*; *gloutron*. GE. *Klettenwuszel*. A. *Smooth-headed common et woolly-headed burdock*. H. *Arzio lappa*; *lampazo*.

QUAL. *Radicis*: sapor dulcis, subausterus; odor nauseosus. *Semtnum*: sapor intense amarus; urinam decolorans.

VIRT. *Radicis*: diuretica; alterans; *seminum*: cathartica.

USUS *decocti radicis*: morbi cutis; syphilis; arthritis?

DOS. Unc j-ij ad ℥j. aquae.

ARISTOLOCHIA ANGUICIDA. Radix.

CL. Gynandr. O. Hexandr. Fruticosa; Ind. occid.

IT. *Aristolochia anguicida*.

QUAL. Odor moscosus; serpentes fugans.

USUS *externus succi vulneri instillati*: *morsura serpentum*.

MEDICA.

23

ARISTOLOCHIA CLEMATITIS. Radix.

CL. et O. præced. Perennis.

OF. *Aristolochia vulgaris* s. *tenuis*, s. *clematidis*. IT. *Aristologia volgare*, *Clematide*. G. *Aristolochie ordinaire*. GE. *Gemeine osterluzey*. A. *Upright birthwort*. H. *Aristolochias clematite*.

QUAL. Praestans : odor graveolens ; sapor acris, amarus.

VIRT. Stimulans ; stomachica ; menagoga ; resolvers.

USUS. Amenorrhæa retentionis ; chlorosis ; cachexiae ; cacoethes ; fistula ; sarcoma.

N. B. Substituatur quandoque aristolochiae serpentariae.

ARISTOLOCHIA LONGA.)
 ————— ROTUNDA.) Radix.

CL. et O. præced. Europ. austr.

OF. *Aristolochia rotunda*, *longa*. IT. *Aristologia lunga*, e *rotunda*. A. *Long et round rooted birthwort*.

QUAL. et VIRT. Eadem ac præced.

ARISTOLOCHIA ODORATISSIMA.

CL. et O. præced. Jamaic.

A. *Sweet-scented birthwort*.

QUAL.

VIRT.

USUS.

ARISTOLOCHIA SERPENTARIA. Radix.

CL. et O. præced. Perennis; Virg. et Carolina.

OF. *Serpentaria virginiana*. IT. *Serpentaria di Virginia*, G. *Serpentaire*. GE. *Virginische schlangenwurzel*. A. *Virginian snakeroot*.

QUAL. Præstans: in oleo volatili residens; odor hircinus instar valerianæ; sapor aromaticus, amaricans, acris, pungens.

VIRT. Stimulans; cardiaca.

USUS. Typhus; intermittentes; sphacelus; chlorosis; amenorrhæa retentionis; morsura serpentum. *Forma gargarismatis*: cynanche atonica.

DOS. *Pulveris*: gran. x-xxx; pro infusodrach. semis. iij ad ℥j. aquæ vel vini.

ARISTOLOCHIA TRILOBATA. Stipites.

CL. et O. præced. Fruticosa; Surinam. Jamaica.

IT. *Aristolochia trilobata*. A. *Three lobed birth-worth*.

QUAL. et VIRT. Eadem ac præced.

ARNICA MONTANA. Flores (sine calice); herba; radix.

CL. Syng. O. Polyg. superfl. Perennis; alpina; in pratis montium.

N. B. Foliis ovatis, integris, nervosis.

OF. *Arnica*. IT. *Arnica*. G. *Arnique*. GE. *Arnika*; *wolverley*; *Falkraut*. A. *Arnica or german leopard's bane*. H. *Tolacc de montana*.

MEDICA.

25

QUAL. Heroica: odor virosus; sapor acris, aromaticus, amaricans.

VIRT. Stimulans; diaretica; menagoga; errhina; antiseptica; resolvens.

USUS *infusi florum*: asthenia; arthrodynia rheumatica; contusura; amaurosis; paralysis; epilepsia? amenorrhæa; ischuria paralytica.

Radicis forma pulveris: diarrhœa, dysenteria; quartana; gangræna; synochus. *Externus*: ulcus malignum; sphacelus.

DOS. *Infusi florum* in sacculo suspensorum: drach. j-ij-iv. ad ℥j. aquæ. *Radicis pulv.* gran. v-x.

IV. B. Cave ne flores substituantur aut misceantur floribus inulæ dysentericæ, hypochæridis radicatæ aut maculatæ; anthemidis tinctoriæ, aliisve floribus flosculosis.

ARTEMISIA ABROTANUM.

Herba, summitates.

CL. Syng. O. Polyg. superfl. Perennis; suffructic.

OF. *Abrotanum hortense*. IT. *Abrotano maschio*.

G. *Aurone mâle*; *citronelle-aurone*. GE. *Stabkraut*; *Stabwurz*; *Eberaute*. A. Common southern wood. H. *Yerba lombriguera*.

QUAL. Præstans: odor nidorosus; sapor aromaticus, amaricans.

VIRT. Stimulans; stomachica; menagoga; anthelminthica.

USUS. Dyspepsia; amenorrhœa; lumbrici. *Externus* forma balnei, fots, decocti vel infusi.

DOS. Unc. j. ad ℥j. aquæ.

ARTEMISIA ABSINTHIUM.

Herba; summitates.

CL. et O. præced.

Perennis.

OF. *Absinthium vulgare*. IT. *Assenzio*. G. *Absinthe*. GE. *Wermuth*. A. *Common wormwood*. H. *Artemisia axenjo*.

QUAL. Præstans: in oleo volatili et extractivo amaro residens; odor nidorosus; sapor intense et pure amarus.

VIRT. Stomachica; anthelminthica; antiseptica; resolvens.

USUS. Dyspepsia; intermittentes; leucophlegmatia; amenorrhœa: icterus, tinea; achor; gangræna; vermes. *Externus* forma fots, cataplasmatidis.

PRÆP. Infusum aquosum et vinosum; tinctura; extractum; oleum volatile; conserva.

DOS. *Extracti*: drach. semis. *Conservæ* unc. j.

ARTEMISIA-CAMPESTRIS.

CL. et O. præced.

Perennis; alpina.

IT. *Assenzio campestre*. A. *Field southern wood*.

QUAL. et VIRT. Abrotani.

ARTEMISIA DRACUNCULUS.

Herba recens.

CL. et O. præced.

Perennis.

MEDICA.

27

OF. *Dracunculus*. IT. *Serpentaria*, o *Dragoncello*. G. *Estragon*. GE. *Dragon*; *kaisersatlat*. A. *Taragon*.

QUAL. et VIRT. Eadem ac præced.

ARTEMISIA GLACIALIS.

CL. et O. præced.

Perennis.

A. *Silky wormwood*.

QUAL. et VIRT. Eadem ac præced.

ARTEMISIA MARITIMA. Herba; summitates.

OF. *Absinthium maritimum*. IT. *Serifio*, o *Assenzio marino*. A. *Sea wormwood*.

QUAL. et VIRT. Eadem ac absinthii.

ARTEMISIA PONTICA. Herba; summitates.

OF. *Absinthium ponticum* S. *Romanum*. IT. *Assenzio Romano*, o *Pontico*. A. *Roman wormwood*.

QUAL. et VIRT. Eadem ac absinthii, sed debilior.

ARTEMISIA RUPESTRIS. Herba.

CL. et O. præced.

Perennis; *Alpina*; *Sibirica*, *Zelandica*.

OF. *Genipi albi herba*. IT. *Assenzio Alpino*. A. *Creeping wormwood*.

QUAL. Odor grate aromaticus.

VIRT.

USUS. Febres intermittentes; amenorrhæa.

ARTEMISIA SANTONICA. Summitates ramulorum cum semine.

CL. et O. præced. Perennis.

OF. Semen cinæ s. contræ. s. Santonici s. Zedoariæ. IT. Seme santo, o Semenzina. A. Tartarian southern wood; or wormseed. G. Barbontine; santolina; poudre à vers. GE. Wurmsaamen; zwittersaamen.

QUAL. Præstans: in oleo volatili residens; odor nidorosus; sapor acris, amarus.

VIRT. Anthelminthica; stomachica.

USUS. Vermes; anorexia.

DOS. Pro infantibus gran. x. drach. j. in pulvere vel electuario; drach. ij-iiij. in infuso lactis.

ARTEMISIA VULGARIS. Herba; summitates.

CL. et O. præced. Perennis.

OF. Artemisia rubra et alba. IT. Artemisia. G. Armoise ordinaire; herbe de St. Jean. GE. Beyfuss; St. Johannis gürtel. A. Magwort.

QUAL. Præstans: odor aromaticus; sapor amaricans.

VIRT. Stimulans; stomachica; menagoga.

USUS. Tertiana.

PRÆP. Moxa.

ARUM MACULATUM. Radix recens.

Variet: A. Arum non maculatum. B. Ar. maculatum.

MEDICA.

29

CL. *Gynand.* O. *Polyand.* Perennis; in locis umbrosis, nemorosis.

OF. *Arum.* IT. *Aro.* G. *Gouet*; pied de veau.

GE. *Arons-wurzel*; deutscher ingwer. A.

Wake-robin.

QUAL. *Recentis* Præstans: in principio acri, volatili residens; sapor urens. *Siccata*: farinacea; subacris.

VIRT. Stimulans; sudorifica; expectorans; cosmetica. *Rec.* Corrodens; vesicans.

USUS. Dyspepsia; cephalæa; intermittentes; asthma pituitosum; cachexiæ; arthrodynia rheumatica.

DOS. Pulveris gran. x-xx-xxx.

ARUNDO PHRAGMITIS.

CL. *Triand.* O. *Digyn.*

IT. *Canna.*

QUAL.

VIRT. Antisyphilitica?

USUS. Syphilis.

PRÆP. Decoctum ℥j-ij ad ℥ij aquæ coquendo ad colat. ℥j.

ASARUM EUROPÆUM. Fibræ radicis; folia.

CL. *Dodecand.* O. *Monog.* Perennis; in locis umbrosis, nemorosis, montanis.

OF. *Asarum.* IT. *Asaro*, o *Nardo rustico.* G.

Asaret; cabaret. GE. *Haselwurzel.* A. *Common asarabacca.* H. *Asaro de Europa.*

QUAL. Heroïca: in principio acri, volatili re-

sidens; odor fragrans; sapor acris, nauseosus, amaricans.

VIRT. Emetica; cathartica; errhina; diuretica; sudorifica; menagoga.

USUS decocti. Hydrops; intermittentes. *Extern.* pulv. naribus attracti: cephalæa.

DOS. Pulveris: gran. x-xx-xxx; scopo errhino gran. iij-iv. cum saccharo; pro decocto drach. ij. ad ℥j aquæ, cujus unc. j. omni bihorio vel trihorio sumenda.

PRÆP. Extractum: dosis. gr. xx.

ASCLEPIAS ASTHMATICA. Radix.

CL. *Pentand. O. Digyn.* Fruticos. Zeylan.

IT. *Asclepiade.*

QUAL. Sapor dulci-acris, subnauseosus; odor vincetoxici.

VIRT. Subemetica; cathartica; expectorans.

USUS. Tussis; asthma pituitosum.

PRÆP. Decoctum; syrupus.

ASCLEPIAS VINCETOXICUM. Radix.

CL. *et O. præced.* Perennis; in locis nemorosis.

OF. *Vincetoxicum s. hirundinaria.* IT. *Vincitossico.* G. *Asclepiade*; *dompte-venin.* GE. *Schwalbenwurz.* A. *White et yellow officinal swallow-wort.*

QUAL. Lactescens; subvenenata; odor penetrans; sapor amaricans, acris, aromaticus.

MEDICA.

31

VIRT. Stimulans; diuretica; menagoga.

USUS. Hydrops?

ASPARAGUS OFFICINALIS. Radix.

CL. *Hexand.* O. *Monog.* *Perennis*; *hortensis*.

IT. *Asparago*, o *Sparagio*. G. *Asperge*. GE. *Spargel*. A. *Common asparagus*.

QUAL. Inodora; subdulcis; urinam odore foetido imbuens, qui acido instillato corrigitur.

VIRT. *Recentes*: diuretica.

USUS.

ASPERULA ODORATA. Herba.

CL. *Tetrand.* O. *Monog.* *Perennis*, in *sylvis umbrosis*.

OF. *Aspergula matrisylva* s. *hepatica stellata*.

IT. *Asperella*. G. *Aspergule*. GE. *Waldmeister*; *Sternleberkraut*; *Meserich*. A. *Sweet scented woodroof*.

QUAL. *Siccatae*: odor fragrans quem infuso communicat.

VIRT. Diuretica?

USUS. Infusi aquosi vel vinosi.

ASPHODELUS RAMOSUS. Radix.

CL. *Tetrand.* O. *Monog.* *Perennis*; *Europ. austr.*

OF. *Asphodelus*. IT. *Asfodelo*, *Asfodello*, o *Astula regia*. GE. *Goldwurz*. A. *Branchy asphodel*, or *king's spear*.

QUAL. *Recentis*: acris. *Siccatae*: mucilaginosi.

VIRT.

USUS.

ASPLENIUM CETERACH.

CL. *Cryptog. O. Filic.* Perennis; *Europæ.*OF. *Ceterach. herba.* IT. *Erba Cetrach.* G.*Ceterac.* A. *Common spleenwort.*

QUAL. Sapor subausterus, mucilaginosus.

VIRT. ?

USUS. Cachexiæ.

ASPLENIUM SCOLOPENDRIUM. Radix.

CL. *et O. præced.* Perennis.OF. *Scolopendrium s. lingua cervina.* IT. *Scolopendro, o Lingua cervina.* G. *Scolopendre.* A. *Hart's tongue spleenwort.*

QUAL. Substyptica.

VIRT. Subadstringens.

USUS. Cachexiæ.

ASPLENIUM RUTA MURARIA. Herba.

CL. *et O. præced.* Perennis.OF. *Ruta muraria.* IT. *Ruta muria.* G. *Rue des murailles.* A. *White maidenhair; wall-rue, or spleenwort.*

QUAL.

VIRT. ?

USUS.

ASPLENIUM TRICHOMANOIDES. Herba.

CL. *et O. præced.* Perennis.

OF. *Trichomanes* s. *dianthus ruber*. IT. *Adianto*
rosso, o *Polutrico*. A. *Common maidénhair*
or *spleenwort*.

QUAL.

VIRT. Subadstringens.

USUS.

ASTRAGALUS EXSCAPUS. Radix.

CL. *Dandelph*. O. *Decand*. Perennis; Hun-
gariæ.

IT. *Astragalo*. A. *Hairy polded. milk-vetch*.

QUAL.

VIRT. Antisyphilitica?

USUS *decocti* : Syphilis.

DOS. *Radicis siccatae concisæ* : unc. i-ij ad
℥iij aquæ coquendo ad colat. ℥ij quoti-
die sumend.

ASTRAGALUS GUMMIFER (LABISLARDIE-
BE). *Mons Libanon*.

N. B. Maximam partem gummi *Tragacanthæ*
vulgo venalis suppediat.

ASTRAGALUS TRAGACANTHA. Gummi.

CL. et O. præced. Fruticosi; orientalis et
Europ. austr.

N. B. *Tragacantha Cretica*. (Tournefort.)

OF. *Gummi tragacanthæ*. IT. *Gommi dragan-*
te. GE. *Tragacanth gumi*. A. *Goatsthorn*
milk-vetch; *gum tragant*.

QUAL. Mucilaginosæ.

VIRT. Involvens; obtundes.

USUS. Tussis; raucedo; stranguria.

ATHAMANTA CRETENSIS. Semen.

CL. *Pentand. O. Digyn. Perennis; Candicæ, alpina.*

OF. *Semen dauci cretici. IT. Dauco Cretico.*

GE. *Mohrenkümmel. A. Annual spignel.*

QUAL. Acris; aromatica.

VIRT. Carminativa; diuretica; menagoga.

USUS. Flatulentia; tussis stomachica.

ATHAMANTA OREOSELINUM. Herba; semen; radix.

CL. *et O. præced. Perennis; in locis montanis, siccis.*

OF. *Oreoselinum. IT. Oreoselino, o Appio montano. GE. Bergpetersilie; grundheil. A. Divaricated spignel.*

QUAL. Aromatica.

VIRT.

USUS.

ATROPA BELLADONNA. Folia; radix.

CL. *Pentand. O. Monog. Perennis; passim hortensis.*

OF. *Belladonna s. solanum læthale s. Sol. furiosum. IT. Belladonna, o Solano maggiore.*

G. *Belladone. GE. Tollkraut. A. Deadly nightshade; dwale.*

QUAL. Herolica: venenata; in principio nar-

ootico-residens; odor virosus; sapor acris, substypticus.

VIRT. Narcotica; antispasmodica; resolvens.

USUS *cautus*: Mania; melancholica; epilepsia; pertussis; hydrophobia; icterus inveteratus; hydrops. *Externus*. Scirrhus; cancer; fistula; arthrodynia rheumatica; ulcus malignum.

DOS. *Pulveris folior. aut rad. siccata.* gran. j. gradatim ascendendo ad gran. vj. de die in adultis; infantibus gran. $\frac{1}{2}$ gran. $\frac{1}{4}$ ad gran. ij-iiij.

IV. B. MENCH ad preveniendam aut curandam hydrophobiam dat *radicem* omni secundo die in aqua calida, vel cerevisia adultis gran. x-xv; infantibus sex annorum gran. v: quatuor annorum gran. iiij. — *Folia siccata*: adultis gran. xii-xvj. et post 43 horas gran. x-xiiij. — Eadem pro infuso aquoso, scrup. j. ad unc. x. aquæ fervidæ, huiusque unc. ij adultis dantur primis diebus, dein quotidie augendo dosin, donec siccitas et tensio faucium aut vertigo appareant. *Externus*: forma pulveris, vel cataplasmatidis.

PRÆP. Succus foliorum inspissatus, vulgo *extractum*.

ATROPA MANDRAGORA. Radix.

CL. et O. præced. Perennis; Europ. austr.

OF. *Radix mandragoræ*. IT. *Mandragola*. G.

Mundragore. GE. *Alraunwurzel.* A. *Mandrake.*

QUAL. Venenata: in principio narcotico residens. *Cortex radices:* acris.

VIRT. Narcotica; antispasmodica; *corticis radices.* cathartica; menagoga.

USUS. *Pulv. radices externus forma cataplasmatidis:* Scirrhus; scrophula; tumor testiculi. *Internus:* epilepsia?

AVENA SATIVA. Semen excorticatum; farina.

CL. *Triand.* O. *Digyn.* Annua.

OF. *Avena.* IT. *Avena,* o *Vena.* G. *Gruau d'avoine.* GE. *Hibergrüze.* A. *Cultivated white oat:* oatmeal.

QUAL. Insipida; farinacea.

VIRT. Demulcens; emolliens; nutriens.

USUS. Forma decocti, cataplasmatidis.

AVICENNIA TOMENTOSA. Nucleus; succus putaminis.

CL. *Didyn.* O. *Angiosp.* Arborea; utriusque *Indiæ.*

OF. *Anacardium orientale.* *Noce metella Orientale.*

QUAL. *Nuclei:* dulcis; oleosa. *Putaminis:* acerrima.

VIRT. *Nuclei:* nutriens. *Putaminis:* corrodens; caustica.

USUS *succi:* cum calce mixtus characteres pan-

nis gossypinis et linteis indelebiles imprimi. *Putaminis*: Morosis; obliuio?

B

BALSAMEA MECCANENSIS (GLEDITSCH).

Balsamum.

CL. *Octand.* O. *Monog.* *Arbor*; *Arabiae yemen.* *Mecca.*

CARACT. *Cal* 5-partitus. *cor.* 5-petal. æqualis, rubra. *stamin.* 10. longa calici inserta. *pistil.* 1. superum. *styl.* 1: *stigm.* obtus. *fol.* bipinnata: foliolis lanceolatis.

Amyris gileadensis seu *opobalsamum* LINN.

NOMEN NATALE. Balessan.

OF. *Balsamum de mecca*; *opobalsamum verum*; *balsamum gileadense.* IT. *Opobalsamo*, o *Balsamo della Mecca.* G. *Beaume de mecca.* GE. *Meckabalsam.* A. *Balsam of judda*; *balsam of gilead.*

OPOBALSAMUM viridescens, incisione ramulorum;

CARPOBALSAMUM expressione fructus maturi;

XYLOBALSAMUM rubescens, expressione et decoctione ramulorum obtinetur. (BRUCE.)

QUAL. Præstans: tenaci-liquida; odor fragrans, gratus; sapor acris, amaricans.

VIRT. Stimulans; diuretica; cosmetica.

USUS. Blennorrhœa; tabes; morbi pituitosi; maculæ cutis.

DOS. gutt. xv-xxx-L. cum saccharo, vitello ovi, aut haustu aquæ.

BANKSIA ABYSSINICA (BRUCE.) Flores
 CL *Tetrand.* O. *Monog.* Arborea; Abyssin.
 NOMEN NATALE: Cusso.

QUAL.

VIRT. Anthelminthica.

USUS *infusi*: ascarides.

DOS. Manip. j. florum ad ℥ iv. cerevisiæ per
 12 horas digerendo.

BELLIS PERENNIS. Flores; herba.

CL. *Syng.* O. *Polyg. superfl.* In pratis.

OF. *Bellis minor.* IT. *Margheritina.* G. *Malsleben.* GE. *Gaenseblumen.* A. *Common daisy.*

QUAL.

VIRT.?

USUS. *Tabes.*

BERBERIS VULGARIS. Baccarum recentium
 succus; cortex.

CL. *Hexand.* O. *Mong.* *Fruticosa.*

OF. *Berberis.* IT. *Berbero, Trispina, o Crespi-*
no. G. *Epine-vinette; vinetter.* GE. *Sauer-*
dorn-beeren. A. *Common berberry.* H. *Agracejo.*

QUAL. *Baccarum*: sapor intense acidus. *Cort-*
tis: flava; sapor amarus.

VIRT. Refrigerans; antiseptica. *Cort.* tinctoria.

USUS. Febres acutæ; cholera. *Cort.* icterus;
 leucorrhœa.

PRÆP. Succus; syrupus; conditum baccarum.

BETA CICLA.

Succus radicis.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.*

Hortensis.

OF. *Beta alba.* IT. *Bieta.*

QUAL. Sapor aquosus, dulcis.

VIRT. Errhina.

USUS.

BETA VULGARIS.

Radicis succus.

CL. et O. *præced.*

Hortensis.

OF. *Beta rubra.* IT. *Bietola*, *Bieta*, o *Sicla rossa.*

QUAL. et VIRT. Eadem ac *præced.*

BETONICA OFFICINALIS.

Herba et flores;
radix.

CL. *Didyn.* O. *Gymnosp.*

Perennis.

OF. *Betonica.* IT. *Bettonica.* G. *Betoine.* GE.

Betonien. A. *Wood-betony.*

QUAL. Odor nidosus, halituosus. *Radic. nau- seosa.*

VIRT. Nervina? Errhina? *Radic. emetica.*

USUS.

BETULA ALBA.

Folia tenerrima; epider-
mis; lymph.

CL. *Monœc.* O. *Tetrand.* *Arborea; Europæ.*

OF. *Betula.* IT. *Betula*, o *Sicla bianca.* G.

Le bouleau ordinaire GE. *Birkenbaum.* A.

Common birch-tree. H. *Abidusblanco.*

QUAL. Olei: suaveolens.

VIRT.?

USUS foliorum : Erysipelas. *Succi saccharini* (vulgo lymphæ dicti) terebro ex arbore primo vere obtenti : Morbi cutis ; scorbutus ; lumbrici.

PRÆP. Oleum epidermidis nigrum.

BIGNONIA OPHTHALMICA. Radix ; succus expressus.

CL. *Didyn. O. Gymnosp.* Frutic. Amer. meridion.

QUAL.

VIRT.

USUS succi expressi vel decocti : ophthalmia membranarum.

DOSIS. guttula una succi vel guttula una altera decocti oculo instillatur omni mane. (CHISHOLM).

BIXA ORELLANA. Radix et fæcula ex capsulis seminum arte obtenta.

CL. *Polyg. O. Monog.* Arborea ; Indiæ occident.

OF. *Terra orellana s. orlema.* IT. *Esca*, *Fungo preparato.* G. *Rocoa.* A. *Hurtleaved bixa ; or anotta.*

QUAL. Fæculæ : rubra ; odor mucidus ; sapor subamaro stypticus.

VIRT. Radicis : diuretica.

USUS radicis et fæculæ : tinctorius. Pigmentum corpori illitum contra morsus culicum munit.

BOLETUS IGNIARIUS. Quercui, tiliæ aut fago putrescentibus insidens.

CL. *Cryptog. O. Fungi.*

OF. *Agaricus quernus s. agaricus chirurgorum, s. fungus quercinus.* IT. *Esca, Fungo preparato.* G. *Agaric de chêne.*

QUAL.

VIRT. Mechanice sanguinem sistens.

USUS *externus*, ablato ab utraque parte tegmine contusus: Hæmorrhagiæ.

BOLETUS LARICINUS. Larici insidens.

OF. *Agaricus albus optimus.* IT. *Agarico del Larice.* G. *Agaric.* GE. *Lerchenschwam.*

QUAL. In principio resinoso acri residens; sapor nauseosus, amaricans.

VIRT. Drastico-cathartica; emetica.

USUS *intern.* hirudo deglutia; sudor phthysicorum. *Extern.* hæmorrhagiæ. *Pulv.* *inpersi*: ulcera.

DOS. Gran. ij.

BOLETUS SUAVEOLENS. Salici insidens.

OF. *Fungus salicis, seu fungus albus saligneus.* IT. *Fungo di Salcio.*

QUAL. Odor suaveolens.

VIRT. ?

USUS. Mucilagine humectatus, leniter siccatus et cum alcoholis pauxillo in pulverem tritus: Tabes pulmonalis; asthma spasmodicum,

Dos. Pulveris drach β -ij. bis de die cum saccharo.

BORAGO OFFICINALIS. Herba et flores.

CL. *Pentand. O. Monog.* *Annua.*

G. *Bourache.* **IT.** *Borragine.* **A.** *Common borage.*

QUAL. Oleracea.

VIRT.?

USUS.

BRASSICA ERUCA. Semen; folia.

CL. *Tetradyn. O. Siliquos.* *Annua; montana.*

OF. *Erucae semen.* **IT.** *Ruchetta, o Rucola.*

G. *Roquette des jardins ou annuelle.*

QUAL. In acri volatili residens; sapor acris, fervidus, penetrans, fere ut sinapis.

VIRT. *Veteribus aphrodisiaca?*

USUS. Paralysis linguæ.

BRASSICA OLERACEA. Folia

CL. et *O. præced.* *Hortensis.*

OF. *Brassica capitata alba et rubra; aliæque varietates.* **IT.** *Cavolo cappuccio, bianco, paonazzo, ec. ec.* **G.** *Choux.* **A.** *Cabbage.*

QUAL. Aquosa; inodora.

VIRT.

USUS. Cocta, vel muriate sodæ condita, germanis sub nomine *Sauerkraut*: scorbutus. *Forma cataplasmatidis* mammis puerperarum applicata ad coagulum lactis impediendum.

Decocti: Raucedo; tussis; scorbutus; com-
bustura.

BRASSICA RAPA. Radix recens,
CL. et O. *præced.* Biennis; hortensis.
OF. Rapa. IT. Rapa. G. Weisse rüben. A.
White turneps.

QUAL. *Succi*: in principio saccharino et mu-
cilaginoso residens.

VIRT. Flatulenta; diuretica.

USUS *succi expressi*: Tabes; asthma; strangu-
ria. *Radicis recentis forma cataplasmatidis*:
Pernio, podagra? *Succi*: Otalgia; aphtha.

PRÆP. Syrupus frigide e succo paratus.

BROMELIA ANANAS. Bacca (vulgo fru-
ctus); cortex exterior recens.
CL. *Hexand.* O. *Monog.* Perennis; Americ.
merid.

OF. *Ananas fructus.* IT. *Ananasso.* A. *Queen*
pine-apple.

QUAL. Olor ambrosiacus; sapor gratissime
acido-dulcis, subacris.

VIRT. Analeptica. *Cortic*: menagoga.

USUS.

PRÆP. Liqueur *Italis* NAJANA dictus.

BRUCEA FERRUGINEA Cortex.
(HERITIER).

Brucea antidysenterica. Abyssin. (MILLER).

N. B. An cortex argusturæ officinarum?

NOMEN NATALE: *Wooginoos*. IT. *Correccia d' Angustura*.

QUAL.

VIRT. Antidysenterica. (BRUCE.)

USUS. Dysenteria.

DOS. Pulveris $\text{ʒ}\beta$ mane et vesper. in haustu lactis recenter mulsi, abstinendo ab omni potu post usum ejus. (BRUCE.)

BRYONIA ALBA.) Radix recens; succus ra-
———— DIOICA.) dicis inspissatus.

CL. *Monac.* O. Syngen. *Pereunis*; in sepibus.

OF. *Bryonia*. IT. *Brionia*, *Vitalba*, *Fescera*, o *Rorastro*. G. *Brione*; *couleuvrée*. GE. *Glehtrüben*; *zaunrüben*. A. *White briony*. H. *Nueza blanca*.

QUAL. Præstans: in principio acri, volatili residens; sapor acris, intense amarus; odor nauseosus.

VIRT. Drastico-cathartica; diuretica, anthelmintica; menagoga. *Externus*: Rubefaciens; resolvers.

USUS forma pulveris vel infusi: Hydrops, asthma; mania; epilepsia; arthrodynia rheumatica. *Externus radice contusæ* forma cataplasmatibus: Edema; lupia; ecchymoma.

DOS. *Pulv. radice siccata*: drach. $\text{ʒ}\beta$. *Succi inspissati*: drach. ij- $\frac{3}{4}$.

PRÆP. Syrupus ex succo recenti paratus; succus inspissatus, vulgo *extractum*.

BUBON GALBANUM. Succus gummi-resinosus incisione obtentus, inspissatus.

CL. *Pentand. O. Digyn.* Perennis; *Afric.*

OF. *Gummi galbanum.* IT. *Galbano.* GE. *Galbanum.* Mutterharz. A. *Long-leaved bubon.*

QUAL. In oleo volatili residens: sapor amaro-acris; odor alliaceus, penetrans.

VIRT. Stimulans; antispasmodica; menagoga; expectorans; resolvens.

USUS. Hysteria; asthma; amenorrhœa; asthenia. *Externus* scopo resolvendi aut maturandi: Tumores.

DOS. Gran. xx-3j forma emulsionis vel pilularum.

PRÆP. Emplastrum.

BUBON MACEDONICUM. Semen; herba.

CL. et O. *præced.* Biennis.

GF. *Petroselinum Macedonicum.* IT. *Prezzemolo Macedonico.* G. *Persil de Macedoine.* A. *Macedonian bubon or parsley.*

QUAL. Sapor aromaticus, dulcescens.

VIRT. Carminativa; diuretica; menagoga.

USUS. Syphilis?

BUPLEURUM ROTUNDIFOLIUM. Herba; semen.

CL. *Pentand. O. Digyn.* *Annua.*

OF. *Perfoliata.* IT. *Bupleuro.* A. *Round leaved hare ear; or thorow-wax.*

QUAL. Subaromatica.

VIRT. ?

USUS.

BURSERA GUMMIFERA.

CL. *Hexand. O. Monog.*A. *Jamaica birch-tree.*

N. B. Quidam et hac planta quassiam
 simarubam derivant; cujus corticem virtute
 æmulat.

BUXUS SEMPERVIRENS. Lignum; folia.

CL. *Monœc. O. Tetrand.*IT. *Busso. A. Comon Tree Box.*

QUAL. Odor teter, foetidus; sapor amarus.

VIRT. Sudorifica; alterans; *folior.* cathartica.

USUS *decocti*: Epilepsia, syphilis? *Olei*: Hir-
 suties?

C

CACHRIS ODONTALGICA. Radix.

CL. *Pentand. O. Digyn.*IT. *Rosmarino coronario. G. Amarinte.*

QUAL. Sapor acris, urens.

VIRT. Sialagoga.

USUS loco anthemidis pyrethri: Odontalgia rheu-
 matica.

CACTUS OPUNTIA.

Folia.

CL. *Icosand. O. Monog.*

Fruticosa; Europ.
austr.

MEDICA.

47

OF. *Opuntia folia*. IT. *Fico d'India*, *Opuntia*. A. *Common Indian fig*.

QUAL. Mucilaginoso.

USUS *externus* foliorum calore mollitorum et medio dissectorum forma cataplasmatidis : Dolores ; dysenteria ; arthrodynia.

CÆSALPINIA CRISTA.)
 ————— SAPPAN.) Lignum.

OF. *Lignum Brasiliense*. IT. *Legno del Brasile*.

CALAMUS ROTANG. Resina fructum tegens.

CL. *Hexand. O. Monog. Fruticosa ; Indica*.

OF. *Sanguis draconis*. IT. *Sangue di Drago*.

G. *Sang dragon*.

N. B. Vide etiam *dracæna draco*, et *ptero-
 carpus draco*, ex quibus promiscue
 desumitur resina draconis.

CALENDULA OFFICINALIS. Folia et flores.

CL. *Syng. O. Polyg. necess. Annuo ; Europ. austr.*

VAR. A. *Fore simplici*. B. *Flore pleno*.

OF. *Calendula*. IT. *Calendola*, *Calta*, o *Fior d'ogni mese*. G. *Souci*. GE. *Ringelblumen*.

A. *Common et double flowered marigold*.

QUAL. Flava ; sapor amaricans.

VIRT. ?

USUS.

CAMBOGIA CUTTA. Succus gummi resinoso.

sus incisione ramulorum obtentus, inspissatus.

CL. *Polyand.* O. *Monog.* *Arborea; Indica.*

OF. *Gambogia*; *gummi gutta*; *gutta gamba.*

IT. *Gotta gomma.* G. *Camboge*; *gomme-gutte.* GE. *Gummigutt.* A. *Gamboge.*

QUAL. *Heroica*: *lutea*; *opaca*; in principio *resino gummoso residens*; *insipida*; *inodora.*

VIRT. *Drastico-cathartica*; *diuretica*; *subemetica.*

USUS. *Hydrops*; *obstipatio*; *tcenia*; *icterus*; *quartana*; *cachexiæ*; *morbi cutis.*

DOS. *Gran.* iij-iv. *pulveris cum saccharo triti omni trihorio in hydropse.* In *tcenia* gr. x-xx. in *obstipatione* gr. j-ij.

PRÆP. *Tinctura* dos. ʒj-ij.

N. B. *Antidotum* ejus est *alkali.*

CAMPHOROSMA MONSPELIENSIS. *Herba.*

CL. *Tetrand.* N. *Monog.* *Annua; Europ. austr.*

OF. *Camphorata.* IT. *Canforata.* G. *Camphrée.*
A. *Hairy camphorosme.*

QUAL. *Subaromatica.*

VIRT. *Nervina*; *sudorifica*; *resolvens.*

USUS. *Hysteria*; *leucorrhœa*; *asthma*; *arthrodynia rheumatica*; *coryza.*

CANELLA ALBA. *Cortex interior arboris.*

CL. *Dodec.* O. *Monog.* *Arborea; Ind. oc-*
Wintera canella (PALLAS). *cident.*

OF. *Canella alba.* IT. *Corteccia Winterana.*

spuria. GE. *Weisser zimmt.* A. *Laurel-leaved canella.*

QUAL. Aromatica; sapor leviter acris, amaricans.

VIRT. Stimulans; carminativa.

USUS. Dyspepsia.

DOS. Drach. β . j-ij in infuso: gran. xxx. in pulvere.

* CANNABIS SATIVA.

Semen.

CL. *Dicæc.* O. *Pentand.*

Annua.

OF. *Semina cannabis.* IT. *Canapa.* G. *Semen-ces du chanvre.* GE. *Hanfesaamen.* A. *Hempseed; common hemp.*

QUAL. Præstans: in principio oleoso et mucilaginoso residens; odor virosus.

VIRT. Involvens; sedativa.

USUS *infusi aut emulsionis*: *Blenorrhagia; stranguria; tussis catarrhalis.*

DOSIS: unc β -j. ad aquæ ℥ iv in infuso.

PRÆP. *Oleum fixum.*

CAPPARIS SPINOSA.

Cortex radicis.

CL. *Polyand* O. *Monog.*

Fruticosa; Europ. austr.

OF. *Capparis.* IT. *Cappero, o Capparo.* G. *Capres.* A. *Prickly caper-bush.*

QUAL. Sapor amaricans, substypticus.

VIRT. Adstringens; diuretica.

USUS. *Obstipatio; physconia abdominalis; paralysis.*

50 M A T E R I A
PRÆP. Oleum fixum.

CAPSICUM ANNUUM.

Fructus.

CL. *Pentand. O. Monog.*

Annua.

OF. *Piper Indicum, Hispanicum, Turcinum.*

IT. *Pepe d' India, o Peperone. G. Capsique; poivre d' Indie. G. Spanischer, oder türkischer pfeffer. A. Cayenne-pepper; indian pepper or capsicum.*

QUAL. *Eximia: in principio resinoso residens; sapor acris, urens.*

VIRT. *Stimulans; stomachica; rubefaciens.*

USUS. *Dyspepsia; cardialgia arthritica; coryza; intermittentes.*

CAPSICUM BACCATUM.

Fructus.

IT. *Pepe della Cajenna. A. Small fruited capsicum. or Bird-pepper.*

QUAL. et VIRT. *Eadem ac præced.*

CARDAMINE PRATENSIS.

Petala (vulgo flores) et folia.

CL. *Tetrad. O. Siliquos.*

Perennis.

OF. *Flores cardamine; nasturtium pratense.*

IT. *Cardamina, Cardamantina, o Nasturtio selvaggio. G. Cresson élégant; cresson des prés; passeraie sauvage. GE. Wiesenkresse. A. Ladies smock; cullow-flower.*

QUAL. *In principio subacri residens.*

VIRT. *Petalorum: Antispasmodica. Folior. Antiscorbutica.*

MEDICA.

51

USUS *petalorum*: Convulsio; chorea.

DOSIS: pulv. *petalorum* scrup.j-drach. ℞.

CARDUUS MARIANUS. Semen; herba.

CL. Syng. O. Polyg. æqual. Annua.

OF. *Carduus marianæ*. IT. *Cardo del latte*, •

Cardo di s. Marta. A. *Milk-thistle*.

QUAL. *Semin*: oleosa: *herbæ*: amara.

VIRT.

USUS. Carcinoma?

CAREX ARENARIA. Radix.

CL. *Menœc*. O. *Triand*. *Perennis*; *in arenosis*.

OF. *Gramen rubrum*. IT. *Carice*. G. *Luiche*
des sables. GE. *Sandiedgras*; *rothe graswur-*
zel. A. *Sea-carex*.

QUAL. *Radicis recentis*: odor resinoso-tere-
binthinaceus; subdulcis.

VIRT. Sudorifica; diuretica.

USUS loco sarsaparillæ: Morbi cutis; syphi-
lis. (GLEDITSCH).

CARICA PAPAYA. Semen.

VIRT. Anthelmintica.

CARLINA. ACAULIS. Radix.

CL. Syng. O. Polyg. æqual. *Perennis*; *alpina*.

OF. *Carolina cardopatia*. IT. *Carlina*, o *Ca-*
meleo bianco. GE. *Eberwurzel*. A. *Dwarf*
Carlina.

QUAL. Præstans: odor graveolens, penetrans; sapor acris, amarus, aromaticus.

VIRT. Stimulans; stomachica; sudorifica.

USUS. Physconia abdominalis; morbi cutis; hysteria?

CARTHAMUS TINCTORIUS. Semen; flores.

CL. Syng. O. Polyg. æqual. Perennis; alpina.

IT. *Cartamo*, *Croco Ortense*, o *Zifferano Saracinesco*. **G.** *Carthame*. **A.** *Bastard saffran*.

QUAL. Lutea; tinctoria; sapor nauseosus.

VIRT. Cathartica; diuretica.

USUS. Tussis senilis; asthma pituitosum; icterus.

CARUM CARVI.

Semen.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.*

Biennis.

OF. *Semen carvi*. **IT.** *Carvi*, *Ciro*, o *Comino Tedesco*. **GE.** *Gemeiner oder Wiesenkümmel*; *feldkümmel*. **A.** *Common carraway-seed*. **H.** *Alcaroea*.

QUAL. Præstans: in oleo volatili residens; sapor aromaticus, acris, calefaciens.

VIRT. Stimulans; carminativa; lactifera; resolvers.

USUS. Colica; intermittentes.

DOSIS: pulv. ℥j-℥j; in decocto ℥j ad aquæ ℥j.

PRÆP. Tinctura; oleum volatile.

CARYOPHILLUS AROMATICUS. Flores cum pericarpio immaturo. (*Vulgo caryophylli*).

CL. *Polyand* O. *Monog.* *Arborea; Indica.*

OF. *Caryophulli aromatici.* IT. *Garofano.* G. *Giroffles.* GE. *Gewürznelken.* A. *Cloves.*

QUAL. In oleo volatili et principio acri-resinoso residens; odor gratus, fragrans, penetrans; sapor atomaticus, acris, urens.

VIRT. Stimulans; calefaciens; sialagoga; stomachica; menagoga.

USUS. Dyspepsia; paralysis linguæ; odontalgia.

DOSIS: \mathfrak{D} β -3j in pulvere vel infuso aquoso vel vinoso.

PRÆP. Oleum volatile.

CASSIA ALATA. *Folia.*

CL. *Decand.* O. *Monog.* *Fruticosa; Ind. orient. et occident.*

QUAL. Sapor amarus, nauseosus.

VIRT. Cathartica.

USUS. Herpes.

CASSIA FISTULA. *Fructus; pulpa fructus.*

CL. *et* O. *præced.* *Arborea; AEgypt. Ind. orient.*

OF. *Cassia fistula.* s. *Fistularis; pulpa cassiæ.*

IT. *Cassia in baccelli, o in canna.* G. *Casse.* GE. *Rohrkassie.* A. *Purging cassia.*

QUAL. Sapor acidulo-dulcis, mucilaginosus, subnauseosus.

VIRT. Cathartica.

USUS: Obstipatio.

DOSIS. unc. β -ij.

CASSIA SENNA.

Folia.

CL. O. præced.

Fruticosa; Afric.

OF. *Folia sennæ*. IT. *Sena Alesandrina*, ed *Ita-*
lica. G. *Sené*. GE. *Sennes-blaetter*. A. *Senna*
or *Ægyptian cassia*.

QUAL. Odor nauseosus; sapor subacris, ama-
ricans.

VIRT. Cathartica.

USUS: Obstipatio. Extern. Herpes.

PRÆP. Tinctura; infusum.

DOSIS. *Pulveris*. \mathfrak{B} j - \mathfrak{Z} β . *Infusi*: drach. iij-
iv ad \mathfrak{Z} vi aquæ a'dito semine aromatico
coriandri sativi, cardamomi vel carvi, etc.
Tincturæ \mathfrak{Z} β - j β .

CASSINE PERAGUA.

Folia.

CL. Pent. O. Trigyn.

Artor; Virgin. et
Carolin.

OF. *Folia peragua*; *apulachine*. IT. *Tè del*
Paraguai? G. *Piraguay tea*.

QUAL. Præstans.: sapor intense amarus.

VIRT. Emetica; cathartica; diaphoretica; ex-
pectorans.

USUS. Diabetes? Colica nephritica? Morbi pi-
tuitosi pulmonum.

CEANOTHUS AMERICANUS.

Stipites.

MEDICAE.

55

CL. *Pent. O. Monog.* Frutex; Virgin. et Carolin.

A. American. *Ceanothus* or new Jersey-tea.

QUAL. Rubra.

VIRT. Alterans.

USUS pulveris externus: ulcera syphilitica.

CENTAUREA BEHEN. Radix.

CL. Syng. O. Polyg. frust. Perennis; Libanon.

OF. Radix Behen albi. IT. Ben bianco, Ghian-da unguentaria.

QUAL. Odorata; sapor acris.

VIRT. ?

USUS.

CENTAUREA BENEDICTA. Folia; herba; semen.

CL. et O. præced. Annua, hortensis.

OF. *Carduus benedictus*. IT. *Cardo Santo*, o *Benedetto*, o *Erba Turca*. G. *Cardon-bénit*.

GE. *Kardebenedikienkraut*. A. *Blessed thistle* or *centaury*. H. *Cardo santo*.

QUAL. *Herbæ* præstans: sapor pure et intense amarus. *Semen*: dulcis; mucilaginosus.

VIRT. Stomachica; antacida; subemetica.

USUS extracti, infusi vel decocti: Dyspepsia; intermittentes; leucophlegmatia; icterus; physconia abdominal. extern. ecchymoma.

DOSIS extracti: ʒj.

CENTAUREA CALCITRAPPA. Radix.

6 *

CL. et O. præced.

Annua.

OF. *Carduum*; *carduus stellatus*; *centaurea stellata*. IT. *Cardo stellato*. G. *Centauree étoilée*; *chardon étoilé*; *chausse-trappe*; *pignerole*. GE. *Ritterspornwurzel*. A. *Common star-centaury* or *thistle*.

QUAL. Sapor amarus.

VIRT. Stomachica.

USUS: Intermittentes; dyspepsia.

CENTAUREA CYANUS.

Flores.

CL. et O. præced.

Annua.

OF. *Flores cyani*. IT. *Ciano minore*, o *Monichetta*. GE. *Blaue kornblumen*. A. *Blue bottle*.

QUAL. Cærulea.

VIRT.

USUS. Chemicus pro reagente.

CERATONIA SILIQUA.

Fructus.

CL. Polyg. O. Diæc. Arborea; Syriae; Siciliae.

OF. *Siliqua dulcis*. IT. *Carruba*. GE. *Johannis brod*; *Fockshorn*. A. *Carobtree*, or *St. John's bread*.

QUAL. Dulcis; mucilaginoso.

VIRT. Demulcens; expectorans.

USUS decocti: Raucedo; tussis ab acri, catarrhus.

CHAEROPHYLLUM SYLVESTRE.

Herba

CL. Pentand. O. Digyn.

OF. *Herba cicutariae*. IT. *Cicutaria*, o *Cerefo-*

MEDICA.

57

glia Silvestre. G. Persil d'âne. A. Wild chervil, or cow-weed.

QUAL. Odor subfoetidus; sapor amaricans.

VIRT.

USUS: Physconia abdominal.

CHEIRANTHUS CHEIRI.

Flores.

CL. *Tetradyn. O. Siliq.*

Europ. austr.; hortensis.

OF. *Flores cheiri; viola lutea; leucolum luteum. IT. Leucoro, o Leucojo, e Viola giulla. G. Violier jaune. GE. Gelbe weichen. A. Wild wallflower.*

QUAL. Lutea; odor fragrans; in principio volatili residens.

VIRT. Nervina; narcotica.

USUS: Dolores; amenorrhæa; icterus; physconia abdominalis.

CHELIDONIUM MAJUS.

Radix; herba recens.

CL. *Polvand. O. Monog.*

Perennis.

OF. *Chelidonium. IT. Celidonia. G. Chélidoine éclair. GE. Schellwurzelt; schwalbenkraut. A. Common celadine.*

QUAL. Præstans: in principio acris volatili residens; odor nauseosus; sapor amarus, acris; succus luteus.

VIRT. *Radicis recentis*: Diuretica; resolvens.

USUS *internus decocti*: Cachexiæ; tabes; icterus hydrops; morbi cutanei.

DOS. *Succi externus*: Verruca; herpes; ulcus phagedænicum; pterygium.

CHENOPODIUM AMBROSIoidES. Herba;
semen.

CL. *Pentand.* *O. Digyn.* *Mexicana.*

OF. *Botrys Mexicana seu chenopodium Mexicanum.* **IT.** *Ambrosia.* **A.** *Mexican goose-foot.* **H.** *Té de Espanna.*

QUAL. *Eximia*: odor fragrans; sapor acris, aromaticus.

VIRT. *Nervina*; stimulans. *Seminum*: anthelmintica; carminativa.

USUS: Paralysis; asthenia nervosa; dyspepsia; flatulentia; vermes.

PRÆP. Tinctura; infusum.

CHENOPODIUM ANTHELMINTHICUM. Semen.

CL. *et O. præced.* *Perennis*; *Pensylv.*

A. *Shrubby goose-foot.*

QUAL. *Præstans*: odor graveolento-fragrans; sapor aromaticus.

VIRT. Anthelmintica.

USUS: Lumbrici.

CHENOPODIUM BONUS HENRICUS Herba.

OF. *Herba boni Henrici.* **IT.** *Spinace selvatico.* **A.** *Angular leaved goose-foot, or English mercury.*

QUAL. *Oleracea*; fatua.

VIRT. Refrigerans; eccoprocrotica.

USUS externus: Paronychia; ulcera; varix ani?

CHENOPODIUM BOTRYS. Herba.

CL. et O. præced. Annuæ; Europ. aust.

OF. *Herba botryos*. IT. *Botri*. G. *Botrys*. GE. *Traubenkraut*. A. *Jerusalem-ouk*; or *cut-leaved goose-foot*. H. *Bien granade*.

QUAL. et VIRT. *Chenopodii ambrosioid*. seed debilior.

CHENOPODIUM RUBRUM. Herba.

OF. *Atriplex sylvestris*. IT. *Atriplice salvatica*. A. *Red goose-foot*.

QUAL. Aquosa.

VIRT.

CHENOPODIUM VULVARIA. Herba.

CL. et O. præced. Annuæ.

OF. *Vulvaria*; *atriplex fœtida* s. *Olivæ*. IT. *Atriplice fetido*, e *canino*, *Vulvaria*, o *Gargosmo*. G. *Vulvaire*; *arrique puant*; *anserine fétide*. GE. *Stinkende melen*; *hunds-melte*. A. *Stinking goose-foot*, or *orache*.

QUAL. Præstans: odor fœtidus, hircinus.

VIRT. Antispasmodica.

USUS. Hysteria.

CHRYSANTHEMUM LEUCANTHEMUM. Herba et flores.

CL. Syng. O. Polyg. superfl. Perennans; in pratis.

● *F. Bellis hortensis. s. pratensis. IT. Occhio di Bue. A. Ox-eye daisy or chrysanthemum.*

QUAL. Subacris; penetrans; piperata in decocto.

VIRT. Diuretica.

USUS: Asthma; tinea?

CICHORIUM INTYBUS. Radix; herba.

CL. Syng. O. Polyg. æqual. Biennis.

● *F. Cichoreum. IT. Cicoria, o Radicchio. G.*

Chicorée sauvage. GE. Wegwart; hund-

laeust; zichorienwurzel. A. Wild endivoy or

sucory. H. Achicorea sylvestre.

QUAL. Recentis: In succo lacteo intense amaro residens.

VIRT. Deobstruens; stomachica; diuretica.

USUS decocti: Icterus; dyspepsia; physconia abdomin.

CICHORIUM ENDIVIA. Herba; semen.

IT. Indivia, ed Endivia. G. Endive. A. Common eadive.

QUAL. Oleracea.

VIRT. Eccoproctica.

USUS.

CICUTA VIROSA.

Herba; radix.

CL. Pentand. O. Digyn.

In aquis stagnantibus, putridis.

● *F. Cicuta aquatica. IT. Cicuta acquatica.*

G. Ciguë aquatique. GE. Wasserschierling. A.

Water hemlock.

QUAL. Venenata; odor teter; sapor acris.
VIRT. Narcotica; resolvens.

CIMICIFUGA FÆTIDA. Herba.

CL. *Polyand.* O. *Tetragy.* *Sibirica.*

QUAL. Præstans: odor teter; sapor amarus.

VIRT. Antispasmodica; resolvens.

USUS: Ataxia; spasmi; bronchocele?

CINCHONA ANGUSTIFOLIA. (SWARZ).

Cortex.

CL. *Pent.* O. *Monog.* *Arbuscula; insulæ*
Doming.

IT. *China di s. Domingo.*

QUAL. Sapor intense amarus, subdulcis, subaromaticus.

VIRT. Roborans; stomachica.

USUS: Febres intermittentes et remittentes;
dyspepsia; asthenia.

CINCHONA CARYBÆA. Cortex.

CL. et O. *præced.* *Arborea; Ind. occident.*

OF. *China carybæa; cortex St. Luciae; cin-*
chona Jamaicensis. IT. *China della Giamaica.*

QUAL. Sapor substypticus; magis amarus, sed minus aromaticus quam cinchonæ officinalis.

VIRT. Roborans; adstringens; stomachica.

USUS: Febres remittentes; intermittentes;
typhus.

CINCHONA CORYMBIFERA. (FORSTER)
Cortex.

CL. et O. præced. Arborea; Ind. occident.
IT. *China di St. Fé.*

Nota Idem ac Cortex de St. Fé esse videtur.

QUAL. Sapor intense amarus, substypticus.

VIRT. Stomachica; subastringens.

USUS idem ac præced.

CINCHONA FLORIBUNDA. (SWARZ).
Cortex.

CL. et O. præced. Arborea; Ind. occident.

OF. *Cinchina Sanctæ Lucæ.* IT. *China di St. Lucia.*

QUAL. Sapor amarus, stypticus.

VIRT. et USUS præced.

CINCHONA MONTANA. (BADIER) Cortex.

CL. et O. præced. Arbor insulæ Martinique et Guadeloupe.

OF. *China-piton.* IT. *China montana.*

QUAL. Sapor intense amarus, stypticus.

VIRT. Emetica; cathartica.

USUS.

CINCHONA: OFFICINALIS. Cortex.

CL. et O. præced. Arborea; Peruviana, montana.

OF. Cortex peruvianus; chinchini; cortex chinæ. IT. *Chinchina.* G. *Quina.* GE. *Fiebertale; kinrinle.* A. *Peruvia bark.* H. *Quina; cascarilla de Ioxa.*

M E D I C A.

63

QUAL. Heroica: in principio adstringente resinoso et amaro mixto residens; sapor tenacissime amarus, substypticus.

VIRT. Antiseptica; roborans; adstringens; stomachica.

USUS. Febres atonicæ, putridæ, intermittentes, remittentes; asthenia; ataxia; spasmi; pertussis; tabes pituitosa, diarrhœa; scrophula; gangræna; sphacelus; ulcera phagedænica; arthrodynia a debilitate. *Internus et externus*: forma pulveris; extracti; electuarii; infusi in aqua calcis, alcohole, vino, aqua; decocti: tincturæ; fots; cataplasmatibus; ænematis: *Pulv. externus* frictione cum saliva ventri adplicatus in junioribus, omni bihorio vel trihorio tempore remissionis vel intermissionis.

DOSIS pulveris: gran xv-drach β -j. **Extracti**: drach β - Ḑ ij. In infuso vel decocto unc. j ad ℥ j aquæ.

CINCHONA TECAMEZ.

Cortex.

Arborea; Amer. merid.

OF. *Cortex Tecamez.* **IT.** *Corteccia Tecamez.*

QUAL. Cort. pulv. Lutescens; odor aromaticus; sapor aromaticus, amarus.

VIRT. Aphrodisiaca?

USUS decocti vel infusi: Asthenia ex gonorrhœa vera.

CINERARIA SIBIRICA.

Radix recens.

CL. Syng. O. Polyg. superfl.

QUAL.

VIRT.

USUS. Anaphrodisia ex ebrietate (PALLAS).

CISSAMPELLOS CAAPEBA.

Radix.

QUAL. Mucilaginoso.

USUS. Dysuria; stranguria; morsura serpentum.

CISSAMPELOS PAREIRA.

Radix.

CL. Diac. O. Monadelph. Perennis; Americ. merid.

OE. Pareira brava; Butua. IT. Pareira brava. A. Cissampelos,

QUAL. Eximia: Sapor amaro-dulcis.

N. B. Hanc radicem virtute æmulat *abuta rufescens* AUBLET.

VIRT. Diuretica; alterans.

USUS *infusi*: Dysuria; calculus urinarius; icterus; arthritis; morbi pituitosi.

DOSIS: ℥j ad ℥ij aquæ ad colat. ℥j.

CISTUS CRETICUS.

Succus resinosus ex foliis exsudans.

Cistus Ladaniferus (HORT. KEW).

CL. Polyand. O. Monog. Fruticosa; Europ. austr.

OF. Ladinum; gummi-ladinum; cistus creticus. IT. Ladano. A. Gum-cistus.

QUAL. Resina amara; grisea; fumo grato.

VIRT. Stimulans; aromatica.

USUS externus ad emplastra; suffimigia.

CITRUS AURANTIUM.

Fructus recens;
cortex flavus fructus; folia; flores.

CL. Polyadelp. O. Icosand.

Arborea; Eu-
rop. austr.

N. B. Duæ varietates.

OF. Flavedo corticum aurantiorum; folia;
flores naphæ; fructus aurantii dulcis et a-
mari; aurantia hispalensis, curassavica.

IT. Arancio, Scorza di Arancio, ed acqua
Lanfa. **G.** Oranges. **GE.** Pomeranzen. **A.**
Seville et china orange-tree.

QUAL. corticis florum et foliorum: odor fra-
grans; sapor aromatico-amarus. **Succi:** Aci-
dulo-dulcis, vel amaro-dulcis.

VIRT. Nervina; stimulans; stomachica. **Succi:**
refrigerans.

USUS corticis forma pulveris, infusi, tinctu-
ræ: Dyspepsia; intermittentes; menorrh-
gia? **Foliorum:** Chorea; epilepsia; convul-
sio; hysteria.

DOSES pulveris corticis: drach. β . **Foliorum:**
drach. β - j ter quaterve de die.

PRÆP. Aqua distillata; oleum volatil. florum
vulgo oleum Naphæ; tinctura; conditum;
syrupus corticis: oleum corticis volatile
expressione paratum vulgo oleum Lerga-
motte.

CITRUS MEDICA. Fructus ejusque succus;
cortex flavus fructus.

Varietas: *citrus limonia*. Arborea; Europ.
aust.

OF. Succus; *flavedo limoniorum*. s. citri. IT.
Succo e corteccia di cedro, Limone, Me-
larosa, Bergamotte, ec. G. citronier; ci-
trons. GE. Zitronen. A. Lemon-tree et li-
me-tree.

QUAL. Fructus: Sapor acidus: corticis: Sapor
amarus, aromaticus.

VIRT. Succis: Refrigerans; antiseptica: corti-
cis: Stimulans; stomachica.

USUS Succis: Scorbutus; febres: corticis: dy-
spepsia.

PRÆP. Succus; oleum volatile corticis destil-
latione obtentum; oleum volatile incisione
et expressione corticis obtentum, vulgo
oleum seu *essentia de cedro*; confectio seu
conditum corticis et carnis fructus; acidum
citricum.

CLEMATIS RECTA. Herba cum floribus.

CL. Polyand. O. Polyg. Perennis.

OF. *Flammula Jovis*. IT. *Fiammola di Gio-*
ve. G. Clemat te. GE. Brennkraut; aufre-
chte wald e'le. A. Upright virginis-bower.

QUAL. In principio acri residens.

VIRT. Corrodens; vesicans; diuretica.

USUS *infusi vel extracti*: Exostosis syphiliti-
ca? Pulveris externus: Ulcera syphilitica,

MEDICA.

67

cancrosa, phagedænica? *Infusi forma lotionis*: Psora rebellis.

DOSIS herbæ cum floribus siccatae: drach ij-
iij ad ℥j aquæ.

PRÆP. Extractum foliorum recent. g. j-iiij.

CLEMATIS VITALBA.

Folia.

CL. et O. præced.

Perennis; sarmentosa; Europ.

OF. *Vitalbæ folia*. IT. *Clematite*, o *Erba de' Pitocchi*. G. *Herbe aux gueux*. A. *Common virgins-bower, or travellers joy*.

QUAL. In principio acri residens; sapor acidus, subdulcis, stypticus.

VIRT. Adstringens; corrodens; diuretica.

USUS *infusi*: Hydrops. *Externus succi oleo excepti*: Psora.

COCLEARIA ARMORACIA.

Radix recens;

ejusque succus expressus.

CL. *Tetradyn*. O. *Siliquos*.

*Perennis; horten-
tensis, ad rivos et in locis humidis.*

OF. *Raphanus rusticanus; armoracia*. IT. *Rafano silvatico, Rumlaccio*. G. *Cran; rai-
fort*. GE. *Meerrettich*. A. *Horse-raddish*.

QUAL. Eximia: in principio acri volatili re-
sidens.

VIRT. Emetica; diuretica; antiscorbutica; ru-
befaciens.

USUS. Cachexiæ; quartanæ; scorbutus; hy-

drops; asthma pituitosum; paralysis; arthrodynia rheumatica; paraphonia.

DOSIS *radicis recentis rasæ*: ℥j-ij. *Succi expressi*: ʒß. in haustu vini.

PRÆP. Succus; aqua destillata; alcohol; infusum aquosum et vinosum.

COCHLEARIA OFFICINARIIS. Herba recens; ejusque succus expressus.

CL. et **O.** *præced.* *Annua; ad litora maris; hortensis.*

OF. *Cochlearia hortensis.* **IT.** *Coclearia.* **G.** *Cranson; herbe aux couteurs.* **GE.** *Læffelkraut.* **A.** *Common Seurvygrass.*

QUAL. *Herbæ recentis*: Eximia; in principio acri volatili residens; sapor acris.

VIRT. Diuretica; antiscorbutica; alterans.

USUS *herbæ et succi*: Scorbutus; cachexiæ.

PRÆP. Conserva; succus; aqua destillata; alcohol; syrupus.

DOSIS *succi*: unc j-ij-iiij. *Conservæ* drach. i-ij.

COCOS BUTYRACEA.

— **NUCIFERA.**

) Oleum fixum fructus.

Palmæ.

OF. *Oleum palmæ.* **IT.** *Olio di Cocco.*

QUAL. et **VIRT.** Eadem ac aliorum oleorum fixorum.

USUS. Fissura; perniones; tumores; nodi podagrici; ventris tumor durus: Pro injectionibus anatomicis per se vel cum tertia aut quarta parte ceræ mixtum.

COFFEA ARABICA.

———— OCCIDENTALIS.

CL. Pentand. O. Monog.

) Semina.

Arborea; Arab.
et Ind. occident.

OF. *Coffea semina*. IT. *Caffè*. G. *Caffé*. GE.
Caffier. A. *Cofféetree*.

QUAL. Semen. ustulatorum: Fragrans; aromatica.

VIRT. Excitans; nervina; calefaciens; carminativa.

USUS decocti seminum crudorum: Catarrhus; rheumata; amenorrhoea suppressionis; diarrhoea. *Infusi seminum ustulatorum*: Sopor; cardialgia cephalalgia; obstipatio; Polysarcia. *Infusi saturati* Unc. j ad aquæ unc. iij iv haustus omni semi hora repetendus: asthma spasmodicum; (PRINGLE). *Pulveris* drach. vj cum unc. iij aut iv aquæ coctæ ad dimidum; hocque cum anatica portione succi citri mixtum calide in intermittentibus die apyrexia jejuno stomacho ebibendum in lecto.

PRÆP. Semen ustulatum pro infuso.

COLCHICUM AUTUMNALE.

Radix.

CL. Hexandr. O. Trigyn.

Perennis; in pratis humidis.

OF. *Colchicum*. IT. *Colchico*, *Giglio matto*,
o *Strozza-cane*. G. *Colchique*; mort aux
chiens. GE. *Zeitlozen*; *wiesen-safran*. A.
Common meadow-saffran.

QUAL. In principio acri residens; odor graveolens; sapor intense acris, nauseosus.

VIRT. Narcotica; drastico-cathartica; phthyrriaca diuretica.

USUS. Hydrops.

PRÆP. Acetum; oxymel.

COLCHICUM ILLYRICUM. Radix.

(GRONOVII et FÆRSKAL).

OF. *Rad x hermodactyli*. IT. *Ermodattilo*.

QUAL. In principio acri volatili residens.

VIRT.

USUS.

COLLINSONIA CANADENSIS. Radix.

CL. *Diand*. O. *Mong*. Perennis; Americ. septent.

A. *Nettle leaved collinsonia*.

QUAL. Odor nidorosus.

VIRT.

USUS. Colica lochialis.

CONFERVA HELMINTHOCHORTON.

CL. *Cryptog*. O. *Algæ*. In Corsica ad lit-
tus maris.

Dubium an hæc substantia sit conferva an fucus, aut potius nidus insecti marini?

OF. *Fucus helminthochorton*. s. *Corallina melitochorton*; *lemitochorton*; *corallina corsicana rubra*. IT. *Corallina Corsicana*. G.

MEDICA.

71

Mousse ou coralline de Corse. GE. *Wurm-conserve.*

QUAL. Sapor salinus nauseosus; magnam quantitatem mucilaginis decoctione largiens.

VIRT. Anthelminthica.

USUS. Lumbrici.

DOSIS *Pulveris*: gran. x ad drach. j: in infuso ʒj-ʒj ad ʒj aquæ.

CONFERVA RIVULARIS.

IT. *Conserva delle acque dolci.*

QUAL. Magnam gazis oxygenii quantitatem præcipue hyeme exhalans.

CONIUM MACULATUM.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.* Biennis; in desertis umbrosis, humidis.

N. B. Cautè a *cicuta virosa*; æthusa cynapio; chærophyllo sylvestri, temulento et bulboso nec non a tordyllo anthriscò distinguenda.

N. B. Conii maculati character est semen in uno latere striis nitide serratis notatum.

OF. *Cicuta major* s. *Vulgaris.* IT. *Cicuta.* G. *Ciguë ordinaire.* GE. *Schierling.* A. *Common hemiock.* H. *Conio manchado; cicuta.*

QUAL. *Recentis*: Venenata; in principio narcotico et acri residens; odor teter; sapor acris, nauseosus.

VIRT. Narcotica; diuretica.

USUS externus forma pulveris et cataplasma

tis: Scirrhus; ulcus phagedænicum; scrophula; tabes scrophulosa; caries; pertussis; tinea; tumor testiculi; tumor prostata.
 DOSIS *pulveris vel succi inspissati*: gran. j. ascendendo gradatim ad gran. xx. de die.
 PRÆP. Succus foliorum recentium expressus et inspissatus vulgo *extractum* cicutæ.

CONVALLARIA MAJALIS. Flores.
 CL. *Hexandr. O. Monog.* Perennis.
 OF. *Lilium convallium.* IT. *Fiordaliso*, *Mughetto*, o *Giglio convallio.* G. *Maguet de mai.* GE. *Mayblumen.* A. *Maylilly* or *sweet scented lily of the vally.*
 QUAL. *Recentis*: Olor fragrans; sapor amarus, acris, nauseosus.
 VIRT. Errhina; narcotica; antispasmodica; cathartica.
 USUS. Epilepsia?

CONVALLARIA POLYGONATUM. Radix.
 CL. *et O. præced.* Perennis.
 OF. *Sigillum salomonis.* IT- *Sigillo di Salomone.* A. *Common salomon's seal.*
 QUAL. Fatua; mucilaginosa.
 VIRT. Cosmetica?
 USUS.

CONVOLVULUS JALAPPA. Radix.
 CL. *Pent. O. Monog.* Mexicana.
 OF. *Jalappa.* IT. *Radice, e Resina di Scia-*

rappa. G. Jalape. GE. Jallapwurzel. A. Jalap. bindweed; jalap. H. Jalapa.

QUAL. In principio resinoso acri residens; odor ingratus; sapor nauseosus.

VIRT. Cathartica. *Resinæ*: Drastica; anthelminthica.

USUS: Vermes; obstipatio: physconia abdom.

DOSIS *pulveris*: Drach β - Θ ij pro adultis.

PRÆP. Resina; tinctura *resinæ*.

CONVOLVULUS SCAMMONIA. Succus radicis gummi-resinosus inspissatus.

N. B. Optimus incisione radicis; villior expressione aut decoctione plantæ obtentus.

CL. et O. *præced.* Perennis; *Syriæ*.

OF. *Scammonium*. IT. *Scammonea*, e *Villuchio*: G. *Scamonée d'Alep*. GE. *Skamonien*. A. *Scammony bindweed*.

QUAL. In succo lacteo acri et principio resinoso cum pauco gummoso residens; sapor acris, amaricans; odor nauseosus.

VIRT. Drastico-cathartica.

USUS.

DOSIS: Gran. v-x-xx.

PRÆP. Resina cum extracto glycyrrhizæ mixta vulgo *diagridium*.

CONVOLVULUS SEPIUM. Succus herbæ expressus et inspissatus.

OF. *Convolvulus major albus*. IT. *Convolvolo maggiore*. A. *Great bindweed*.

QUAL. et VIRT. Scammonium æmulans.
 DOSIS : Gran. xx-xxx.

CONVOLVULUS SCOPARIUS. Lignum.
Frutic. insul. Barrancas.
 AN lignum Rhodium verum?

CONVOLVULUS SOLDANELLA. Herba.
 CL. et O. præced. *Al littora maris Europæ.*
 OF. *Soldanella ; Brassica marina. IT. Cavolo*
di mare. G. Soldanelle ; choux marin. A.
Sea bindweed.
 QUAL. In succo lacteo acri residens ; sapor
 acris, amaricans, nauseosus.
 VIRT. Drastico-cathartica.
 USUS. Hydrops.
 DOSIS : ʒj.

CONVOLVULUS TURPETHUM. Radix.
 CL. et O. præced. *Perennis ; Indica.*
 OF. *Radix turpethi. IT. Turbit. G. Racine de*
turbith. A. Squarre stalked bindweed.
 QUAL. In principio resinoso acri residens ; sa-
 por subinsipido-acris, nauseosus.
 TINT. Cathartica.
 USUS.

COPAIFERA OFFICINALIS. Resina liquida
 incisione arboris obrenta (*vulgo Balsamum*).
 CL. *Decand. O. Monog. Arborea ; Americ.*
merid.

OF. *Balsamum copaivæ. s. de copaiba.* IT. *Balsamo copaive.* G. *Baume de copahu.* GE. *Kopaiva-balsam.* A. *Balsam of capivi.*

QUAL. Liquido-tenax; flavescens; in principio resinoso residens; odor fragrans; sapor aromaticus, subacris, amaricans; urinam amarum reddens.

VIRT. Stimulans; diuretica.

USUS: Blennorrhœa; leucorrhœa; morbi pulmonum, renum et hepatis pituitosi, atonici; circumcisio.

DOSIS: Gutt. XXX-XL. bis de die in hausta aquæ vel in vitello ovi.

CORDIA MYXA. Fructus (Drupa).

CL. *Pentand. O. Monog. Arbor. ; Ægypt. ; Ind.*

OF. *Sebesten.* IT. *Sebeste o Sebesten.* A. *Smooth leaved cordia*

QUAL. Dulcis; mucilaginoso.

VIRT. Nutriens; lubricans.

USUS: Raucedo; tussis; stranguria.

CORIANDRUM SATIVUM. Semen.

CL. *Pentand. O. Dygin. Annua.*

OF. *Semen coriandri.* IT. *Semi di Coriandro.* G. *Coriandre.* GE. *Koriander-saamen.* A. *Common coriander.* H. *Cilantro sativo.*

QUAL. Odor teter; sapor aromaticus; sennæ odorem et saporem ingratum egregie mitigans.

VIRT. Hypnotica; lactifuga; carminativa.

USUS. Cum infuso sennæ.

DOSIS: Drach. j.

CORIS MONSPELIENSIS.

Herba.

CL. *Pentand. O. Monog.*

*Biennis; Europ.
austr.*

IT. *Cori.*

QUAL. Præstans; sapor iutense amarus; nauseosus.

USUS. Syphilis?

CORTEX ANGELINÆ.

Obscura.

Insul. Grenad.

QUAL.

VIRT. Anthelminthica.

USUS: Lumbrici.

DOSIS: ℥j ad ℥iij aquæ ad colat. ℥j. Cujus uncia una alterave exhibetur omni mane.

CORTEX ANGUSTURÆ.

Obscura.

Insul. Trinit.; Florid.

Vide BRUCEA.

CORTEX BELA-AYE.

Obscura.

Arbor. Madagascar.

IT. *Corteccia di Bellaja.*

QUAL.

VIRT.

USUS. Diarrhœa; dysenteria; hæmorrhœa.

DOSIS. ℥j-℥ss mane et vespere.

MEDICA.

77

CORTEX CHINÆ FLAVUS.

Obscura.

Amer. merid.

OF. *Cortex Chinæ regius.* IT. *China gialla.*

QUAL. Sapor intense amarus; substypticus.

VIRT. Roborans; stomachica.

USUS. Intermittentes.

CORTEX CHINÆ RUBER.

Obscura.

Amer. merid.

IT. *China rossa, o China Inglese.*

QUAL. Sapor intense amarus.

VIRT. Eadem ac præced.

USUS. Intermittentes.

CORTEX CHINÆ SURINAMENSIS.

Obscura.

Surinam.

IT. *China del Surinam.*

QUAL. et VIRT. Eadem ac præced.

CORTEX JUBABÆ.

Obscura.

Ind. orient.

QUAL. Sapor amaricans.

VIRT. Nervina?

USUS.

CORTEX LAVOLA.

Obscura.

QUAL.

VIRT.

USUS.

CORTEX MASOY.

Obscura.

Nov. Guinea

QUAL. Odor gratus.

VIRT.

USUS *externus*: Torsmina ventris.

CORTEX POCGEREBÆ.

Obscura.

QUAL. Styptica; subamara.

VIRT. Adstringens.

USUS. Diarrhœa; dysenteria.

CORYLUS AVELLANA.

Oleum fixum
nuclei expressum.

CL. *Monœc.* O. *Polyand.*

Fruticosa.

OF. *Coryli s. Avellanæ nnces.* IT. *Avellana*,
e Nocciuole. A. *Common hazelnutt tree.*

QUAL. Oleum fixum, ægre rancescens, inodorum; hinc odoribus excipiendis aptum.

COSTUS ARABICUS. Radix; Cortex Radicis.

CL. *Monand.* O. *Monog.* *Perennis; Ind.*
orient. et occident.

OF. *Costus arabicus; costus dulcis et amarus.*

IT. *Costo Arabico.* A. *Arabian costus.*

QUAL. In extractivo amaro et oleo volatili
residens; sapor amaricans, aromaticus: odor
fragrans; urinam violaceo odore imprægnans.

VIRT. Stimulans; caldaciens; menagoga.

USUS: In officinis sæpe cum cannella alba confunditur.

DOSIS *pulv.* drach. semis; pro infuso unc.
semis ad ℥j aquæ.

CRAMBE ORIENTALIS.

Radix recens.

CL. *Tetradyn.* O. *Siliqu.*

Perennis.

OF. *Crambe.* IT. *Cavolo Orientale.* A. *Calewort.*

QUAL. In principio acri volatili residens.

VIRT. Antiscorbutica.

USUS.

CROCUS SATIVUS.

Stigmata pistilli.

CL. *Triand.* O. *Monog.*

*Alpina; Europæ
austr. hortensis.*

Variet. A. officinalis autumnalis.

OF. *Crocus austriacus s. orientalis.* IT. *Zafferano.* G. *Saffran.* GE. *Saffron.* A. *Saffran.* H. *Azel fran cultivado.*

QUAL. Luteo-tinctoria; in oleo volatili et principio narcotico et resinoso residens; odor fragrans, virosus; sapor subaromaticus.

VIRT. Sedativa; hypnotica; leviter stimulans; antispasmodica; menagoga.

USUS: Amenorrhœa atonica; colica lochialis; pneumonia notha; vomitus. *Externus:* Ophthalmia.

DOSIS *pulveris:* gran. x-xx-xxx. *Tinct.* ʒß.

Extracti gran. xv.

PRÆP. Tinctura; syrupus; extractum.

CROTON CASCARILLA.

Cortex.

Croton lineare. (HORT. REW.).

N. B. *Dubium* an cortex *cascarillæ dictus ex croton cascarilla, Cr. lineari, Cr. Elu-*

teria; aut ex *Clusia Eluteria*, aut de-
 mum ex hisce pluribus aut omnibus de-
 sumatur?

CL. *Monæc. O. Monadelph.* *Arborea; Ame-
 ric. meridion.*

OF. *Cortex cascarillæ s. Eleutheriæ.* IT. *Ca-
 scariglia.* G. *Chaquerille.* GE. *Kaskarilrin-
 de.* A. *Cascarilla or Willow leaved croton.*

QUAL. In oleo volatili et extractivo amaro
 residens; sapor aromaticus, amarus, suba-
 cris; odor fragrans, fumo moscato.

VIRT. Roborans; stimulans.

USUS: Dyspepsia; diarrhœa; febres intermit-
 tentes et remittentes biliosæ.

DOSES pulveris: Gran. x-xxx. Pro infuso aquo-
 so vel vinoso drach. j. ad ℥j. Extracti:
 Drach. j.

PRÆP. Tinctura; extractum.

CROTON LACCIFERUM. Substantia resi-
 nosa (*Nidus insecti*).

CL. et O. præced. *Arborea; Ind. orient.*

N. B. Succus resinosus ex hac arbore æque
 ac ex fico religiosa et indica; nec non
 ex arbore plasonis et rhamno jujuba, pun-
 ctura insecti COCCUS LACCA dicti exsudans;
 ejusque nidulum constituens.

OF. *Lacca s. gummi lacca.* IT. *Cancamo,
 Lacca.*

QUAL. Resina rubro tinctoria; substyptica.

VIRT. Subastringens; diuretica.

USUS. Lacca sigillatoria; vernices. *Vincturæ*;
Laxitas gingivarum.

PRÆP. Tinctura.

CROTON TIGLIUM.

Semen; lignum.

CL. et O. præced.

Arborea; Zeylanica.

OF. *Grana tiglii s. tilli: Lignum pavanæ s. s. Moluccense.* IT. *Seme del Tilli, o delle Molucche; Pinocchio d'India; Legno delle Molucche.*

QUAL. Venenata, acerrima. *Semen decortiatum oleum fixum sine acri continet.*

VIRT. Drastico-cathartica; emetica; diuretica; exurens.

USUS.

CROTON TINCTORIUM.

Fæcula.

CL. et O. præced.

Annua; Europ. austr.

OF. *Lacemus.* IT. *Oricello.* G. *Tournesol.* A. *Officinal croton.*

QUAL. Cærulea, tinctoria.

USUS chemicus pro reagente.

CUCUMIS COLOCYNTHIS.

Fructus; pulpa.

CL. *Monæc.* O. *Digyn.*

Annua; Asiatica; Hispan.

OF. *Colocynthides.* IT. *Coloquintida.* G. *Coloquinte.* GE. *Koloquinten.* A. *Bitter cucumber or gourd.* H. *Pepinera colquintida.*

QUAL. Odor nauseosus; sapor amarissimus, nauseosus.

VIRT. Eximia: Diuretica; deobstruens; drastico-cathartica; menagoga; anthelminthica.

USUS. Physconia; hydrops; obstipatio; epilepsia.

DOSIS: *Intern.* gran. $\frac{1}{8}$ *Pulpæ* gran. xxx. ad

\mathcal{R} β aquæ decoct. pro enemate.

PRÆP. Extractum cum mucilagine gummi tragacanthæ tritum, vulgo TROHISCI ALHANDAL; resina.

N. B. Antidotum ejus est camphora.

CUCUMIS MELO.

Semen.

CL. et *O.* præced.

Annua; hortensis.

GF. *Semen melonum.* *IT.* *Melone, o Popone.*

G. *Semence de melon.* *GE.* *Melonen-kerne.*

A. *Common melon.*

QUAL. Oleosa; subdulcis.

VIRT. Refrigerans.

USUS forma emulsionis: Febres; stranguria.

CUCUMIS SATIVUS.

Semen.

CL. et *O.* præced.

Annua; hortensis.

GF. *Semen cucumis.* *IT.* *Cocomero, Cetriolo.*

G. *Concombre.* *GE.* *Garken saamen.* *A.* *Common cucumber.*

QUAL. et **VIRT.** Eadem ac præced.

CUCURBITA LAGENARIA.)

————— PEPO.)

Semen.

————— CITRULLUS.)

CL. *Monæc.* *O.* *Syng.*

Annua; hortens.

GF. *Semen cucurbitæ.* *IT.* *Cocuzza, o Zucca.*

G. Semence de courge ou potiron. GE. Kürbis-kerne. A. Bottle gourd ; pompion , or pumpkin gourd ; et water melon.
 QUAL. et VIRT. Eadem ac præced.

CUMINUM CYMINUM.

Semen.

CL. Pentand. O. Digyn.

Annua ; Europ.
 austr. AEGYPT.

OF. Semen cumini. IT. Cimino domestico. G. Cumin officinal. GE. Rœmischer kümel ; kronkümel. A. Cumin.

QUAL. Præstans : odor fragrans ; sapor acris , aromaticus.

VIRT. Stimulans ; carminativa.

USUS. Colica flatulenta ; tympanitis ; tumores frigidi.

CUPRESSUS SEMPERVIRENS. Strobuli ; folia.

CL. Monæc. O. Monadelph.

Arborea ;
 Asiatica.

OF. Folia cupressi ; nuces s. Galbuli cupressi s. Cypressi. IT. Cipresso. G. Cyprès. GE. Zypressenbaum. A. Upright cypress-tree.

QUAL. Amaro-styptica.

VIRT. Adstringens.

USUS.

CURCUMA LONGA.

Radix.

CL. Monand. O. Monog.

Perennis ; Indica.

Amomum curcuma (JACQUIN).

OF. Carcuma vulgo terra merita. IT. Curcu-

ma, o Terra maritima. G. Curcuma. GE. Gelb wurzel; kurkuma-wurzel. A. Long rooted Tarmenic.

QUAL. In principio extractivo et paucō oleo volatili residens; sapor amarus, subaromaticus; urinam luteo colore tingens.

VIRT. Tinctoria; menagoga; diuretica; deobstruens.

USUS *internus*: intermittentes; physconia abdomin; icterus; morbi cutis.

DOSIS *pulveris* scrup. ij-drach j. In *infuso*: drach ij ad ℥j aquæ.

CUSCUTA EPITHYMUM.

Herba.

CL. *Tetrand. O. Digyn.*

Parasitica lupuli, dulcamaræ, Cannabis.

IT. *Epitimo.*

QUAL. Odor et sapor thymi; sed debilior.

VIRT. Debilior sequenti.

CUSCUTA EUROPÆA.

Herba.

Parasitica; annua.

OF. *Cuscutæ herba.* IT. *Cuscuta.* G. *Cuscute.*
A. *Dodder.*

QUAL. Inodora; amaricans; subacris.

VIRT. Deobstruens.

USUS. Physconia abdomin.; intermittentes.

CYCLAMEN EUROPÆUM.

Radix recens.

CL. *Pentand. O. Monog. Perennis; Hungar; Austriæ; in locis umbrosis, nemorosis.*

MEDICA.

84

OF. *Cyclamen*; *arthanita*. IT. *Pan porcino*, *Ciclomino*, o *Artanita*. G. *Saubrod*; *erdscheibe*. A. *Common European cyclamen*.

QUAL. *Radicis recentis*: In principio acri volatili residens, siccatione avolans; sapor primo mucilaginosus; dein acris, urens, amaricans; *assatæ*: Esculenta.

VIRT. Drastico-cathartica; menagoga; anthelminthica; resolvens.

USUS: Scirrhus; tumores frigidi; pernio; vermes.

DOSIS: Drachm j.

PRÆP. Unguentum de *arthanita*.

CYNARA SCOLYMUS.

Folia.

CL. *Syng. O. Polyg. æqual.* *Annua*; *hortensis*.

OF. *Cynara hortensis*. IT. *Carciofo*. G. *Artichaut*. GE. *Artutschoken*. A. *Artichoke*.

QUAL. *Oleracea*.

VIRT. *Diuretica?*

USUS. *Hydrops*.

DOSIS *succi*: ℥ij-iiij in haustu vini generosi.

CYNOGLOSSUM OFFICINALE.

Herba;

Radix.

CL. *Pentand. O. Monog.* *Biennis*; in vills et cimeteriis.

OF. *Cynoglossum*. IT. *Cinoglossa*, ossia *Lingua di cane*. G. *Cynoglosse*. GE. *Hundszungen-wurzel*. A. *Officinal hopnd's tongue*.

QUAL. Odor graveolens; sapor mucilaginosus.

VIRT. Subnarcotica; phthiriaca.

USUS.

CYNOMORIUM COCCINEUM.

CL. *Monæc.* O. *Monand.* *Plantarum maritimarum parasitica; Afric.; Sicil.; Jamaic.*

OF. *Fungus Melitensis.* IT. *Fungo di Malta.*

QUAL. Nigra; sapor amaricans, stypticus.

VIRT. Adstringens.

USUS *decocti internus*: Hæmorrhagiæ; dysenteria atonica; ulcera. *Externus*: Ulcera phagedænica.

DOSIS *pulveris*: Gr. xx ad drach. j.

CYPERUS LONGUS. Radix.

CL. *Triand.* O. *Monog.* *Perennis; Erop. austr. Syriæ; in locis humidis.*

OF. *Cyperus longus.* IT. *Cipero.* G. *Souchet.*

GE. *Zyperwurzel.* A. *Cyperus.*

QUAL. Odor fragrans; sapor grate aromaticus; calidus.

VIRT. Diuretica; menagoga.

USUS. Ulcera vesicæ, uteri, oris?

CYPERUS ODORATUS.) Radix.

——— ROTUNDUS.)

IT. *Giunco odorato.*

QUAL. et VIRT. Eadem ac præced. sed debilior.

CYTINUS HYPOCISTIS. Succus baccarum
expressus, inspissatus.

CL. *Gynand.* O. *Dodecand.* *Anna*; *para-*
sitica; *Europ. austr.*

OF. *Hypocistidis succus.* IT. *Ipocisto.* GE. *Hy-*
pozisten-saft.

QUAL. Sapor acido-austerus, stypticus; alco-
hole solubilis.

VIRT. Adstringens.

USUS. Profluvia.

CYTISUS LABURNUM. Cortex.

VARIETAS: *Alpinus.*

CL. *Diadelph.* O. *Decand.* *Arborea*; *alpina*;
hortensis.

IT. *Citiso.* A. *Common laburnum*; *cytissus al-*
pinus.

QUAL.

VIRT. Menagoga.

USUS. *decocti*: Amenorrhœa.

D

DAPHNE GNIDIUM. Semen.

CL. *Octand.* O. *Monog.* *Fruticosa.*

OF. *Semen coccognidi*; *granum gnidium.* IT.

Grano Gnido, *Coccognidio*, *Pepe montano.*

A. *Flaxleaved daphne.*

QUAL. Venenata.

VIRT.

USUS.

DAPHNE LAUREOLA. Cortex radicis.
OF. *Cortex mezerei.* **IT.** *Laureola.* **G.** *Garou;*
bois gentil. **A.** *Common daphne, or spurge*
laurel.

QUAL. et **VIRT.** Eadem ac sequentis.

VSUS præcipuus corticis recentis aceto emol-
 liti loco vesicantis.

PRÆP. Unguentum ad fonticulos.

DAPHNE MEZEREUM. Cortex radicis.
CL. et **O.** *præced.* *Fruticosa.*

OF. *Cortex laureolæ s. Mezerei.* **IT.** *Mezereo,*
Mezario, Dafnoide. **G.** *Mezereum;* *faux*
garou. **GE.** *Kellerhals;* *seidelbastrinde.*

QUAL. Venenata; in principio acri residens;
 acris, urens.

VIRT. Drastico-cathartica; emetica; diureti-
 ca. *Extern.:* Corrodens; vesicans.

VSUS decocti corticis: Ulcera maligna; morbi
 cutis et ossium syphilitici. *Externus* forma
 cataplasmatæ: Scirrhus: orchiocele; lepra.

DOSIS: Drach ij corticis radicis (vel $\frac{3}{4}$ ra-
 dicis) concisi cum portione æquali glycyrrhizæ in \mathfrak{H} iij aquæ coquendo ad colit.
 \mathfrak{H} ij.

N. B. Antidotum ejus est camphora.

DAPHNE THYMELÆA. Radix.
IT. *Timelea, Camelea.*

QUAL. et **VIRT.** Eadem ac præced.

DATISCA CANNABINA.

Herba.

CL. *Diæc.* O. *Dodecand.*

QUAL.

VIRT.

USUS. *pulveris* (loco *cinchonæ*) : Intermittentes.

DOSIS: Gran. xx-xxx; repetendo hanc dosim
ter quaterve tempore apyrexia.

DATURA STRAMONIUM.

Semen; folia;

succus foliorum expressus et inspissatus.

CL. *Pentand.* O. *Monog.*

Annua; in locis

desertis, arenosis.

OF. *Stramonii herba*; *daturæ semina*. IT. *Stramonea*,

Pomo spinoso, *Erba de' Stregoni*. G.

Eudormie commun; *pomme épineuse*. GE.

Stechapfelkraut. A. *Common Thornapple*.

QUAL. *Venenata*; in principio acri, narcotico resiliens; odor virosus; sapor nauseosus, amarus. *Seminis*: insipida.

VIRT. *Narcotica* interne vel externe applicata; *dementia*.

USUS *succi inspissati*: *Melancholia*; *mania* post puerperium, *epilepsia*; *amentia*; *carcinoma*; *varix ani*; *combustura*.

DOSIS: gran. $\frac{3}{4}$ ad gran. j-vj.

N. B. *Antidotum* ejus est *acidum acetosum*, vel *acidum citricum*.

DAUCUS CAROTA.

Radix recens; folia;

Semen.

- CL.** *Pentand.* O. *Digyn.* *Biennis.*
OF. *Daucus sativus.* IT. *Carota*; e *Dauco selvatico.* G. *Carote.* GE. *Gelle Mæhren*, *gelbe Rüben.* A. *Wild carrot.* H. *Zanahoria.*
QUAL. *Radicis*: In principio mucilaginoso-saccharino residens; sapor dulcis, mucilaginosus. *Seminum.*: odor fragrans; sapor aromaticus, amaricans.
VIRT. *Radicis*: Demulcens; antiseptica; *seminum*: stimulans; anthelminthica?
USUS *radicis rasæ forma cataplasmatidis*: ulcera phagedænica, putrida, herpetica; carcinoma. *Decocti radicis*: Stranguria.

- DELPHINIUM CONSOLIDA.** *Flores.*
CL. *Polyandr.* O. *Trig.* *Annua.*
OF. *Flores calcitrappæ*; *consolida regalis.* IT. *Fior cappuccio*, o *Fior da Cavaliere.* GE. *Rittersporn.* A. *Branchinh larkspur.*
QUAL. *Cærulea.*
VIRT.
USUS.

- DELPHINIUM STAPHISAGRIA.** *Semen.*
CL. *et O. præced.* *Biennis*; in montibus *Europ. austr.*
OF. *Staphisagria.* IT. *Stafusaria*, *Stafisagra*, *Erba pidocchina.* G. *Staphisaggre.* GE. *Staphanshraut*; *Laukskærner.* A. *Palmated larkspur* or *stavesacre.*
QUAL. *Præstans*: Sapor amarus, acris, nauseosus.

MEDICAE.

91

VIRT. Drastico-cathartica, anthelminthica; phthiriaca.

USUS pulveris: Pediculi; acari subcutanei; odontalgia.

PRÆP. Unguentum.

DENTARIA PENTAPHYLLOS.

Radix.

CL. *Tetrand. O. Siliquos.*

Alpina; Europ. austr.

OF. *Dentaria minor.* **IT.** *Dentaria minore.* **GE.** *Zahnwurzel.* **A.** *Fiveleaved Toothwort.*

QUAL. In principio acris volatili residens; sapor acris, nauseosus ut cochleariæ armoraciæ.

VIRT.

USUS.

DIANTHUS CARYOPHILLUS.

Petala.

CL. *Decand. O. Digyn.*

Annua.

OF. *Flores tunicæ hortensis; caryophilla rubra.*

IT. *Garofano rosso de' giardini.* **G.** *OEillet giroflée.* **GE.** *Grasblumen; nelkenblumen; gartennelken.* **A.** *Clovepink; or clove july flower.*

QUAL. Odor fragrans.

VIRT.

USUS.

DICTAMNUS ALBUS.

Radix.

CL. *Decand. O. Monog.*

Perennis.

VARIET. **A.** *Flore niveo.* **B.** *Flore rubro.*

OF. *Dictamnus albus*; *fraxinella*. IT. *Dittamo bianco*. G. *Dictame*; *fraxinelle*. GE. *Weisser diptam*. A. *White dittany et red fraxinella*.

QUAL. *Radicis recentis*: Odor ambrosiacus; sapor amarus, subaromaticus.

VIRT. Nervina; anthelminthica; menagoga.

USUS. Epilepsia; ataxia; leucorrhœa; vermes.

PRÆP. Tinctura gutt. XX-L ter die.

DIGITALIS PURPUREA.

Folia.

CL. *Didyn*. O. *Angiosp*. Biennis; in sylvis.

N. B. Tempore quo flores erumpunt colligenda, et caute siccanda.

OF. *Digitalis purpurea*. IT. *Digitale*, o *Digitella purpurea*. G. *Grande digitale*. GE. *Fingerkraut*; *fingerhut*. A. *Purple Fox-glove*. H. *Dedalera purpurea*; *qualda perra*.

QUAL. Venenata; in principio acris residens; sapor acris, amarus, nauseosus.

VIRT. Emetica; Drastico cathartica; diuretica.

USUS. Hydrothorax (WITHTETING): hydrops atonicus; nephritis calculosa; epilepsia et mania a sero effuso; dysuria; phthisis forma decocti debilis pro potu ordinario vel forma syrupi (PARKINSON); scrophula?

DOSES: Unc. j-ij ad ℥ j β aquæ coquendo ad colat. ℥ j cuius $\frac{3}{4}$ j - j β cum drach. ij. aquæ aromaticæ omni bihorio sumenda. Pulveris: Gran. j-iiij bis die pro adultis. Pro infuso drach. j foliorum siccatorum ad uncias viij

aque fervide per quadrihorium digesta colat. adiendo unc. j. aque aromaticæ cujusdam ; dosis unc. j. bis de die, quæ est dosis media pro adulto ; multis unc. semis bis de die sufficit.

DOLICHOS URENS. Pubes leguminis rigida.
CL. *Diadelph. O. Decand.* Ind. orient. et Amer. merid.

OF. *Siliquæ hirsutæ ; dolichos pruriens.* Bengal. : *Cidjuch.* A. *Cow-itch dolichos.*

N. B. PAIVA hanc et sequentem plantam ad genus novum : *Lavraida* dictum refert.

QUAL.

VIRT. Anthelminthica.

USUS. Lumbrici

DOSIS. Drach. j-iv. cum syrupo aut mucilagine.

DOLICHOS PRURIENS. Pubes leguminis rigida.
N. B. Vid. *Lavradia.*

CL. et O. præced. Ind. occident.

A. *Horse-Hye bean, or dolichos.*

QUAL. et VIRT. Eadem ac præced.

DOLICHOS SOJA. Faba.

CL. et O. præced. Ind. orient.

QUAL. Subdulcis ; farinacea.

VIRT. ?

USUS.. Culinaris.

DORONICUM LATIFOLIUM. } Radix.
 PARDALIANCHES. }

CL. Syng. O. Polyg. superfl. Perennis; alpina, Europ. austr.

OF. *Doronicum*. IT. *Doronico*. GE. *Gemsenwurzel*. A. *Great leopard's bane*.

QUAL. Sapor dulcis, aromaticus.

VIRT. Arnicam montanam æmulans.

USUS.

DORSTENIA CONTRAYERVA. Radix.

CL. Monæc. O. Diandr. Perennis; Americ. merid.

OF. *Contrayervæ radix*. IT. *Contrajerva*. G. *Contrayerve*. GE. *Giflwurzel*. A. *Contrajera*.

QUAL. Præstans: Odor subfragrans; sapor amaricans, subaromaticus; stypticus.

VIRT. Adstringens; antiseptica; sudorifica; stomachica; stimulans.

USUS. Febres et exanthemata atonica; dysenteria.

DOSIS. pulveris. Gran. x-drach. j. Tincturæ: drach. j-ij.

DRACÆNA DRACO. Resina.

CL. Hexand. O. Monog. Fruticosa; Ind. orient.

OF. *Sanguis draconis*. IT. *Sangue di Drago*. G. *Sang de dragon*. A. *Dragon-tree*.

QUAL. Styptica.

VIRT. Adstringens.

USUS. Hæmorrhagiæ; Leucorrhœa; apocenosæ.
DOSIS.

DRACOCEPHALUM CANARIENSE. Herba.
CL. *Didyn.* O. *Gymnosp.* Perennis; Insular. Canar.

N. B. Floribus spicatis; foliis compositis.
OF. *Melissa canariensis.* IT, *Melissa delle Canarie.* A. *Canary dragon's head; or balm of gilead.*

QUAL. Eximia: Odor intense fragrans; sapor gratus, aromaticus.

VIRT. Excitans; nervina: stomachica.

USUS. Cachexiæ; cephalalgia; cardialgia.

DRACOCEPHALUM MOLDAVICUM.

CL. et O. præced. Annua.

IT. *Melissa Turca.*

QUAL. et VIRT.. Multo debilior præced.

DROSERA ROTUNDIFOLIA.

Herba.

CL. *Pentand.* O. *Tetrag.*

Biennis.

OF. *Ros solis; rosella.* IT. *Rorella.* A. *Round leaved sun dew, or rosa solis.*

QUAL. Lactescens; sapor acris.

VIRT. Corrodens.

USUS.

E.

ECHITES SYPHILITICA.

Folia; Herba.

Pentand. O. Monog. Fruticosa; Surinam.
AL Lactescens.
RT. Antisyphilitica?
US decocti: Syphilis.

VIDENDRUM VANILLA. Siliqua.
.. Gynand. O. Diandr. Fruticosa; para-
sitica. Ind. occident..
F. Vanilla IT. Vaniglia. G. Vanille. GE.
Vanillen. A. Vanilla.
QUAL Eximia: pinguis; odor ambrosiacus;
sapor gratus, aromaticus.
VIRT. Stimulans; calefaciens; nervina; aphro-
disiaca.
USUS. Potissimum ut choccoladæ ingrediens.
DOSIS. Drach. semis.

EQUISETUM ARVENSE. Herba.
CL. Cryptog. O. Filices. Perenniss.
OF. Equisetum; cauda equina. IT. Coda ca-
vallina. A. Corn horse-tail.
QUAL.
VIRT. Adstringens; diuretica.
USUS. Blennorrhœa; apocenos; tabes? Hæ-
maturia?

EQUISETUM. HYEMALE:
IT. Paltrufalo.
QUAL. et VIRT. Præced.

ERIGERON ACRE. Herba.

CL. *Syngen.* O. *Polyg. superfl.* Perennis.
 OF. *Coniza cœrulea.* IT. *Erigero.* A. *Blue eri-*
geron.
 QUAL. Sapor acris; synapim æmulans.
 VIRT. Antiscorbutica.

ERVUM LENS. Semen.
 CL. *Diadelph.* O. *Decand.* Annua.
 OF. *Lens; lentium semen.* IT. *Lenticchia,* o
Lente.
 QUAL. Farinacea.
 VIRT. ?
 USUS. .

ERVUM ERVILIA. Semen.
 CL. et O. præced. Annua; Europ. a. str.
 OF. *Ervii s. orobi semen.* IT. *Orobo,* *Mocco,*
Veccia. A. *Flat-seeded tare, or common lentil.*
 QUAL. Farinacea.
 VIRT. .
 USUS.

ERYNGIUM CAMPESTRE. Radix.
 CL. *Pentand.* O. *Digyn.* Perennis; maritim.
 OF. *Eryngium vulgare.* IT. *Iringo,* *Eringio,*
Calcatreppo. G. *Chardon-noland.* GE. *Ma-*
nustrea; brachdistel. A. *Common Eryngo.*
 QUAL. Sapor dulcescens, subaromaticus.
 VIRT. Diuretica; aphrodisiaca?
 USUS. Tabes pulmonalis ulcerosa.
 DOSIS. Uac. semis ad ʒi aquæ pro infuso
 quotidie.

ERYNGIUM FÆTIDUM.

Herba.

CL. et O. *Præced.*

Americ.

QUAL. Eximia: odor teter; foetidissimus, tenax.

VIRT. Cathartica; diuretica; antispasmodica.

USUS. Hysteria; hydrops.

ERYSIMUM ALLIARIA.

Herba.

CL. *Tetrad.* O. *Siliq.*Perennis; in locis
umbrosis.OF. *Herba alliariæ.* IT. *Alliaria.* A. *Stinking
hedge-mustard, or sauce-alone.*

QUAL. In principio acri residens; odor alliaceus; sapor amarus.

VIRT. Diuretica; errhina; antiscorbutica.

USUS. Asthma; ulcus putridum.

ERYSIMUM BARBAREA.

Folia.

CL. et O. *præced.*

Perennis.

OF. *Barbareæ folia.* IT. *Erba di s. Barbara.*
G. *Herbe St. Barbe.* A. *Common winter
hedge mustard or cress.*

QUAL. Sapor amarus, subacris; odor herbaceus.

USUS. Antiscorbutica.

ERYSIMUM OFFICINALE.

Herba recens
et fructus.CL. et O. *præced.*Annua; ad vias et in
sabulosis.OF. *Erysimum.* IT. *Erisimo.* G. *Vélar; tor-
terelle; herbe du chantre.* GE. *Wegsensf.* A.
Common hedge-mustard.

QUAL. In principio acris residens; sapor acris.

VIRT. Adstringens; diuretica; antiscorbutica.

PRÆP. Syrupus ex succo recenti paratus.

USUS Syrupi egregius: Paraphonia; rauco; tussis; ischuria?

EUPATORIUM CANNABINUM. Herba; radix.

CL. Syng. O. Polyg. æqual. Perennis.

OF. Eupatorium. IT. Eupatorio comune. G.

Eupatoire d'Avicenne. GE. Wasserdost; künigundenkraut. A. Common eupatorium; or hemp-agrimony.

QUAL. Sapor intense amarus; odor acris, penetrans.

VIRT. Radicis: diuretica; cathartica; emetica.

USUS. Cachexiæ; hydrops; hydrocele.

EUPHORBIA CANESCENS.

CL. Dodecand. O. Trigyn.

QUAL. Acris.

VIRT. Antisyphilitica?

USUS Americanis: syphilis.

EUPHORBIA ESULA.

Succus foliorum
expressus.

CL. et O. præced. In sepibus et locis aridis.

OF. Esula. IT. Pitiusa, o Esula maggiore.

GE. Wolfsmilch.

QUAL.

VIRT.?

USUS. Icterus.

DOS. *succi* drachm. β - j - unc. semis omni mane.
PRÆP. Extractum-gr. viij-x.

EUPHORBIA OFFICINARUM. Succus
gummi-resinosus incisione plante obtentus.

CL. et O. præced. Fruticosa.

OF. Gummi Euphorbium. IT. Euforbio, o Lattarolo. G. Euphorbe. GE. Euphorstenharz.
A. Euphorbium, or officinal spurge.

QUAL. Lactescens; in principio acris resinoso residens; sapor acris, urens.

VIRT. Drastico-cathartica; errhina; rubefaciens; vesicans.

PRÆP. Tinctura; emplastrum.

USUS externus pulveris (melius tincturæ): punctura; caries. Emplastri: Arthrodynia rheumatica.

N. B. Euphorbiæ diversæ species qualitate et virtute fere similes sunt.

EUPHORBIA. LATHYRIS. Semen.

CL. et O. præced. Biennis; Europ. austr.

OF. Cataputia minor. IT. Catapuzza. GE. Purgier-kærner; spring kærner. A. Caper spurge.

QUAL. Lactescens; acris.

VIRT. Emetica; drastico-cathartica; corrodens.

EUPHORBIA PALUSTRIS. Succus foliorum expressus et inspissatus; radix; cortex radicis.

CL. et O. præced.

Perennis.

OF. *Tithymalus*. IT. *Titimalo*, o *Tiamaglio*
palustre. G. *Tithymale* des marais. GE.
Marsh spurge.

QUAL. Lactescens; acris.

VIRT. Drastico-cathartica; errhina; corrodens;
vesicans.

USUS externus: Tinea; verruca; clavus; ser-
pigo; odontalgia.

DOSIS succi inspissati gr. viij - xii - 3j.

EUPHORBIA PARVIFLORA.

Herba.

CL. et O. præced.

Ind. occident.

QUAL.

VIRT. Antisyphilitica?

USUS decocti: Syphilis.

EUPHRASIA OFFICINALIS.

Herba.

CL. *Didyn*. O. *Angiosp*.

Annua in collibus
siccis, sterilibus.

OF. *Euphrasia*. IT. *Eufragia*. G. *Euphrase*.

A. Common eye-bright.

QUAL. Pinguis; amaricans.

VIRT?

USUS. Ophthalmia.

EXCOECARIA AGALLOCHA.

Lignum.

OF. *Agallochum verum*. Vide *Alöexilum ve-*
rum.

F.

FAGARA OCTANDRA. Resina sponte, vel
incisione corticis, exsudans (JACQUIN).

CL. *Tetrand. O. Monog.* *Arborea; insulæ
Curaçao.*

IT. *Taccamacca.*

QUAL. Odor ambrosiacus.

USUS. Ad suffimigia.

Vide etiam *Populus balsamifera.*

FAGARA PTEROTA. *Bacçæ.*

CL. *et O. præced.* *Arborea; Jamaic.*

IT. *Fagara delle Filippine.*

QUAL. Subacris; aromatica.

VIRT. Calefaciens; stomachica.

USUS.

FERULA ASSA FÆTIDA. Sucus gummi-
resinosus, incisione radicis plantæ obten-
tus, concretus.

CL. *Pentand. O. Digyn.* *Perennis; Persiæ.*

OF. *Assa fætida; gummi assæ fætidiæ.* **IT.**

*Assa fetida. G. Assa fætida. GE. Teufels-
dreck; stinkender assaud. A. Assa fætida.*

QUAL. In oleo volatili et principio resinoso
residens; sapor acris, aromaticus, nauseo-
sus; odor alliaceus. Gummi-resina ex $\frac{2}{3}$ gum-
mi et $\frac{1}{3}$ resinæ constans.

VIRT. Stimulans; antispasmodica; anthelmintica; carminativa; menagoga; deobstruens; resolvens.

USUS *internus* et *externus* forma pilularum, tincturæ, enematis, emplastri: Hysteria; convulsio; cardialgia spasmodica; colica flatulenta; tympanitis; asthma spasmodicum; pertussis; physconia abdominalis; vermes: paronychia; bubo; caries.

DOSES *pulveris*: Gran. X-XL-LX *Tincturæ*: gutt X-XXX-℥ij.

PRÆP. Tinctura; emplastrum; pilulæ.

FEVILLEA TRILOBATA.

VIRT. Morsura serpentum.

FICUS CARICA.

Fructus.

CL. *Polyg.* O. *Dīac.* *Arborea*; *Europ. austr.*

OF. *Carica pinguis*; *ficus.* **IT.** *Fico.* **G.** *Figues.* **GE.** *Feigen.* **A.** *Common figue-tree.*

QUAL. Dulcis; mucilaginosus.

VIRT. Nutriens; emolliens; maturans; obtundens; expectorans; eccoprotica; herpetica?

USUS *decocti internus*: Raucedo; tussis; colica pictonum; obstipatio. *Externus* in lacte decocti. vel assati fructus forma cataplasmatibus: Odontalgia; phlegmone; cynanche; bubo; anthrax.

FICUS INDICA. Substantia gummi-resinosa punctura insecti ex
 — **RELIGIOSA.** arbore exsudans; ejusque nidum constituens.
CL. et **O.** *Præced.* *Arborea; Ind. orient.*
OF. *Gummi-laca in granis.* Igne fusa: *Gummi-laca in tabulis dicta.* **IT.** *Lacca.* **Vid.**
COCCUS.

QUAL.

VIRT. *Adstringens.*

USUS *externus tincturæ: Laxitas gingivarum: Item ad ceram sigillatoriam conficiendam.*

FRAGARIA VESCA. Radix; herba; fructus recens.

CL. *Icosand.* **O.** *Polyg.* *Perennis.*

OF. *Fragaria; fraga.* **IT.** *Fragaria, e Fragole.* **G.** *Fraisier ordinaire s. Fragaire: fraises.* **GE.** *Erdbeeren.* **A.** *Strawbery.*

QUAL. *Radicis et herbæ: Subastringens; fructus: Sapor acidulo-dulcis; odor fragrans.*

VIRT. *Diuretica; eccoprotica; refrigerans.*

USUS.

FRAXINUS EXCELSIOR. Cortex ramulorum; semen; folia.

CL. *Polyg.* **O.** *Diæc.* *Arborea.*

OF. *Cortex fraxini.* **IT.** *Frassino.* **G.** *Ecorce du frêne ordinaire.* **GE.** *Escheminde.* **A.** *Common ash.*

QUAL. *Corticis: Sapor amaricans. Semen: aromaticus.*

MEDICAE

105

VIRT. *Corticis*: Antiseptica. *Seminum*: Diuretica; aphrodisiaca?

USUS *Corticis*, loco cinchonæ officinalis: intermittentes. *Seminum*: Lithiasis? Polysarcia? *Foliorum*: Morsura serpentum?

FRAXINUS ROTUNDIFOLIA.) Succus saccharinus ex arbore exsudans.
Aliæque SPECIES.)

CL. et O. præced. Arborea; Europ. austr.

OF. *Manna*. IT. *Manna in Cannuoli*. G. *Manne*. GE. *Manna*. A. *Manna*.

QUAL. In principio saccharino mucilaginoso residens; sapor nauseoso-dulcis.

VIRT. Eccoprotica.

USUS. Obstipatio.

DOS. Unc-j. Infantibus drach. j-iiij.

FUCUS VESICULOSUS. Cineres.

CL. Cryptog. O. Algæ.

OF. *Quercus marina*; *æthiops vegetabilis*. IT. *Fuco marino*. GE. *Varec*.

QUAL. Salina; alkalina.

USUS *Calcinati*: Bronchocele; scrophula.

DOS. Drach. j. bis de die.

FUMARIA BULBOSA. Radix.

CL. *Diadelph*. O. *Hexand*. Perennis; in umbrosis.

Variet. A. Radice cava. B Radice non cava.

OF. *Aristolochia cava*, s. *fabacea*. IT. *Capno*.

GE. *Runde hohl-wurzel.* A. *Hollow-rooted et solid-rooted bulbous fumitory.*

QUAL. Sapor amarus; debilior sequenti.

VIRT. Stomachica.

FUMARIA OFFICINALIS.

Herba recens;
succus.

CL. et O. *præced.*

Annua; in campis.

OF. *Fumaria.* IT. *Fumosterno, Fumoterra, Fumaria.* G. *Fumeterre ordinaire.* GE. *Erdrauch; taubenknopf.* A. *Common fumitory.*

QUAL. Inolora; sapor pure et intense amarus.

VIRT. Stomachica; antacida.

USUS. Dyspepsia; morbi cutis; cachexia; physconia abdominalis.

DOS. succi herbæ recentis expressi unc. ij bis de die. *Extracti:* Drach. j-ij.

PRÆP. Extractum; conserva; syrupus; tinctura.

G

GALEGA OFFICINALIS.

Herba.

CT. *Diadelph.* O. *Decand.* *Perennis; Europ. austr.*

OF. *Galega.* IT. *Galega, Ruta Capraria, o Lavanese.* GE. *Geisraute; pestilenzkraut.* A. *Blue et red galega or goat's rue.*

QUAL. Sapor amaricans, mucilaginosus, subaromaticus.

VIRT.

USUS.

GALIUM APARINE. Succus ex herba;
primo vere collecta, expressus.

CL. *Tetrand.* O. *Monog.*

OF. *Aparine.* IT. *Speronella.* G. *Gaillet cro-*
chant; *grateron.* A. *Goosegrass.* H. *Amor*
de hortulano.

QUAL. Sapor adstringens.

VIRT.?

USUS. Scrophula; morbi cutanei?

DOS. Unc. iv bis de die.

GALIUM MOLLUGO. Herba cum floribus.

CL. et O. *præced.* Perennis.

OF. *Galium album.* IT. *Gallio volgare.* A.
Great ladies bed-straat.

QUAL.

VIRT.?

USUS *succi expressi*: Epilepsia.

DOS.: Unc. v-vj mane jejuno stomacho.}

GALIUM VERUM. Herba cum floribus,
seu coma.

CL. et O. *præced.* Perennis; in pratis et
muris antiquis,

OF. *Galium luteum.* IT. *Gallio.* G. *Gaillet*
vrai; *caille-lait.* GE. *Waldstroh*; *Bettstroh.*
A. *Yellow ladies bed-straw.* H. *Galio der-*
dadero; *cuajaleche.*

QUAL. Recentis: Odor fragrans; sapor adstringens.

VIRT. Coagulans lac.

USUS. Epilepsia; hæmaturia; hysteria.

GARCINIA MANGOSTANA. Cortex; capsulæ; medulla.

CL. *Dodecandr.* O. *Monog.* Arborea; Ind. orient.

OF. *Mangostana cortex.* A. Breadfruit-tree.

QUAL. Styptica. Medullæ: Farinacea.

USUS *infusi vel tincturæ cort.*: Dysenteria; tenesmus; apthæ.

GENISTA CANARIENSIS. Radix lignosa.

AR. lignum Rhodium?

CL. *Diadelph.* O. *Decand.* Arborea; insulæ Canariensis.

IT. *Ginestra delle Canarie.* A. Canary genista, or cytisus.

QUAL. Odor fragrans, roseus; sapor subamarus, resinosus.

VIRT. Sudorifica.

USUS.

PRÆP. Oleum volatile.

GENISTA TINCTORIA. Herba; flores; semen.

CL. et O. *peæced.* Fruticosa.

IT. *Ginestra.*

QUAL. Lateo-tinctoria, inodora, insipida.

VIRT.

USUS. Hydrops.

MEDICA.

109

GENTIANA AMARELLA.

Herba.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.* Perennis; alpina.

GF. *Gentianella.* IT. *Genzianella* Volg. *Pettimborsa.* GE. *Hoher Himmelsstengel*; *herbst-enzian.* A. *Autumnal gentian.*

QUAL. Sapor intense amarus.

VIRT. Stomachica; anthelminthica.

USUS.

GENTIANA ASCLEPIADEA.

Radix.

A. *Swallowwort-leaved gentian.*

QUAL. et VIRT. Eadem ac præced.

USUS idem.

GENTIANA CRUCIATA.

Radix.

IT. *Genziana cruciata.* A. *Crosswort gentian.*

QUAL. et VIRT. Eadem ac præced.

GENTIANA CENTAUREUM.

Herba; ca-
cumen.

CL. et O. præced.

GF. *Centaureum minus.* IT. *Centaurea minore*, o *Biondella.* G. *Petite centauree.* GE. *Tausendguldenkraut*; *Fieberkraut.* A. *Centaury gentian* or *lesser centaury.* H. *Gentiana centaura.*

QUAL. et VIRT. Eadem ac sequentis.

PRÆP. Extractum.

DOSES. Scrup. j - drach. j.

GENTIANA LUTEA.

Radix.

CL. et O. præced: *Perennis ; alpina.*
 OF. *Gentiana rubra.* IT. *Genziana maggiore.*
 G. *Gentiane.* GE. *Rother enzian.* A. *Yellow gentian.*

QUAL. Intense et pure amara.

VIRT. Stomachica ; antiseptica ; anthelminthica.

USUS. *extracti*: Dyspepsia ; Icterus ; intermittentes ; physconia abdominal. ; leucophlegmatia ; chlorosis ; podagra ; vermes.

PRÆP. Extractum ; infusum aquosum vel vinosum.

DOSIS. ℞j-℞j.

GENTIANA PURPUREA.

Radix.

CL. et O. præced.

Norwegica.

NORWEGIS: *Skorsite.* OF. *Radix cursuta.* A. *Pueple gentian.*

QUAL. VIRT. et USUS. Præced.

GEOFFROYA INERMIS (HORT. KEW.)

Cortex.

L. *Diadelph.* O. *Decand.* *Arborea ; Jamaic.*

T. *Geoffroea della Giamaica.* GE. *Kohlbaum-rinde.* A. *Smooth Geoffroya or bastard cabbage-tree.*

QUAL. Odor nauseosus ; sapor nauseoso-dulcis.

VIRT. Drastico-cathartica ; emetica ; anthelminthica.

USUS *decocti* :

DOS. *pulveris corticis*: Unc j ad ℥ij aquæ coctæ ad ℥ijß.—Sumendo unc. j omni hora, donec alvum movere incipiat.

M E D I C A.

GEOFFROYA SURINAMENSIS.

III

Cortex.

Surinam.

IT. *Geoffroea del Surinam.*

QUAL.

VIRT. Anthelminthica efficax, ubi alia fessellérunt.

USUS Idem ac præced.

DOS. Drach. iij ad aquæ colat. $\frac{z}{3}$ viij pro adulto; minuendo pro junioribus.

GERANIUM MOSCATUM.

Herba.

CL. *Monadelph. O. Decand.*

Annua.

IT. *Aco moscato, o de' Pastori; Geranio.*

QUAL. Odor ambrosiacus, moschatus.

VIRT.

USUS.

GERANIUM ROBERTIANUM.

Herba.

IT. *Geranio Roberziano. G. Herbe à Robert.*

A. *Stinking crane-bill or herb Robert.*

QUAL. Odor hircinus; sapor salsus, substyp-ticus.

VIRT. Subastringens; lactifuga?

USUS. Hæmaturia: profluvia. Externus: Bubo; ulcera vulvæ aut mammarum; Rhagas.

GEUM RIVALE.

Radix.

CL. *Icosand. O. Polyg.*

Perennis; in locis

humidis; nemorosis.

OF. *Geum rivale, seu palustre.* IT. *Geo. G.*

Benoite aquatique. GE. Wasser-benedikten-

wurzel. A. Water avens.

QUAL. Præstans : sapor amaricans , substypticus.

VIRT. Adstringens.

USUS *pulveris radiceis extern.* Ulcera syphilitica.

Internus : Diarrhœa atonica ; chlorosis , intermittentes.

DOS. *pulveris* : Scrup. ij-drach j. Pro *decocto* unc ʒ ad ʒʒ aquæ.

GEUM URBANUM. Radix ; fibræ radiceis (primo vere ex solo sicco colligendæ).

CL. et O. *præced.* *Pereunis* ; in locis umbrosis , nemorosis.

OF. *Radix caryophyllatæ s. gei urbani.* IT. *Garofillata.* G. *Benoite caryophyllée.* GE. *Benediktenwurzel* ; *Nelkenwurzel.* A. *Common avens or herb bennet.* H. *Geodæmestico.*

QUAL. In principio adstringente cum pauco oleo volatili residens ; sapor subaromaticus , amaricans ; odor fragrans caryophylli.

VIRT. Roborans ; antiseptica ; cinchonæ virtutes æmulans.

USUS. Egregius , loco cinchonæ : Intermittentes rebelles ; febres atonicæ ; dyspepsia ; diarrhœa ; amenorrhœa atonica ; chlorosis.

DOS. *pulveris* : Drach j cum melle vel syrupo corticis auranti. *Decocti aut mellis infusi* : Unc j ad ʒʒ aquæ.

PRÆP. Extractum ; tinctura dosi ʒʒ ter , quaterve , tempore apyrexia.

GLADIOLUS COMMUNIS.

Radix.

Variet.: A. Flore rubro. B. Flore incarnato.
C. Flore albo.

CL. Triand. O. Monog. In locis nemorosis.

OF. Radix victoralis rotundæ. IT. Ghiaggi-
tolo. GE. Allermannharnisch. A. Cornflag.

QUAL.

VIRT. Aphrodisiaca?

USUS.

GLECOMA HEDERACEA.

Herba.

CL. Didyn. O. Gymnosp.

Perennis.

OF. Hedera terrestris. IT. Ellera, o Edera
terrestre. G. Lierre terrestre. GE. Gundelre-
ben; gundermann; erdepheu. A. Ground-
ivy. H. Yedra terrestre.

QUAL. Sapor amaricans, subacris.

VIRT. Expectorans; roborans.

USUS infusi cum lacte vel aqua: Catarrhus
atonicus; tabes ulcerosa.

GLOBULARIA ALYPUM.

Folia.

CL. et O. præced. Suffrutex; Europ. austr.;
in sylvis saxosis.

OF. Globularia. IT. Alipio.

QUAL. Sapor amarus.

VIRT.

USUS. Intermittentes; obstipatio.

GLYCYRRHIZA GLABRA.) Radix ; succus
 ————— ECCHINATA.) radicis expres-
) sus , et inspissatus.

CL. *Diadelph. O. Decand.* Perennis ; Europ. austr.

OF. *Liquiritia ; glycyrrhiza.* IT. *Regolizia , o Liquirizia.* G. *Réglisse.* GE. *Süssholz.* A. *Common liquorice et prickley headed liquorice.* H. *Regaliz ; orozuz ; palo dulce.*

QUAL. In principio mucilaginoso-saccharino residens ; sapor dulcis , subacris , amaricans.

VIRT. Demulcens ; expectorans.

USUS in infuso cum aliis. — *Succi* : Catarrhus ; paraphonia ; stranguria.

PRÆP. Succus inspissatus vulgo extractum.

GNAPHALIUM ARENARIUM. Flores.

CL. *Syng. O. Polyg. superfl.* Perennis ; in collibus sterilibus.

OF *Stæchas citrina.* IT. *Stecade.* GE. *Reinblumen.* A. *Everlasting.*

QUAL. Odor suav. olens . moschum quodammodo referens ; sapor aromaticus , substyp-ticus.

VIRT.

USUS.

GNAPHALIUM DIOICUM. Flores.

OF. *Pescati.* A. *Mountain everlasting or cudweed.*

QUAL. Substyptica.

VIRT. Eadem ac præced.

GOSSYPIUM HERBACEUM.) Lana semen cir-
(Aliæque SPECIES.) cumdans.

CL. *Monadelph. O. Decandr.* Ind. orient.
et occident.

OF. *Gossypium seu bombax.* IT. *Bambagia*,
o *Cotone.* G. *Coton.* GE. *Baumwolle.* A.
Common Cotton.

QUAL.

VIRT. Mechanica.

USUS.

GRATIOLA OFFICINALIS. Herba cum
floribus.

CL. *Diand. O. Monog.* Perennis ; in pratis
humidis , paludosis.

OF. *Gratiola.* IT. *Grazia Dei*, *graziola*, o
stanca cavallo. G. *Gratiolæ.* GE. *Wilder-*
aurin ; *erdgalle.* A. *Hedge-hyssop.* H. *Gra-*
ciola officinal.

QUAL. In principio extractivo residens ; odor
nauseosus ; sapor intense amarus .nauseosus.

VIRT. Emetica ; drastico-cathartica ; anthel-
minthica.

USUS. Mania ; ascites ; vermes ; syphilis ? ul-
cera phagedænica.

DOS. Pulveris initio drach β bis die ; dein gr.
x-xv ter de die. In infuso drach iij ad
℥j aquæ.

GUAJACUM OFFICINALE. Lignum; cortex ligni; succus gummi-resinosus ex arbore exsudans, concretus.

CL. *Decand. O. Monog.* *Arborea; Ind. occident.*

OF. *Lignum guajacum s. lignum sanctum: Gummi guajacum; resina guajaci. IT. Ligno Santo, o Guajacano. G. Gayac; gomme guajac. GE. Guajakholz; franzosen-holz: guajak-gummi; guajak-harz. A. Officinal guajacum, or lignum vitæ: gum-guajac. H. Guajaco officinal.*

QUAL. *Cort. et ligni: Sapor amaricans, subacris. Gummi-resinæ: Sapor acris, pungens.*

VIRT. *Præstans: stimulans; sudorifica; alterans. Extracti errhina.*

USUS. *Syphilis; arthritis vaga; arthrodynia rheumatica et arthritica; morbi pulmonum atonici; leucorrhœa; morbi cutanei; podagra atonica, retrocedens.*

DOS. *Ligni rasi vel corticis ligni: In decocto unc. j ad ℥ij aquæ coct. ad colat. ℥j. Gummi-resinæ: Gran x-xx-drach j forma pulveris, vel in alcohole diluto soluta.*

PRÆP. *Gummi-resina; xtractum; tinctura; oleum volatile.*

GUAJACUM SANCTUM

VIRT. *Eadem ac guajaci officinalis.*

GUILANDINA MORINGA. Lignum; fructus; oleum fructus.

CL. *Decand. O. Monog* *Arborea; Afria. et Ind. orient.*

An lignum Nephriticum et oleum Behen ex hac planta proveniunt?

OF. *Lignum nephriticum: Nuces behen s. been s. balani myristicæ s. glandes unguentariæ.*

IT. *Legno Palo, o Nefritico, Noci, ed Olio di Ben.* **GE.** *Griesholz: Been-nüsse.* **A.** *Smooth bonduc.*

QUAL. *Ligni: Flavo-palescens; cæruleo tingens; sapor subacris, amaricans.*

VIRT. *Fructus: Mucilaginoso, oleoso. Olei fructus: Pinguis, tardissime rancescens.*

USUS ligni: *Nephritis calculosa? Psora.*

PRÆP. *Tinctura; oleum fixum Behen dictum.*

GUMMI-RESINÆ. Seu extractivo-resinæ.

GUMMI-RESINA ALOES.

Vide Aloë perfoliata.

IT. *Aloe.*

N. B. Aloë socotrina, maxima parte principio extractivo, et paucis solum resinosis; hepatica anatica fere portione horum principiorum constat.

GUMMI-RESINA AMMONIACUM. Obscura.

An umbellifera? *Ægypt.*

OF. *Gummi ammoniacum.* **IT.** *Gomm' Ammo-*

nia, o *Ammoniaco*. G. *Gomme ammoniac*.

GE. *Ammoniak-gummi*. A. *Gum-ammoniac*.

QUAL. Odor alliaceus, ingratus; sapor nauseosus, amarus, acris.

VIRT. Stimulans; antispasmodica; expectorans; deobstruens; *extern.* resolvens.

USUS *internus*: Asthma; expectoratio difficilis; phrysconia abdominalis. *Externus*: Aceto scillitico soluta forma emplastri et unguenti: Lupia; tumores articulorum frigidi; hydarthrus.

N. B. Hoc medicamentum tumore genu dolentissimo (arthritico) affectus in me ipso primus tentavi, ejusque usu pedem ab amputatione servavi; inde hoc scopo in praxin medicam introductum fuit Londini.

DOS. Scrup. j - ij - iij.

PRÆP. Pilulæ; emulsio; solutio in aceto scillæ maritimæ; emplastrum.

GUMMI-RESINH ASSÆ FÆTIDÆ.

Vide Ferula assa foetida.

GUMMI-RESINA BDELLIUM.

Obscura.

Arab.; Afric.

IT. *Bdellio*.

QUAL. Odor fragrans; sapor amarus.

VIRT. Stimulans; deobstruens; resolvens; maturans.

USUS *externus*: Forma emplasiri vel unguenti.

GUMMI-RESINA CAMBOGIAE.

Vide Cambogia gutta.

IT. *Gommagotta.*

N. B. Ex stalagmite cambogioide, cambogia gutta, guttafera vera, hyperico baccifero, aut pneumonanthis specie promiscue desumi creditur.

GUMMI-RESINA CARANNA.

Obscura.

An palmæ species?

Amer. morid.

OF. *Carannæ gummi.* IT. *Caranna.*

QUAL.

VIRT. Stimulans; resolvens; maturans.

USUS *externus*: Tumores frigidi.

GUMMI-RESINA CATECHU.

Vide Mimosa Catechu.

OF. *Terra Japonica; succus Japonicus; catechu.*

GUMMI-RESINA EUPHORBIAE.

Vide Euphorbia officinalis.

GUMMI-RESINA GALBANUM.

Vide Bubon galbanum.

GUMMI-RESINA GALDA.

Obscura.

OF. *Gummi galda.* IT. *Gomina galda.*

QUAL. Odor et sapor resinæ amyr. elemiferæ.

VIRT. Stimulans; expectorans; resolvens.

USUS.

GUMMI-RESINA GUAJACI.

Vide Guajacum officinale.

GUMMI-RESINA HEDERAE.

Vide Hedera helix.

GUMMI-RESINA JUNIPERI.

*Vide Juniperus lycia.*OF. *Olibanum*, *Thus*.

GUMMI-RESINA KIKEKUNEMALO. Obscura.

OF. *Kikekunemalo gummi*. IT. *Kikekunemalo*.

QUAL. Sapor subacris, resinosus.

VIRT. Antispasmodica; nervina; resolvens.

USUS.

GUMMI-RESINA KINO.

Obscura
*Africana*OF. *Gummi kino* s. *gummi rubrum Gambiense*. IT. *Gommi astringente*, o *Kino*.

QUAL. Eximia: styptica; extractivo-resinosa.

VIRT. Adstringens; roborans; antiseptica.

USUS *pulv. vel infusi intern. et extern.*: Ille.
'morrhagiæ; hæmorrhœæ; blennorrhœa; diarrhœa. *Amaris juncta*: Intermittentes.DOS. *pulv.* ℥j-ijß. pro infuso ℥jß ad ℥ij
aquæ, cujus unc. ij-ij ter quaterve de m.PRÆP. Tinctura cum alcohole diluto parata
℥jß pro dosi.

GUMMI-RESINA LACCA.

MEDICA.

121

Vide Ficus indica.

Ind. orient.

OF. *Gummi Lacca.*

GUMMI-RESINA LOOK.

Obscura.

OF. *Look gummi.* IT. *Gomma* Look.

QUAL. Potissimum resinosa.

VIRT. Stimulans; resolvens.

USUS.

GUMMI-RESINA LUTEA.

Obscura.

Novæ Hollandiæ.

FF. *Resina gialla del nuovo Belgio.*

QUAL.

VIRT.

USUS. Dysenteria; alvi profluvia.

GUMMI-RESINA MYRRHA.

Obscura.

Vide Laurus myrrha.

*Arborea; Littoris merid. et orient.
maris rubri.*

An *Mimosæ*, an lauri species?

OF. *Myrrha*; *gummi myrrhæ.* G. *Gomme myrrhe.* GE. *Myrrhen.* A. *Myrrha.*

QUAL. Sapor aromaticus, intense amarus, subacris.

VIRT. Stomachica; stimulans; menagoga.

USUS *internus* *Myrrhæ* masticatæ vel solutæ in alcohole diluto: Dyspepsia; hysteria; asthma pituitosum; catarrhus; amenorrhœa atonica. *Externus*: Caries; ulcus; fistula; angina; cynanche atonica; laxitas gingivarum; aphtha.

DOS. Gran x - ℥ij.

PRÆP. Tinctura. Drach β - j pro dosi.

GUMMI-RESINA OLAMPI.

Obscura.

Americ.

OF. *Olampi gummi.* IT. *Gomma Olampi.*

QUAL.

VIRT.

USUS.

GUMMI-RESINA OPOPANACIS.

Vide Pastinaca opopanax.

GUMMI-RESINA PAPAVERIS.

Vide Papaver somniferum.

OF. *Opium* — VETERIBUS. *Lachryma papaveris.*

GUMMI-RESINA RAKASIRA.

Obscura.

An balsamum?

OF. *Rakasira balsamum.* IT. *Balsamo Rakasira.*

QUAL. Sapor subamarus, balsamicus,

GUMMI-RESINA SACAPENUM.

Obscura.

Africana.

OF. *Gummi sagapenum s. serapinum.* IT. *Sagapeno.*

QUAL. Odor alliaceus, ingratus; sapor acris; nauseosus, amaricans.

VIRT. Stimulans; nervina; antispasmodica; a 3^o oga; deobstruens; resolvens.

USUS. Hysteria; amenorrhœa atonica; tumores frigidi; physconia abdominalis. Forma pulveris vel solutionis in alcohole diluto.

DOS. Gran. x-xx-xxx.

GUMMI-RESINA SARCOCOLLA.

An ex Penea sarcocolla? *Vide* Penea.

OF. *Gummi sarcocolla.*

QUAL. Sapor nauseosus, amaro-dulcis, acris.

GUTTÆFERA VERA. (KÆNIG). Succus gummi-resinosus, ex cortice trunci aut ex foliis et ramulis fractis promanans (*vulgo* gummi-gutta dictus).

Arborea; Siamensis; Zeylanica.

OF. *Gummi-gutta s. gummi gambogia.*

N. B. *Vide* etiam Hypericum et Cambogia.

GYPSOPHILA STRUTHIUM.

Radix.

CL. *Decand. O. Digyn.*

IT. *Struccio?*

QUAL. Saponacea.

H.

HÆMATOXYLUM CAMPECHIANUM. Lignum.

CL. *Decand. O. Monog. Arborea; Amer. merid.*

OF. *Lignum campechianum s. Campechense.*

IT. *Legno Campece, o Legno d'India. G.*

Bois de campêche. GE. Kampsch-holz;

blauholz. A. Logwood.

QUAL. Tinctoria; sapor stypticus.

VIRT. Roborans; adstringens.

USUS decocti vel extracti: Diarrhœa; sub finem dysenteria.

DOS. Unc. ij ad ℥ij aquæ coctæ ad ℥j.

PRÆP. Extractum gran. X-XL pro dosi.

HEDERA HELIX. Folia; baccæ; succus gummi-resinosus incisione corticis obtentus, concretus.

CL. Pentand. O. Monog. *Fruticosa.*

OF. *Hedera arborea; gummi hederæ.* **IT.** *Edera; Foglie, Bacche, Gomma d'Edera.* **GE.** *Epheu; Eppich; immergrün: Epheuharz.*
A. *Common Ivy.*

QUAL. foliorum: Sapor amarus, stypticus, nauseosus. *Baccarum:* Sapor amarus, acidus. *Gummi-resinæ:* Odor et sapor leviter aromaticus.

VIRT.

USUS infusi foliorum: Atrophia infantum; Rhachitis; ozæna; ulcera; epiphora; fonticuli.

HEDYOTIS AURICULARIA. *Herba.*

CL. Tetrand. O. Monog. *Frutic. Zylonica.*

IT. *Valerianella?*

QUAL. Odor fragrans.

VIRT.

USUS. Cophosis.

HELLEBORUS FÆTIDUS. *Herba; folia; succus expressus.*

CL. *Polyand.* O. *Polyg.* *Perennis; Europ. austr.*

OF. *Helleborus fœtidus* s. *helleboraster*. IT. *Elleboro fetido*; *Elleborastro*; *Piede di Grifone*. GE. *Stinkende Niesswurz*. A. *Fœtid Hellebore* or *bears foot*.

QUAL. *Præstans*: *Odor teter*; *sapor acris*, *amaricans*, *nauseosus*.

VIRT. *Emetica*; *cathartica*; *anthelminthica*; *deobstruens*.

USUS *succi vel pulv. foliorum*: *Asthma pituitosum*; *hypochondriasis*; *hysteria*; *physconia abdomin.*; *vermes*.

DOSIS.

HELLEBORUS NIGER.

Fibræ radiceis.

CL. *et* O. *præced.*

Perennis; alpina; Europ. austr.

OF. *Melampodium* s. *helleborus niger*. IT. *Elleboro nero*. G. *Hellébore*. GE. *Schwarze Niesswurz*. A. *Black hellebore*, or *christ-mass rose*. H. *Helleboro negro*.

QUAL. *In principio acri cum mucilaginoso resinoso residens*; *odor fœtidus*; *nauseosus*; *sapor amaricans*, *acris*.

VIRT. *Præcipue recentis*: *Drastico-cathartica*, *diuretica*; *menagoga*; *anthelminthica*; *deobstruens*.

USUS *extracti aut decocti (vel melius infusi)*: *Amenorrhœa*; *melancholia*; *mania*; *morbi cutis*; *quartana*; *physconia abdomin.*; *hydrops*; *vermes*; *psora*; *achor*.

DOS. Drach iij ad ℥j aquæ vel vini infusi.

Pulveris gran iij-x-xxx.

PRÆP. Tinctura dosi ℥j. Extractum dosi gran x-3℥ bis terve de die.

N. B. Cavendum ne cum radiculis adonidis vernalis, trollii Europæi, actææ spicata, astringentiæ majoris et præcipue aconiti nappelli confundatur: Priores debiliores; posterior venenata.

HELLEBORUS VIRIDIS.

Fibræ radicis.

IT. *Elleboro a fiori verdi.*

QUAL. Sapor magis amarus, nauseosus, et acrior helleboro nigro.

VIRT.

USUS.

HERACLEUM SPONDILIUM.

Radix.

CL. *Pentand. O. Digyn.*

A. *Common cow-parsnep.*

QUAL. Mucilaginoso-dulcis; subaromatica.

VIRT.

USUS.

HERNIARIA GLABRA.

Herba.

CL. *Pentand. O. Digyn.*

Annua.

IT. *Erniaria. G. Herniaire ou turquette. A.*

Smooth rupture-wort.

QUAL. Inodora; insipida.

HERNIARIA HIRUTA.

A. *Hairy rupture-wort.*

Annual

VIRT.?

HIBISCUS ABELMOSCHUS.

Semen.

CL. *Monadelph. O. Polyand.*

Fruticosa;

Asiatica.

OF. *Semen abelmoschi s. grana moschata. IT.*

Grani moscati, d' Abelmusco. G. Graine de musc; herbe à la poudre de Chypre. A. Target-leaved hibiscus.

QUAL. *Odor ambrosiacus.*

VIRT.

USUS. *Cosmeticus: Tinea.*

HIERACIUM PILOSELLA.

Herba.

CL. *Syng. O. Polyg. æqual.*

Perennis.

OF. *Herba auriculæ muris. IT. Orecchia d' topo. G. Mausverchen. A. Mouseear hawk-weed.*

QUAL. *Lactescens; sapor amarus.*

VIRT. *Adstringens.*

USUS. *Hernia; diarrhœa; psora; herpes.*

HORDEUM DISTICON.

Semen; semen

excorticatum; maltum.

CL. *Triand. O. Digyn.*

Cercile; annum.

OF. *Semen hordei: hordeum pertatum: maltum. IT. Orzo mondato, Germanico. G.*

Orge GE. Gerste: Geisten graupen: Malz.

A. Common barley: barley; pearl-barley:

malt.

QUAL. Mucilaginoso; farinacea.

VIRT. *seminis*: Demulcens; emolliens; nutritiens. *Malti*: Antiseptica.

USUS *decocti malti*: Scorbutus.

PRÆP. Cerevisia; alcohol; acetum.

HORDEUM VULGARE.

Semen.

IT. *Orzo comune*. A. *Spring barley*.

USUS idem ac prioris.

HUMULUS LUPULUS

Strobuli.

CL. *Diæc.* O. *Pentand.*

Perennis.

OF. *Lupulus*. IT. *Lupolo*. G. *Houblon*. GE. *Hopfen*. A. *Hops*. H. *Hombrecillo*.

QUAL. Odor grate aromaticus, nidorosus; sapor amarus.

VIRT. Narcotica; stomachica.

USUS. Luxatio; alopecia? *Semin.* obstipatio.

HYMENÆA COURBARIL.

Resina ex cortice et radice arboris exsudans.

CL. *Decand.* O. *Monog.*

Arborea;

Brasiliensis.

OF. *Gummi seu resina anime*. IT. *Gomma anime*. A. *Locust-tree*.

QUAL. Subflavescens; pellucida; odor fragrans; sapor resinosus.

VIRT. Nervina.

USUS. Contractura; paralysis.

HYOSCIAMUS ALBUS.

Folia, semina.

CL. *Pent. O. Monog.* *Annua vel biennis.*
 IT. *Glusquiano coi fiori bianchi.* A. *White*
henbane.

QUAL. et VIRT. Eadem ac sequentis sed mi-
 tior.

USUS *extracti* : Amaurosis; cataracta.

HYOSCIAMUS NIGER.

Herba, folia
 recentia.

CL. et O, *præced.* *In desertis pinquibus.*

OF. *Hyosciamus.* IT. *Eiusquiamo nero.* G.
Jusquame. GE. *Bilsenkraut; Tollkraut.* A.
Black Henbane. H. *Belenno negro.*

QUAL. Venenata: In principio narcotico re-
 sidens; subinsipida; odor virosus.

VIRT. Narcotica; sedativa; antispasmodica;
 resolvens.

USUS. Paralysis; varix ani; hæmorrhagiæ ab
 irritatione; palpitatio; convulsio; epilepsia;
 mania. *Externe* forma cataplasmatidis: Scir-
 rhus.

N. B. Loco opii, præcipue ubi obstipatio
 usum opii contraindicat.

PRÆP. Extractum foliorum.

DOS. *Extracti* gran β ij-xx.

HYPERICUM BACCIFERUM.

————— GUTTIFERUM (RICHARD).

Quidam gummi-resinam, *gummi-gutta* dic-
 tam, ex hac planta derivant.

CL. *Polyadelph.* O. *Icosand.*

Cayenn.

HYPERICUM PERFORATUM.

Summitates
florentes.CL. *et O. præced.*

Perennis.

OF. *Hypericum*. IT. *Iperico*, o *Erba perforata*,G. *Millepertuis ordinaire*. GE. *Johanniskraut*.A. *Perforated St. John's wort*.

QUAL. Odor graveolens.

VIRT. Resolvens; anthelminthica.

USUS *infusi*: Tabes pulmonalis; hæmoptysis;
hæmaturia; vermes.

HYSSOPUS OFFICINALIS.

Herba.

CL. *Didyn*. O. *Gymnosp*.Suffruticosa;
hortensis.OF. *Herba hyssopi*. IT. *Issopo*. G. *Hyssope*.GE. *Isop*. A. *Common Hyssop*.QUAL. In oleo volatili cum principio extrac-
tivo amaro residens; odor nidorosus; sa-
por amarus, subaromaticus.VIRT. Stomachica; leniter stimulans; expec-
torans; resolvens.USUS *infusi*: Morbi pulmon. pituitosi; ecchy-
moma.

J.

JASMINUM OFFICINALE.

Flores.

CL. *Diandr*. O. *Monog*.

Arborea.

OF. *Jasminum*. IT. *Gelsomino*. G. *Jasmin*. GE.*Jasminblumen*. A. *Common white jasmine*.

QUAL. Odor fragrans.

VERT. Narcotica; sedativa.

USUS.

PRÆP. Oleum fragrans infusione paratum.

N. B. Flores nyctanthis et Philadelphi Coronariæ odorem jasmino similem largiuntur.

JATROPHA CURCAS. Semen.

CL. Monœc. O. Monadelph. Arborea; Americæ meridional.

OF. *Ricinus major*; fœus infernalis. IT. Ricino maggiore, Pinocchio di Barbaria, Mediciniere. A. Angularleaved physic-nut.

QUAL. Seminis: oleosa. Corticis seminum: Venenata.

JATROPHA ELASTICA. Succus lacteus incisione arboris extillans.

Hevea Gujanensis s. Peruviana. (AUBLET.).

CL. et O. præcel. Arborea; Amer. austr.

N. B. Ficus indica, cecropia peltata aliæque arbores similem succum erogant.

NATIVIS. Caout-chouc. OF. Resina elastica. IT. Gomma, o Resina elastica. G. Gomme ou résine élastique.

USUS eximius ad catheteres, candellas medicatas, et pessaria.

JATROPHA MANIHOT. Radix.

Amer. austr.

NATIVIS: Jucca; cassavi. IT. Ricino minore, Cassava, Farina della radice bianca.

ca. A. *Eatable-rooted physic-nut or cassava. (Tapioca).*

QUAL. *Succi radicis*: Venenata acris; urens.
Radicis siccatae: Farinacea.

VIRT. *Rad. recent.* Drastica. *Farinae*: Nutriens.

IGNATIA AMARA.

Vide Strychnos.

CL. *Pentandr. O. Monog.*

IT. *Fava di St. Ignazio.*

ILEX AQUIFOLIUM.

Folia.

CL. *Tetrand. O. Tetragyn.* *Fruticosa; Europ. austr. in locis umbrosis, siccis.*

GF. *Ilex aquifolium, agrifolium.* IT. *Ellice, Elce, o Leccio.* G. *Huux; chène verte.* GE. *Stechpalme.* A. *Holly.*

QUAL. In principio amaro-adstringente cum mucilagino-resinoso residens: sapor mucilaginoso-amaricans, stypticus.

VIRT. Roborans; adstringens; antiseptica.

USUS. *decocti*: Rigiditas articulorum post podagram remanens? Intermittentes rebelles; dyspepsia.

DOSES *foliorum concisorum*: Unc. j ad 16 j aquæ.

ILEX CASSINE.

Folia.

CL. et O. *præced.*

Arborea; Carolin. Virgin. Florid.

OF. *Folia cassinæ s. apalachines purgacæ.*

A. *Dahoonholly.*

QUAL. Sapor amarus, subaromaticus.

VIRT. Stomachica; stimulans; expectorans.

Recentium: Emetica.

ILLICIUM ANISATUM.

Fructus; (semen cum Capsulis.)

CL. *Polyand.* O. *Polyg.*

Arborea; Asiat. Chinens.

OF. *Semen anisi stellati; badian.* IT. *Aniso stellato, Badian.* G. *Anis de la Chine.* GE. *Sternanis.* A. *Indian anise.*

QUAL. In oleo volatili residens; odor fragrans, aromaticus; sapor aromatico-dulcis instar anisi.

VIRT. Stimulans; stomachica; carminativa; expectorans.

USUS *pulveris vel infusi*: Morbi pulmonum atonici. Semen infuso Theæ additum, idem magis gratum stomacho reddit.

DOS. *pulveris* gran. xxx. *Infusi*: drach. j ad ℥j aquæ.

IMPERATORIA OSTRUTHIUM.

Radix.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.*

Perennis; alpina, Europ. Austr.

OF. *Imperatoria.* IT. *Imperatoria.* G. *Impératoire.* GE. *Meisterwurz.* A. *Common masterwort.*

QUAL. Præstans: In oleo volatili et principio

resinoso residens; odor fragrans; sapor amaro acris, aromaticus, calidus.

VIRT. Stimulans; carminativa; menagoga; siagoga.

USUS. Amenorrhœa atonica; dyspepsia; colica flatulenta paralysis; intermittentes; serpigo; sterilitas?

DOSIS pulveris: Gran. x-xxx.

INDIGOFERA TINCTORIA.

Fecula.

CL. *Diadelph. O. Decandr.*

Frutic.; Ind.
et Afric.

OF. *Indigo*. IT. *Indago*, *Indigo*.

QUAL. Cærulea; tinctoria.

VIRT. Phthiriaca.

USUS. Diarrhœa; lochia nimia?

INULA DYSENTERICA.

Herba.

CL. et O. præced.

Perennis; in fossis siccatis.

OF. *Herba conyzæ*. IT. *Coniza*; *Pullicaria*. A. *Meadow Inula*, or *middle Fleabane*.

QUAL. Olor debilis; sapor subacris.

VIRT.?

USUS. Dysenteria; psora.

INULA HELENIUM.

Radix.

CL. *Syng. O. Polyg. superfl.*

Perennis;

Europ. austr.

OF. *Enula campina* s. *helenium*. IT. *Enola*, *Enula Campana*, *Ellenio*. G. *Inula camp-*

MEDICA. 135

pana; année. GE. Alantwurz. H. Common inula or elecampane. H. Ala.

QUAL. Præstans: In oleo volatili residens; odor fragrans; sapor aromaticus, amaricans, mucilaginosus.

VIRT. Stimulans, angelicam æmulans; expectorans; stomachica, alterans; anthelminthica.

USUS *pulveris et tincturæ*: Dyspepsia; cachexia; tussis; asthma pituitosum; physconia abdomin.; psora; hæmorrhoides mucosæ.

DOSIS. Drachm. semis unam.

PRÆP. Tinctura; conditum; extractum.

IRIS FLORENTINA.

Radix.

CL. *Triand O. Monog.* Perennis; Italia.

OF. *Iris Florentina.* IT. *Iride Florentina.* G. *Iris de Florence.* GE. *Violen-wurzel.* A. *Florence orrice.* H. *Lirio de Florencia.*

QUAL. In acri corrosivo residens, siccatione avolans; odor fragrans instar violæ. Radicis recentis: sapor acris, amaricans.

VIRT. recentis: Cathartica; diuretica; expectorans; errhina.

USUS.

DOSIS.

IRIS FÆTIDA.

Radix.

CL. et O. præced. Perennis; Europ. austr.

OF. *Spathula fœtida* s. *xyris.* IT. *Sputula fœtida.* G. *Glyyeux puant.* E. *Stincking itis,* or *gladwyn.*

QUAL. Eximīa: Nigra; odor foetidus, teter; sapor acris, ingratus.

VIRT. Deobstruens; diuretica; narcotica; antispasmodica; cathartica.

USUS. Hysteria; scrophula; hydrops.

DOSIS. $\frac{ʒ}{3}$.

IRIS GERMANICA.

Radix recens.

CL. et O. præced.

Perennis in sylvis.

OF. *Iris nostras.* IT. *Iride Germanica.* G.

Flambe; fleur de lys. GE. *Blaue schwertel lilien.* A. *German iris or flower de luce.* H. *Lirio de alemania.*

QUAL. *Radicis recentis:* In acri volatili residens; Sapor acris, amarus, nauseosus. *Siccatae:* farinacea.

VIRT. *recentis:* Subemetica; diuretica; errhina; expectorans; menagoga.

USUS.

IRIS PSEUD-ACORUS.

Radix; succus radicis expressus.

CL. et O. præced.

Perennis; ad littora fluviorum et lacuum.

OF. *Acorus palustris; pseudo-acorus; iris palustris; gladiolus luteus.* IT. *Acoro falso, o Gaglio giallo.* G. *Iris; gladiole des marais.* GE. *Gelbe schwertelwurzel; falscher kilmus; wasserschwertel; drachenwurzel; gelbe lilien.* A. *Yellow iris; water flag; or flower de luce.* H. *Lirio espadanaal.*

MEDICA.

137

QUAL. *recentis*: In odora; sapor acris, sub-
stypticus.

VIRT. *succi*: Diuretica. *Radicis*: adstringens.

USUS. Hydrops; stomatica.

DOSIS *succi*: Drach j. — Unc. semis.

IRIS TUBEROSA.

Radix.

CL. *et O. præced.*

Syriæ, Arab.

An radix *Hermodactili officinalis*?

QUAL. Inodora; acris, dulcescens.

VIRT. Cathartica, alterans.

USUS. Amaurosis; arthrodynia rheumatica.

DOS. ʒij.

JUGLANS REGIA.

Cortex viridis fructus
immaturi; putamen et dissepimentum
nucum.

CL. *Monæc. O. Polyanth.*

Arborea.

OF. *Noces juglandes immaturæ.* **IT.** *Corteccia*
verde delle noci immature. **G.** *Ecorce ver-*
te des noix. **GE.** *Uuse ffe wallnüsse.* **A.**
Common walnuttree; green walnuts.

QUAL. *Corticis et putaminis*: Odor graveolens;
sapor amaricans; stypticus.

VIRT. Roborans; adstringens; anthelmintica.

USUS *decocti*: Syphilis inveterata; lepra; ver-
mes.

DOSIS: ʒj ad ʒxx aquæ ad colat. ʒx.

PRÆP. Extractum ʒß - j: vermes infantum.

Rob: angina.

JUNIPERUS COMMUNIS.

Baccæ; lignum;
resina.CL. *Diœc. O. Monadelph.*OF. *Juniperus*; *gummi seu resina sandaraca.*IT. *Legno, Coccole Resina detta Sandrac-*
ca, olio, e burro di Ginepro. G. Genevrier
ordinaire; gomme sandrac. GE. Wachhol-
der-beeren; halz; gummi. A. Common ju-
*nipee wood; juniper-berries; gum sandrac.*QUAL. *Baccarum*: in oleo volatili copioso,
et principio resinoso residens; odor fra-
grans; sapor aromatico dulcis. — *Ligni*: Ea-
dem, sed debilior. *Resinæ*: Sapor resinosis.VIRT. *Baccarum, ligni et resinæ*: Stimulans;
diuretica; alterans; carminativa. *Decocti et*
extracti: Minus stimulans; magis diuretica.USUS *decocti aliorumque præparatorum*: Co-
phosis? hydrops; asthma; catarrhus; mor-
bi cutis. *Olei*: vermes.DOS. *pulv. Drach. β. In infuso drach. iij-iv*
*ad ℥j aquæ vel vini.*PRÆP. *Ligni et baccarum*: Decoctum; infu-
sum. *Baccarum*: Extractum; rob; aqua stil-
latitia; oleum volatile; alcohol.

JUNIPERUS LYCIA.

———— THURIFERA.

} Gummi-resina.

CL. et O. præced.

Aborea; littoris merid.
*et orient. maris rubri.*OF. *Gummi Olibani s. olibanum; thus. IT.*
Olibano, Incenso. G. Encens. GE. Weirauch.! *A. Olibanum.*

QUAL. Flavescens; pellucida; odor gratus; sapor amaricans.

VIRT.

USUS. Leucorrhœa? Ad suffimigia.

JUNIPERUS SABINA.

Folia.

Variet. A. cupressifolia.

CL. et O. præced.

Fruticosa; hortensis.

OF. Sabina. IT. Sabina baccifera, o Sabina.

G. Sabine. GE. Sevenbaum; sadebaum. A.

Common savin. H. Enebrio sabina.

QUAL. Præstans: in oleo volatili copioso residens; odor hircinus; sapor acris, amaricans.

VIRT. Stimulans; corrodens; menagoga; antispasmodica; diuretica; depilans; anthelmintica.

USUS internus: Amenorrhœa atonica. Externus forma pulveris, decocti, infusi, aut cataplasmatibus: Caries; tinea; psora; ulcera fungosa; verrucæ; Condyloma; odontalgia.

DOS. pulveris: Gr. v-xv.

PRÆP. Aqua stillatitia; oleum volatile; extractum.

K.

KAEMPFERIA ROTUNDA.

Radix.

CL. Monand. O. Monog.

Perennis; Ind. orient.

OF. Zedoaria. IT. Zedoaria rotunda. G. Zedoire. GE. Zittwerwurzel. A. Zedoary.

QUAL. In oleo volatili residens; odor subfragrans; sapor subacris, amaricans, aromaticus.

VIRT. Stimulans; calefaciens; stomachica; anthelminthica.

USUS pulveris (præcipue zeylonici): Dyspepsia; pyrosis; febres intermittentes, atonicæ; vermes.

DOS. Scrup. j.

PRÆP. Aqua stillatitia; alcohol; tinctura.

KAJEPUT OLEUM.

Vide Melaleuca leucadendron.

KIKEKUNEMALO.

Vide Gummi-resina kikekunemalo.

KINO. *Vide Gummi-resina kino.*

L.

LABRADIA PRURIENS.

————— URENS, *Vide Dolichos.*

PAIVA ex autopsia ad hoc novum genus relinquitur Dolichum prurientem et urentem *Linn.*

LACTUCA SATIVA.

Herba; semen.

CL. Syng. O. Polyg. æqual. *Annua; hortensis.*

IT. Lattuca. G. Laitue ordinaire. A. Garden lettuce.

QUAL. Oleracea.

VIRT. Refrigerans.

USUS. Culinaris.

LACTUCA VIROSA.)
SCARIOLA.) Herba; succus.

OF. *Lactuca sylvestris*. IT. *Lattuca salvatica*.
G. *Lutue vireuse*. GE. *Wilder lattich*. A.
Strong scamed lettuce. H. *Lechuga hedion*
da y ponzonrosa.

QUAL. In succo lacteo acris residens; odor
teter; sapor acris, amarus.

VIRT. Sedativa; diuretica.

USUS. Hydrops; icterus.

DOS. succi ad mellis consistentiam inspissati,
vulgo *extractum* dicti. drach. j - iv de die.

LAGOECIA CUMINOIDES. Semen.

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Annua; insul.*
Græc.

OF. *Anuni veterum*. IT. *Anuni*, *Pepordio*. A.
Wild' cumin.

QUAL. Præstans: Sapor aromaticus.

VIRT. Stomachica; carminativa.

USUS.

LAMIUM ALBUM. Herba.

CL. *Didyn.* O. *Gymnosp.* *Annua.*

OF. *Lamium album*; *urtica mortua*; *galeop-*
sis. IT. *Lamio*, *Galeoppide*, o *Galiopsi*,
Urtica bianca. GE. *Weisse laube nessel*.
A. *White archangel nettle* or *dead-nettle*.

QUAL. Oleracea; odor teter.

VIRT.

USUS.

LASERPITIUM LATIFOLIUM. Radix.

CL. Pentand. O. Digyn. Perennis, alpina;
in locis siccis.

OF. *Gentiana alba*. IT. *Genziana bianca*. GE.
Weisse enzianwurzel. A. *Broadleaved las-*
serwort. H. *Laserpitio de hoja ancha*.

QUAL. Præstans: sapor aromaticus, acris,
amarus.

VIRT. Stomachica; stimulans; diuretica.

LASERPITIUM SILER. Semen.

CL. et O. Præced. Alpina; in locis siccis.

OF. *Siler montanum*. IT. *Sesele montano*. A.
Rosskimmel. H. *Mountain lasserwort*.

QUAL. Aromatica; cumini odore et sapore
remissiore.

VIRT. Carminativa; stomachica.

USUS. Colica lochialis.

LATHRAEA SQUAMMARIA. Radix.

CL. Didyn. O. Angiosp. Perennis; in locis
nemorosis, umbrosis.

OF. *Dentaria major*. IT. *Dentaria maggiore*.

QUAL.

VIRT.

LAURUS CAMPHORA. Substantia resinosa

volatilis, *Camphora* dicta; præcipue ex ramis arboris sublimatione parata.

CL. *Enneand.* O. *Monog.* *Arborea*; *Ind. orient.*

OF. *Camphora.* IT. *Canfora.* G. *Camphre.* GE. *Kampfer.* A. *Camphir-tree.* H. *Canfor.*

QUAL. Heroica: in principio volatili residens, odor fragrantissimus; sapor acris, aromaticus, amaricans; simul cum sensu frigoris.

VIRT. Nervina; antispasmodica; antiseptica; anthelminthica; resolvens.

USUS *internus*: Febres, et exanthemata atonica; cardialgia; hysteria; mania; nymphomania; satyriasis; (*cum sulphure*) colica pictonum. *Externus*: Arthrodynia rheumatica; ophthalmia; grangræna; ulcus fungosum; morsura insectorum; colica spasmodica.

DOSIS. Cum saccharo trita aut mucilagine vel alcohole subacta; gr. v gr. xv bis terve die, ascendendo ad drach. ij.

PRÆP. Alcohol camphoratum; æther camphoratus; acetum camphorat.; acidum nitricum camphoratum, seu solutio camphoræ nitrica; oileum camphorat. unguentum camphoratum.

An opium est antidotum camphoræ?

N. B. An oleum volatile camphoræ Javæ, Sumatræ, etc. in arthrodynia arthritica et rheumatica adeo celebre ex eadem arbore provenit?

LAURUS CASSIA.

Cortex; flores.

Varietas Lauri cinnamomi. (THUNBERG).

OF. *Flores cassiæ; calyces cassiæ; cassia cinnamomea; cortex cinnamomi indici; folia malabauhi; cassia lignea; xylocassia.* IT. *Scorza, e Fiori di Cassia lignea.* GE. *Mit-terzimmt.*

QUAL. In oleo volatili residens; odor fragrans; sapor acris, aromaticus; debilior sequente.

VIRT. Stimulans; calefaciens.

USUS. Paralysis linguæ.

N. B. Flores supplere possunt corticem cinnamomi.

PRÆP. Oleum volatile.

LAURUS CINNAMOMUM.

Cortex.

CL. et O. præced.

Arborea; Zeylonica.

OF. *Cinnamomum verum s. acutum* IT. *Scorza di Cinnamomo, o di Cinnella regina.* G. *Canelle.* GE. *Zimmt* A. *Cinnamon-trec.*

QUAL. Heroica: in oleo volatili residens; odor intense fragrans; sapor dulcis, dein subacris, aromaticus, gratus.

VIRT. Cardiacæ; stimulans; calefaciens; roborans; antispasmodica; stomachica; carminativa; aphrodisiaca.

USUS. Dyspepsia; anaphrodisia; morbi atonici.

POS. *pulveris*: Gr. x-xxx.

PRÆP. Infusum aquosum vel vinosum frigi-

dum; aqua; alcohol; tinctura; oleum volatile.

LAURUS CULILAWAN.

Cortex.

CL. et O. præcel.

Arborea; Amboin. et
insul. Mollucc.

OF. *Cortex culilawan*; *caryophyllioides*. IT. *Culilawan*.

QUAL. Præstans: sapor aromaticus, caryophyllum aromaticum æmulans, mucilaginosus, subadstringens.

VIRT. Calcfaciens; roborans; carminativa; stomachica.

USUS. Paralysis; colica flatulenta; dyspepsia.

LAURUS MYRRHA. (LOUVEIRO).

Cortex;

gummi-resina.

CL. et O. præcel.

Arborea; China, Cochinchina.

An gummi-resina myrrha ex hac arbore?

LAURUS NOBILIS.

Folia; Baccæ.

CL. et O. præcel.

Arborea; Europ. austr.

OF. *Laurus*. IT. *Alloro*, *Lauro*, *Foglie*, e *Bacche*. G. *Laurier*: *baies de laurier*. GE. *Lorbeerbaum*: *lorbeerbeeren*. A. *Common sweet bay*. H. *Laurel noble*.

QUAL. Præstans: In oleo volatili cum oleo fixo mixto residens; sapor aromaticus, subacris, amaricans.

VIRT. Calcfaciens; stomachica; carminativa; resolvens; phthiriaca.

USUS. *Int. et externus*: Amenorrhœa; dyspepsia; chlorosis; hysteria; colica lochialis.

Olei: Tumores frigidi; psora; pediculi.

PRÆP. Oleum laurinum.

LAURUS PECURIM? (BEBGIUS). Fractus.

CL. et O. *præced.* *Arborea; Brasiliæ.*

OF. *An faba pechurim ex hac arbore.* IT.

Nocciuoli; o Fave Pecuri.

QUAL. In oleo volatili cum oleo unguinoso mixto residens; odor fragrans; sapor grate amaricans, aromaticus, substypticus.

VIRT. Stimulans; stomachica; subastringens.

USUS. Sub finem dysenterix; diarrhœa, tormina ventris.

DOS. *pulveris*: Gr. x cum saccharo.

LAURUS SASSAFRAS. Radix; cortex radicis.

CL. et O. *præced.* *Arborea; Virginix.*

OF. G. GE. *Sassafras.* IT. *Sassofrasso.* A. *Sassafras-tree.*

QUAL. *Præstans*: In oleo volatili copioso residens; odor fragrans; sapor aromaticus, subacris, subdulcis.

VIRT. Stimulans; diuretica; sudorifica.

USUS *decocti vel infusi*: Cachexix; Syphilis?

Arthrodynia arthritica et rheumatica; psora.

PRÆP. Oleum volatile.

LAVANDULA SPICA.

Flores.

CL. et. O. præced. Suffruticosa; Europ. austr.; hort.

OF. *Lavendula*. IT. *Lavendola*, *Lavanda*. G. *Lavande*. GE. *Lavandel*. A. Common lavender. H. *Espliego*; *alhucenna*.

QUAL. Præstans: In olco volatili copioso residens; odor fragrans; sapor amarus, aromaticus.

VIRT. Stimulans; nervina; resolvens.

USUS. Paralysis; aphonia; balbuties.

PRÆP. Oleum volatile; aqua; alcohol; tinctura lavandulæ composita Ph. Lond.

LAVANDULA STÆCHAS. Flores.

CL. et O. præced. Suffruticosa; Europ austr.

OF. *Stæchas Arabica*; *stæches spica*. IT. *Stecade*. A. French lavender.

QUAL. Fragrans, præcedenti graveolentior.

VIRT. et USUS. præced.

LAWSONIA INFERMIS. Radix.

CL. Octand. O. Monog. Orientalis.

OF. *Alcanno vera s. orientalis*. IT. *Alchenna*, o *Alcanna*. A. Smooth lawsonia.

QUAL. Radix rubra; folia lutea.

VIRT. Tinctoria; adstringens.

USUS.

LEDUM PALUSTRE. Folia cum floribus.

CL. Decand. O. Monog. Fruticosa; in locis humidis, nemorosis.

OF. *Rosmarinus sylvestris*. IT. *Romerino salvatico*. G. *Lede*; *romarin sauvage*. GE. *Post*; *porsch*; *wilder rosmarin*; *wunzenkract*. A. *Hillrose*; *bohemian rosemary* or *marsh-ledum*.

QUAL. Heroica: in oleo narcotico cum extractivo amaro astringente residens; odor nidosus; sapor amaricans, astringens.

VIRT. Narcotica; sudorifica; phtiriac.

USUS. *infusi*: *Lepra*; *psora*; *tinea*; *pertussis*; *insecta*.

DOS.: *Unc.* β -j. ad \mathbb{H} j *aquæ*, *lactis*, vel *seri lactis infusi per horam*, *libram semis-unam de die sumend.*

LEONURUS CARDIACA.

Herba.

CL. *Didyn.* O. *Gymnosp.*

Biennis.

OF. *Cardiaca*. IT. *Cardiaca*. A. *Common motherwort*.

QUAL. *Amara*.

VIRT.

USUS. *Hysteria*.

LEONTODON TARAXACUM.

Radix.

CL. *Syng.* O. *Polyg. æqual.*

Pereunis,

OF. *Taraxacum*; *dens leonis*. IT. *Tarassaco*, o *Dente di Leone*. G. *Pissenlit*; *dent de lion*. GE. *Pfaffenrährlein*; *lœwenzahn*. A. *Common dandelion*. H. *Amargon*.

QUAL. In succo lactescente, amaro, salso residens.

VIRT. Diuretica; deobstruens.

USUS. *Decocti vel extracti radiceis*: Physconia
abdomin.; icterus; quartana rebellis.

DOS. Unc. ij-iiij ad ℥; aquæ.

PRÆP. Succus recens expressus; extractum.

LEPIDUM IBERIS.

Herba.

CL. *Tetradyn. O. Silicul.*

*Annua; Europ.
austr.*

IT. *Iberide, Lepidio.*

QUAL. Sapor acris.

VIRT. Diuretica; alterans.

USUS. Febres intermittentes; cachexiæ.

LEPIDIDIUM SATIVUM. Herba recens; semen.

CL. *et O. præced.*

Annua.

OF. *Nasturtium hortense.* **IT.** *Nasturzio or-
tense.* **G.** *Cresson alenois; vasserage.* **GE.**
Gartenkresse. **A.** *Garden cresses.* **H.** *Nasti-
uerzo.*

QUAL. *Herbæ et seminum:* In principio acri
leniori residens.

VIRT. Diuretica; antiscorbutica.

USUS. Scorbutus; hydrops; achor.

LEUCOIUM VERNUM, aliæque species.

CL. *Hexand. O. Monog.*

OF. *Lunaria major; viola lunaris; leucium
lunatum; bulbonach.* **IT.** *Lunaria, sferra
Carallo.* **G.** *Lunaire; perce-neige.* **GE.** *Kno-
tenblume; schneekreppchen.* **A.** *Snowdrop.*

QUAL. Mucilaginosa.

LICHEN APHTHOSUS.

CL. Cryptog. O. Algæ.

OF. *Muscus cumatilis*. IT. *Mosco di color verde marino*.

QUAL. Tetra, mephitica.

VIRT. Cathartica; anthelminthica.

USUS *infusi vel decocti*: Vermes; aphtha.

DOS. *Pulveris* infantibus gr. xij mane et vespri.

LICHEN CANINUS.

OF. *Herba musci canini*. IT. *Mosco canino*.

A. *Ground-liverwort*.

QUAL. Tetra, mephitica.

VIRT. Alterans.

USUS. Hydrophobia? Mania; asthma convulsivum (BUTTER).

LICHEN COCCIFERUS.

Ad radices arborum
in sylvis pienis.

CL. et O. præced.

OF. *Muscus pyxidatus*; herba ignis. GE. *Bechermoos*; *fiebermoos*; *fenerkraut*. A. *Cupmoss*.

QUAL. Sapor Substypticus.

VIRT. Subadstringens.

USUS. Pertussis?

LICHEN ISLANDICUS.

MEDICA.

151

CL. et O. præced. Perennis; alpina; in
locis siccis, petrosis, nemorosis.

OF. *Muscus Islandicus*. IT. *Lichene Islandi-*
co. GE. *Isländisches moos*. A. *Iceland-li-*
chen or *liverwort*.

QUAL. Præstans: amara, subadstringens, mu-
cilaginosa.

N. B. Amarities coctione et siccitate multum
minuitur.

VIRT. Nutriens; eccoprotica.

USUS. Tabes; hæmoptysis; tussis.

DOS. Unc. β ad ℥j; aquæ vel lactis decocti
ad ℥j.

LICHEN PLICATUS.

OF. *Musci arborei seu quercini herba*.

QUAL. Styptica.

VIRT. Adstringens.

USUS. Hæmorrhagiæ.

LICHEN PULMONARIUS.

OF. *Herba pulmonariæ arboreæ*. IT. *Polmona-*
ria arborea. GE. *Lungenmoos*.

QUAL. Sapor amarus, salsus.

VIRT.

USUS. Tussis; icterus.

LICHEN ROCCELLA.

CL. et O. præced.

Insular. archipel et
Canariens.

OF. *Roccellæ herba*. IT. *Oricello*. G. *Orseille*.

QUAL. Subsalsa, subacris; tinctoria rubra.

VIRT.

USUS. Tinctorius.

PRÆP. Pigmentum vulgo *Lacmus* dictum.

LIGNUM ALÔES.

Vide Aloëxylum.

CIN. *Lignum agallochi* s. *Aspalathi* s. *Cambac.*

LIGUSTICUM LEVISTICUM.

Radix; Semen; herba.

CL. *Decand.* O. *Monog.* *Perennis; alpina.*

OF. *Ligusticum; levisticum.* IT. *Levistico.* G.

Liveches; semences d'ache. GE. *Liebstæckel.*

A. *Common lovage.*

QUAL. Odor teter; sapor aromaticus, acris, calidus, angelicam archangelicam æmulans. *Semina urinam nigro colore inficiunt.*

VIRT. Stimulans; carminativa; menagoga; lactifera.

USUS.

LILIUM CANDIDUM. Radix; petala recentia.

CL. *Hexand.* O. *Monog.* *Perennis; hortensis.*

OF. *Radix et flores lilii albi.* IT. *Giglio.* G.

Lys. GE. *Weisse lilien.* A. *Common white lily.*

QUAL. *Petalorum recentium:* Odor fragrans. *Radicis:* sapor mucilaginosus.

VIRT.

USUS.

MEDICA.

153

LINNÆA BOREALIS

Herba.

CL. *Didyn.* O. *Angiosp.* Perennis ; Europ.
septentr.

IT. *Linnea.* A. Two flowered *Linnaea.*

QUAL. *Floris* : Odor fragrans. *Herbæ* : Sapor
amaricans , substypticus.

VIRT. Subadstringens ; Diuretica.

USUS *infusi* in lacte vel aqua : Arthrodynia
rheumatica ; psora.

LINUM CATHARTICUM.

Herba.

CL. *Pentand.* O. *Pentag.*

Annua.

OF. *Linum catharticum.* IT. *Lino salvatico,*
o catartico. G. *Lin purgatif.* GE. *Purgier*
flachs. A. *purging flax.*

QUAL. Sapor subsalsus , amaricans , nauseosus.

VIRT. Cathartica.

USUS. Hydrops ; nephritis.

DOS. Drach. ij herbæ siccatae ad ℥ j aquæ
pro infuso.

LINUM USITATISSIMUM.

Semen.

CL. et O. *præced.*

Annua.

OF. *Semen lini.* IT. *Lino.* G. *Grains de lin.*
GE. *Leinsaamen ; fluchssaamen.* A. *Common*
flax ; linseed. H. *Laxor.*

QUAL. Mucilaginoso ; oleosa.

VIRT. Involvens ; emolliens.

USUS *decocti vel infusi* : Dysuria ; nephritis ;
blennorrhagia ; *forma enematis* : tenesmus.
Farinæ forma cataplasmatidis : cynanche ;
phlegmone.

PRÆP. Oleum fixum expressione frigida paratum.

DOS. Seminum unc. β - j ad \mathbb{B} ij aquæ.

LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA. Balsamum.

CL. *Monœc.* O. *Polyand.* *Arborea; Virgin. Mexic.*

OF. *Storax; styrax liquida.* IT. *Stirace.* A. *Mapple-leaved liquid omber, or sweet gum.*

QUAL. *Liquido-tenax; coloris grisei; odor fragrans; sapor acris, aromaticus.*

VIRT. *Stimulans; calefaciens.*

USUS *externus*: *Paralysis; psora.*

LIRIODENDRON TULIPIFERA. Cortex.

CL. *Polyand.* O. *Polyg.* *Arborea; Amer. Septentr.*

OF. *Cortex loriiodendri.* IT. *Albero tulipano.* A. *Common tulip-tree.*

QUAL.

VIRT.

USUS in America frequens, loco *Cinchonæ officinalis*: *intermittentes.*

LITHOSPERMUM OFFICINALE. semen.

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Perennis.*

OF. *Lithospermum; milium solis.* IT. *Litospermo, o Migliagole.* G. *Gremul; herbe aux perles.* GE. *Meerhitse; steinhirse; perlkrautsaamen.* A. *Officinal gromwell.*

QUAL. *Insipida; inodora.*

VIRT.?

USUS.

LOBELIA SYPHILITICA.

Radix.

CL. Syng. O. Monog. Perennis; Virginæ.

OF. *Lobelia* IT. *Lobelia antisiphilitica*. G. Cardinal bleu. A. Blue lobelia, or cardinal flower.

QUAL. Lactescens; acris; nauseosa.

VIRT. Emetica; drastico-cathartica.

USUS decocti: Syphilis?

DOS. $\frac{3}{4}$ ad aquæ $\frac{1}{2}$ xij. coquendo ad $\frac{1}{2}$ vii).

LOBELLA LONGIFLORA.

TUPA.

Radix.

IT. *Lobelia a flor prolongato*.

QUAD. Aciores præcedenti.

IONICERA DIERVILLA.

Stipites.

CL. Pentand. O. Monog.

Fruticosa; Canadensis.

OF. *Diervilla*. IT. *Derviglia*. A. Yellow flowered upright honeysuckle.

QUAL. Odor et sapor nauseosus.

VIRT.

USUS *Canadensium*: Syphilis; blennorrhagia; dysuria.

LONICERA PERICLYMENUM.

Herba;

stipites et flores.

OF. *Caprifolium*. IT. *Periclimeno*, *Cersoglio*.

Matrisilva. A. Common wood-bine or honeysuckle.

QUAL. Odor et sapor ingratus.

VIRT.?

USUS.

LONICERA SYMPHORICARPOS. Stipites.
Fruticosa; Carolinæ.

A. Shrubby St. Peters-wort.

QUAL. Styptica.

VIRT. Subadstringens.

USUS. Intermittentes?

LUPINUS ALBUS. Semen.

CL. *Diadelph. O. Decand.* Annuæ; hortensis.

OF. *Semen lupini.* IT. *Lupino.* GE. *Felghohnen.*

G. *Lupin.* A. *White lupin.*

QUAL. Farinacea; amara.

VIRT. Cosmetica?

USUS. Vermes.

LYCOPERDON BOVISTA.

CL. *Cryptog. O. Fungi.*

OF. *Bovista; crepitus lupi.* IT. *Vescia di Lupo.*

QUAL. Præstans: Styptica.

VIRT. Adstringens; obstipans.

USUS. Hæmorrhagiæ, hæmorrhoids; ulcera; intertrigo.

LYCOPERDON TUBER.

IT. *Tartuff,* *Triffola.* G. *Truffle.*

QUAL. Odor hircinus.

VIRT. Aphrodisiaca?

USUS. Ulinaris : anaphrodisia.

LYCOPODIUM CLAVATUM.

Pollen.

CL. Cryptog. O. Musci.

In Sylvis.

OF. Semen lycopodii ; muscus clavatus. IT.

Licopodio clavato. A. Common club moss.

QUAL.

VIRT. Exsiccans.

USUS. Excoriatura : ad inspergendans pillulas ,
bolos.

LYCOPODIUM SELAGO.

OF. Muscus erectus. IT. *Licopodio comune. A.*

Fir club-moss.

VIRT. Drastico-cathartica ; menagoga ; phthi-
riaca.

USUS. Hydrops ; pediculi.

LYSIMACHIA NUMMULARIA.

Herba.

CL. Pentand. O. Monog. Perennis ; in locis
humidis ; umbrosis , nemorosis.

OF. Herba nummulariæ. IT. *Lisimachia vol-
gare. A. Creeping loose-strife , or money-
wort.*

QUAL. Subacida , subaeris.

VIRT. Subadstringens.

USUS. Leucorrhœa.

LYTHRUM SALICARIA.

Folia ; radix.

CL. Dodecand. O. Monog.

Perennis ; in lo-
cis aquaticis.

OF. *Salicaria* s. *lysimachia purpurea*. IT. *Lisimachia salicaria*, *Salicaria*. GE. *Rother Wetderich*. A. *Common or purple willow herb*.

QUAL. Præstans: Substyptica.

VIRT. Adstringens.

USUS. Diarrhœa; dysenteria atonica; leucorrhœa; hæmoptysis.

M.

MALVA. ALCEA.

Flores.

IT. *Malva salvatica*. A. *Vervain mallow*.

CL. *Monadelph.* O. *Polyand.* In alpibus ad Sylvas.

MALVA ROTUNDIFOLIA.

——— SYLVESTRIS.

} Herba; radix.

Annua; ad muros et edificia.

OF. *Malva vulgaris* s. *alcea*. IT. *Malva volgare*. G. *Mauve*. GE. *Pappeln*. A. *Round-leaved or dwarf mallow*.

QUAL. Præstans: fatua; mucilaginoso.

VIRT. Involvens; denulcens; laxans.

USUS. Phlegmone; stranguria; tussis.

MARANTA GALANGA.

Radix.

CL. *Monind.* O. *Monog.*

Perennis; Ind. orient.

OF. *Galanga major et minor*. IT. *Galanga*. G. *Galanga officinal*. GE. *Galgantwurzeln*. A. *Galangel*.

QUAL. Præstans: In principio resinoso magis quam in oleo volatili residens; odor fragrans; sapor amarus, acris, aromaticus, zingibere magis pungens.

VIRT. Stimulans; calefaciens; stomachica; menagoga. *Recent.* errhina.

USUS. Dyspepsia; paralysis linguæ; colica flatulenta, et lochialis; vomitus navigantium? Singultus; vertigo; *extern.* herpes.

DOSIS. Gr. x-xv.

PRÆP. Tinctura.

MARRUBIUM VULGARE. Succus recens; herba.

CL. *Didyn.* O. *Gymnosp.* Perennis; ad vias et deserta.

OF. *Marrubium album.* IT. *Marrobbio.* G. *Mar-rubeblanc.* GE. *Weisser andorn;* mariennes-sel. A. *Common white hoarhound.*

QUAL. Præstans: odor graveolens; sapor subamarus, subsalsus, ingratus.

VIRT. Expectorans; menagoga; anthelminthica.

USUS. Asthma pituitosum; icterus; chlorosis; physconia abdominal.; ptyalismus ex hydrargyro?

MATRICARIA CHAMOMILLA. Flores.

CL. *Syngen.* O. *Polyg. superfl.* *Annua.*

OF. *Chamomilla vulgaris* s. *nostras* s. *Chamomælum vulgare.* IT. *Camomille selvatica.*

G. *Camomille*. GE. *Kamillen-blumen*. A. *Corn feverfew*.

QUAL. In oleo volatili et principio extractivo amaro residens; odor fragrans, ingratus; sapor amarus.

VIRT. Leviter stimulans; antispasmodica.

USUS. Dyspepsia; vomitus gravidarum? cardialgia; Dysenteria; colica spasmodica; febres intermittentes; hysteria; dysuria? Forma balnei, enematis, cataplasmatidis, infusi, pulveris.

DOS. *pulveris*: Drach. β - j. In infuso drach. ij-iiij ad \mathfrak{B} j aquæ.

PRÆP. Aqua; oleum volatile; syrupus.

MATRICARIA PARTHENIUM. Herba; Flores.

CL. et O. *præced.* Perennis; in locis incultis.

OF *Matricaria*. IT. *Erba matricale*, o *matricaria*, *Crespola*. G. *Mitricaire*. GE. *Matterkraut*. A. *Common feverfew*.

QUAL. Odor nidorosus, halituosus; sapor amarus.

VIRT. Antispasmodica; stomachica; menagoga; lactifuga.

USUS. *externus* forma balnei, enematis, cataplasmatidis. *Internus*: colica; hysteria, dyspepsia.

MELALEUCA LEUCADENDRON. Oleum volatile ex foliis destillatione obtentum.

CL. *Polyadelph. O. Polyand. Arborea; insul. Sumatræ et nov. Caledoniæ.*

NATIVIS *cajeput dictum ex cajo arbor, et puti alba; id est, arbor epidermide alba notatus.*

OF. *Oleum cajeput. IT. Olio di Cajeput. G. L'huile de cajeput. GE. Cajeputoel. A. Cajeput-oil.*

QUAL. Odor intense fragrans, aromaticus.

VIRT. Stimulans; antispasmodica; carminativa; menagoga; insecta fugans.

USUS *intern. Cardialgia sputatoria; colica flatulenta; spasmi; paralysis. Extern. Anaphrodisia? Varix ani; odontalgia; paralysis linguæ.*

DOS. Gutt. iij-x. Sæpius de die cum saccharo.

MELISSA OFFICINALIS. Herba.

CL. *Didyn. O. Gymnosp. Perennis; Canariensis; hortensis.*

OF. *Melissa citrata s- hortensis. IT. Melissa, Citraggine, o Cedronella. G. Melisse; citronelle mélisse. GE. Zitronen-melisse. A. Common balm.*

QUAL. In oleo volatili residens; fragrans odore citri; sapor aromaticus.

VIRT. Leviter stimulans; nervina; antispasmodica; menagoga.

USUS *infusi: Hysteria; palpitatio; chlorosis; amenorrhœa.*

PRÆP. Infusum; aqua; alcohol; oleum volatile.

MELISSA CALAMINTHA.

Herba.

CL. et O. præced.

Europ. austr.

OF. *Calamintha montana*. IT. *Calamento*. GE.

Bergmünze. G. *Calamen des montagnes*. A.

Mountain balm or calamint.

QUAL. Odor debilior præcedent; sapor leviter aromaticus.

VIRT. Stomachica; expectorans; resolvens.

USUS Asthma.

MELITTIS MELISSOPHYLLUM.

Folia.

CL. et O. præced.

Perennis.

OF. *Melissopyllum*. IT. *Nepitella*. G. *Mélisse batarde*. A. *Bastard balm*.

QUAL. Odor fragrans, gratus; sapor subamarus.

USUS infusi: Amenorrhœa; nephritis?

MENISPERMUM COCCULUS. Fructus, seu nux.

CL. *Diæc*. O. *Dodecand*. Sarmentosa; Ind. orient.

OF. *Cocculus indicus*; semen cocculi. IT. *Coccole d'India*. G. *Coques du Levant*. GE.

Kokkelkærner, *Fischtollkærner*. A. *Indian*

cockles; *Indian berries*. H. *Coca de Levante*.

QUAL. Venenata; sapor summe amarus, urens.

VIRT. Narcotica; phthiriaca.

USUS. Ad necandos pisces, pediculos.

MENTHA AURICULARIS.

Herba.

CL. *Didyn*. O. *Gymnosp*.

Ind. orient.

QUAL. Fragrans; amara.

VIRT. Resolvens.

USUS. Cophosis; tumores.

MENTHA CERVINA.

Herba.

CL. et O. præced.

Europ. austr.

N. B. Floribus verticillatis, bracteis palmatis, foliis linearibus, staminibus corolla longioribus.

A. *Hissop-leaved mint.*

QUAL. Olor fragrans; sapor aromaticus, gratior pulegio.

MENTHA CRISPA.

Folia; herba.

CL. et O. præced.

Perennis; hortensis.

OF. *Mentha crispa*. IT. *Menta crispa*, o *riccia*. G. *Menthe frisée*. GE. *Krausminze* A. *Curled mint*. H. *Menta rizada*.

QUAL. In oleo volatili residens: Olor fragrans; sapor aromatico-amaricans.

VIRT. Stimulans; carminativa; menagoga; antaphrodisiaca; resolvens.

USUS. Cephalalgia; hysteria; anorexia; vomitus; colica; percussis; satyriasis. *Externus*: Dolor artuum a spasmis; coagulum lactis in mammis; ecchymoma; tumores frigidi.

DOS. infusi: Unc. j. ad ℥j aque.

PRÆP. Oleum volatile; alcohol; aqua; conserva; syrupus.

MENTHA PIPERITA.

Herba.

CL. et O. præced. *Perennis; Angliæ; Nor-*
tensis.

OF. *Mentha piperitis.* IT. *Menta piperita.* G.
Menthe poutée. GE. *Pfefferminze.* A. *Peppermint.* H. *Menta piperita.*

QUAL. Eximia: In oleo volatili camphorino
residens: Olor fragrans; sapor acris, are-
maticus cum sensu frigoris.

VIRT. Eadem ac precedentis, sed fortior.

USUS. Idem ac præcedentis.

PRÆP. Oleum volatile; alcohol; aqua.

MENTHA PULEGIUM.

Herba.

CL. et O. præced. *Perennis; Europ. austr.*

OF. *Pulegium.* IT. *Puleggio.* G. *Menthe pou-*
liot. GE. *Poley.* A. *penuy-royal mint.* H.
Poleo.

QUAL. In oleo volatili residens; eadem ac
menthæ crispæ sed acrior.

VIRT. Eadem ac menthæ crispæ.

USUS. Spasmi durante menstruatione; tussis;
raucedo.

MENTHA SATIVA.

IT. *Menta Greca, Salvia Romana, Erba S.*
Maria. A. *Marsh mint.*

MENTHA SYLVESTRIS.

Herba.

OF. *Menthastrum mentha longifolia.* IT. *Men-*
tastro. A. *Horse-mint.*

M E D I C A.

105

MENTHA VIRIDIS.

Herba.

IV. B. Spicis oblongis; foliis lanceolatis, nudis, serratis, sessilibus; staminibus corollæ longioribus.

OF. *Mentha spicata*. IT. *Menta verde*. G. *Baume verte*. A. *Spearmint*.

QUAL. Eadem ac menthæ crispæ sed gratior.

MENYANTHES TRIFOLIATA

Folia.

CL. *Pentand*. O. *Monog*. Perennis; in locis humidis, paludosis.

OF. *Trifolium florum* s. *aquaticum* s. *palustre* s. *paludosum*. IT. *Trifoglio Fiorino*, o *palustre*. G. *Trefle de marais*. GE. *Butter-klee*; *feberkiee*. A. *Common buck-bean* or *marsh trefoil*; H. *Menyanthes de tres en rama*.

QUAL. In principio extractivo amaro residens; sapor intense amarus, substypicus.

VIRT. Adstringens; roborans; anthelminthica; diuretica; deobstruens.

USUS *infusi*, vel *extracti*: Dyspepsia; chlorosis; leucophlegmatia; physconia abdomina; icterus; asthma; arthrodynia; polagra atonica; intermittentes; scorbutus; lepra; herpes; ulcus malignum.

DOSIS *infusi*: Unc j ad libram j aquæ.

PRÆP. Extractum: Dosi drach. ij.

MERCURIALIS ANNUA.

Herba.

CL. *Diæc*. O. *Enneand*.

OF. *Mercurialis*. IT. *Mercorella*. G. *Mercurial*.

QUAL. Suspecta.

VIRT. Cathartica; hypnotica; repellens; cosmetica.

USUS. Decocti pro clysmatibus; syphilis?

MISEMERYANTHEMUM CRYSTALLINUM.

Herba.

CL. Icosand. O. Pentag. Annuæ.

A. Annual mercury or diamond fig marygold
or iceplant.

QUAL. Sapor blande salinus, refrigerans.

USUS succi: Dolor spasmodicus vesicæ urinariæ; dysuria; ischuria; calculus; pertussis.

DOS. Unc. j-ijß ad ℥j aquæ in decocto.

MESPILUS GERMANICUS.

Fructus.

CL. Icosand. O. Pentag.

Arborea.

OF. *Mespilus*. IT. *Nespola*. A. Narrow et broad
leaved dutch medlar.

QUAL. Styptico-farinosa.

VIRT. Dulcis; subadstringens.

USUS.

MIMOSA CATECHU. Succus extractivo seu gummi-resinosus, decoctione ligni et in- spissatione obtentus.

CL. Polyg. O. Monæc. Arborea; Ind. orient.
provinciæ Bahar.

OF. *Catechu* s. terra Japonica. IT. Terra Giap-
ponica, Catto d India, Catechà. G. Ca-

chou. GE. Katechukaschu; A. Canchu. Ja-
pan-earth.

QUAL. In principio extractivo resinoso adstringente residens; sapor subamarus, postea dulcescens, stypticus.

VIRT. Roborans; adstringens.

USUS *pulveris vel tincturæ.* Diarrhœa; dysenteria atonica; hæmorrhœa. *Externus:* Ulcus laxum; relaxatio uvulæ et gingivarum; defluxio acris catarrhalis.

DOS. *pulv.* gr. x-xxx-drachm j.

PRÆP. Tinctura, in aqua et alcohole frequenter aque solubilis.

MIMOSA NILOTICA.	} Gummi, et succus fructus immaturi expressus et inspissatus.
———— SENEGAL.	

OF. *Gummi arabicum:* succus acacie veræ seu *Ægyptiæ* inspissatus. *IT. Gomme Arabique, Succo vero d'Acacia, Bombaraca. G. Gomme arabique. GE. Arabischer gummi. A. Gum arabic; gum senegal: Ægyptian et Senegal mimosa.*

QUAL. *Gummi:* Mucilaginosa; dulcis; nutrens.

Succi inspissati in aqua solubilis: Styptica.

VIRT. *Gummi:* Involvens. *Succi:* Roborans; adstringens.

USUS *gummi internus* in solutione aquosa:

Dysuria; Dysenteria; paraphonia catarrhalis; ophthalmia.

MOMORDICA ELATERIUM. Radix; fructus recens; succus ejusdem extractivo-resinosus inspissatus.

CL. *Monæc.* O. *Syng.* *Europ. austr.; annua; hortensis, agrestis.*

OF. *Elaterium s. cucumis asininus.* **IT.** *Cocomero salvatico, o Asinino, Elaterio.* **G.** *Momordique sans vrilles; concombre sauvage.* **GE.** *Esselsgurken; springgurken.* **A.** *Squirting momordica or cucumber.*

QUAL. Utriusque: Sapor intense amarus, acris, nauseosus.

VIRT. Emetica; drastico-cathartica; menagoga; diuretica.

USUS. Obstipatio; hydrops; amenorrhœa; scrophula?

DOS. Radicis gr. xv-xxx.

PRÆP. Succus inspissatus, vulgo *Elaterium* dictus, dosi gr. i-iv.

MONARDA FISTULOSA.

Folia.

CL. *Diand.* O. *Monog.* *Perennis; Canadensis.*

OF. *Herba monardæ.* **A.** *Purple monarda.*

QUAL. Odor fragrans; sapor aromaticus, amaricans.

VIRT. Nervina; stomachica; deobstruens.

USUS *infusi*: Febres intermittentes.

MORUS NIGRA.

Fructus recens; folia; cortex.

CL. *Monæc.* O. *Tetrand.*

Arborea; Europ. austr. hortensis.

OF. *Fructus mori recentis*. IT. *Gelso*. GE. *Malbeeren*. A. *Common mulberry-tree*.

QUAL. *Fructus*: Sapor dulcis, subacidus. *Foliorum*: Stypticus.

VIRT. Refrigerans. *Folior*: Adstringens.

USUS. Febres. *Corticis*: Tænia.

PRÆP. Rob; syrupus.

MYRICA GALE.

folia.

CL. *Diœc*. O. *Tetrand*.

Fruticosa; paludosa; *Europ. austr.*

OF. *Myrtus Brabantica*. IT. *Mortella*, *mirtillo*. G. *Piment royal*. GE. *Myrten*. A. *Sweet gale willow*; or *candle berry myrtle*.

QUAL. *Luteo-tinctoria*; odor nidorosus; sapor amarus.

VIRT. Narcotica.

USUS. Psora; pediculi.

MYRISTICA AROMATICA.

(SWARTZ).

Nux seu fructus; nucleus; integumentum nuclei reticulare vulgo *Macis* dictum.

CL. *Monœc*. O. *Monand*.

Arborea; *insul. Bandæ*.

Myristica moschata. (THUNBERG).

Myristica officinalis. (LINN.).

OF. *Nux moschata*: *macis*. IT. *Noce moscata*. G. *Noix muscade*: *mace*. GE. *Muskatnuss*: *muskatblütthe*. A. *Nutmeg*: *mace*.

QUAL. *Utriusque*: In oleo volatili simul ac fixo aromatico residens: Odor fragrans; sapor grate amaricans, aromaticus, stypticus.

VIRT. Stimulans; stomachica; carminativa;
obstupans; *majori dosi*: hypnotica; sedativa.

USUS. Dyspepsia; flatulentia; colica; diarrhœa;
stranguria.

DOS. Gran. iv-xx.

PRÆP. Nux condita; oleum volatile et oleum
fixum fragrans.

MYROXYLON PERUIFERUM. Balsamum.

CL. *Decand. O. Monog.* *Arborea; Amer.*
merid.

OF. *Balsamum Peruvianum.* **IT.** *Balsamo del*
Perù. G. Baume de Pérou. GB. Peruviani-
scher Balsam. A. Balsam of Peru.

QUAL. Præstans: odor suaveolens; sapor acris.

USUS. Dyspepsia; spasmi; amenorrhœa; blen-
norrhœa; morbi viscerum pituitosi; tæbes;
ulcera. *Extern.* Arthrodynia rheumatica.

DOSIS. Gran. vi-xxi. Sæpius de die cum vi-
tello ovi aut saccharo.

MYRTUS CARYOPHYLLATA. Cortex.

CL. *Icosand. O. Monog.* *Arborea; Ind. orient.*
et occident.

OF. *Cassia caryophyllata.* **IT.** *Cannella garo-*
folata. G. Nelkenrinde; nellkenzimmt.

QUAL. Odor fragrans; sapor aromaticus, pen-
gens.

VIRT. Stomachica.

USUS.

MYRTUS COMMUNIS.

Folia; Baccæ.

CL. et O. præced. Arborea; Europ. austr.

OF. *Myrtus*. IT. *Mirto*. A. Common myrtle.

QUAL. Olor fragrans; sapor aromaticus, substypticus.

VIRT. Calefaciens; adstringens.

USUS. Profluvia.

MYRTUS PIMENTA.

Baccæ.

CL. et O. præced. Arborea; Ind. occident.

OF. *Piper Jamaicaense*; fructus pimenti (FALSO semen anoni veri). IT. *Pepe della Giamaica*, *Pimenta*. G. *Pobore de Jamaïque*. GE. *Nelkenpfeffer*; *englisches gewürz*. A. *Jamaica pepper or long leaved pimento, or allspice*.

QUAL. Olor fragrans, gratus; sapor aromaticus.

VIRT. Calefaciens; stomachica; stimulans.

USUS.

N.

NEPETA CATARIA

Herba.

CL. *Didyn.* O. *Gymnosp.* Perennis; in muris antiquis.

OF. *Cataria*; *nepeta*. IT. *Nepeta gattaria*, o *Erba gatta*. GE. *Kaizenminze*. A. Common catmint.

QUAL. Olor hircinus, silibus gratus; sapor nauseosus, amarus.

VIRT. Nervina; menagoga; anthelminthica.
USUS. Hysteria; chlorosis.

NERIUM ANTIDYSENTERICUM. Cortex.
CL. *Pentand. O. Monog.* *Fruticosa; Ind. orient.*

OF. *Cortex conessi; cortex antidysentericus, seu profluvii.* **IT.** *Nerio, Oleandro.* **A.** *Oval leaved rosebay.*

QUAL. Lactescens; sapor amarus. *Recentis:* Acris; virosa.

VIRT. Anthelminthica.

USUS. Intermittentes pertinaces; sub finem dysenteriae; diarrhoea; oïontalgia.

NICOTIANA TABACUM. Folia siccata.
CL. *Pentand. O. Monog.* *Annua.*

OF. *Herba tabaci; nicotiana.* **IT.** *Nicotiana, Tabacco, Erba regina.* **G.** *Tabac.* **GE.** *Tobak.* **A.** *Tobacco.*

QUAL. Heroica: venenata; in principio narcotico acri residens; odor nauseosus; sapor acris, nauseosus.

VIRT. Diuretica; emetica; drastico-cathartica; stimulas; errhina; phthiriaca; deobstruens; sialagoga; narcotica.

USUS *internus* tincturae, vini, aut extracti: Hydrops; morbi pectoris pituitosi; scirrhus; icterus. *Externus* fumi (melius infusi) forma enematis: Obstipatio; ileus; hernia incarcerata. Forma lotionis: psora; ozana; phle-

mosis. — Pulvis tabaci cum aqua vel alcohole diluto in pastam redactus, carpo interno applicatus: Intermittentes.

N. B. Idem præcordiis appositus vomitum elicit.
 Dos. *Pollor siccit.* drach. semis-j ad unc. iv
 aque infusæ per horam. *Uini vel tincturæ:*
 Gutt XL-C omni bihorio in hydrope.

PRÆP. Extractum; tinctura; vinum *Ph. Edinb.*

NIGELLA SATIVA.

Semen.

CL. *Polyand. O. Tetragyn.* *annua; insul.*
archipel.

OF. *Semen nigellæ s. melanthii.* IT. *Nigella.*

GE. *Schwarzkümmel; schwarzer koriander.*

A. *Small fennelflower.*

QUAL. Venenata: in oleo volatili, simulque fixo residens: odor fragrans; sapor acris, aromaticus.

VIRT. Stimulans; lactifera; errhina; sialagoga, menagoga; anthelminthica.

USUS.

NYMPHÆA ALBA.

Radix; flores.

CL. *Polyand. O. Monog.* *Perennis; in locis*
paludosis, aquosis.

OF. *Nymphaea.* IT. *Ninfea, o Nenufar bian-*
co. G. Nenufar blanc. A. White water lily.

QUAL. *Florum:* Fragrans. *Radicis:* In oleo acri residens, exsiccatione avolans.

VIRT. *Florum:* antaphrodisiaca? Refrigerans; hypnotica. *Radicis:* Vesicans.

NYMPHÆA LUTEA.

IT. *Ninfea gialla*. A. *Yellow water lily*.

QUAL. et VIRT. Eadem ac preced.

O.

OCYIMUM BASILICUM.

Herba; semen.

CL. *Didyn.* O. *Gymnosp.* annua; horten.

OF. *Herba Basilici*. IT. *Ocimo*, *Basilico*. GE.

Basilienkraut. A. *Common sweet basil*.

QUAL. *Herbæ*: Odor fragrans; sapor aroma-
ticus. *Seminis*: Mucilaginosi.

VIRT. Nervina.

USUS. Vomitus; rheumata.

OENANTHE CROCATA.

Herba.

CL. *Perland.* O. *Digen.* Perennis; Europ.

IT. *Enante*, o *Filipendula falsa*. A. *Hemlock-
water-dropwort*.

QUAL. Mucilaginosi.

VIRT. Emolliens.

USUS.

OLEA EUROPÆA.

Oleum fixum, expres-
sione fructus paratum.

CL. *Dianl.* O. *Mong.* Arborea; Europ.
austr.

OF. *Oleum olivarum* IT. *Ulive*, ed *olio di
olive*. G. *Huile d'olives*. GE. *Baumecl.* A.
Common European olive: olive-oil.

QUAL. Oleosa.

VIRT. Emolliens; involvens.

USUS *intern. et extern.*: Dysenteria; tenesmus; tussis; stranguria; nephritis; enteritis; mor-
sura.

N. B. Oleum calidum toti corporis superficiei frictione adplicatum donec sudor profluat, curare æque ac arcere pestem, nuper didicimus.

ONONIS ARVENSIS

———— SPINOSA.

} Radix; herba.

CL. *Diadelph. O. Decand.* Perennis; ad vias, et in locis sterilibus.

VAR. A. flor. Purpur. B. Flor. alb.

OF. *Anonis s. Ononis.* IT. *Ononide, Annonide.*

G. *Arrête-bœuf*; bugrane. GE. *Hauhechel.* A.

Thorney purple et white rest harrow.

QUAL. Sapor subacris, ingratus.

VIRT. Diuretica.

USUS. Testiculi tumor durus; hydrocele; ic-
terus; ischuria?

DOS. Pulveris drach. j; in decocto unc. semis
ad libram j aquæ.

ONOPORDIUM ACANTHIUM.

Herba.

recens; succus expressus.

CL. *Syng. O. Polyg. æqual.* Perennis.

OF. *Carduus tomentosus*; *acanthium.* IT. *Acan-*

zia. G. *Pédane.* GE. *Weg distel*; *grosse zell-*

blume. A. *Woolly onopordium or cottonthi-*

stle. H. *Toba.*

VIRT. Specifica anticancrosa?

USUS *succi recentis* externe adplicati : Carcinoma ; præcipue ulcera faciei cancrosa.

ONOSMA ECHIOIDES.

Radix.

CL. *Pentand. O. Monog.*

N. B. Substituatur *anchusæ tinctoriæ*.

OF. *Anchusa lutea*. IT. *Onosma*.

QUAL.

VIRT. Menagoga?

USUS.

OPHIORRHIZA MUNGOS.

Radix.

CL. *Pentand. O. Monog.*

Perennis ; Ind. orient.

OF. *Radix serpentum s. mungos*.

QUAL. In extractivo amaro residens ; sapor subsalsus, intense amarus.

VIRT.

USUS. Morsura ; hydrophobia ? Mania ?

OPHIOXYLUM SERPENTINUM.

Lignum.

CL. *Polyg. O. Monæc. Arborea ; Ind. orient.*

OF. *Lignum serpentum. s. serpentium*. IT. *Ligno serpentino*. A. *Scarletflowered ophioxylum*.

QUAL. Sapor amarus.

VIRT.

USUS *infusi* : Quartana ; morsura.

DOS. Drach. semis ad libram j aquæ.

ORCHIS BIFOLIA.

Radix.

CL. *Gynand.* O. *Diand.*

Perennis.

OF. *Satyrion.* IT. *Satirio*, *Satirione.* GE. *Stendelwurzel.*

QUAL et VIRT. *Sequentium.*

ORCHIS MASCULA.

—— MILITARIS.

—— MORIO, etc.

} Radix.

CL. et O. *præced.*

Perennis; in Sylvis.

OF. *Radix salep; salap.* IT. *Salep*, e *Testicolo di cane.* A. *Male orchis; man orchis et female orchis.*

QUAL. *Mucilaginosa.* N. B. *Odor quarumdam specierum hircinus.*

VIRT. *Nutriens; involvens: aphrodisiaca?*

USUS. *Anaphrodisia? Dysenteria; tabes; ulcera interna.*

DOS. *Drach. ij pulveris ad libram j aquæ in decocto.*

ORIGANUM CRETICUM.

Spicæ.

CL. *Didyn.* O. *Gymnosp.*

Perennis; Europ. austr.

OF. *Origanum Creticum.* IT. *Origano Cretico.* G. *Origan.* GE. *Spanischer hopfen; kretische dosten.*

QUAL. *In oleo volatili acris residens: odor fragrans, gratus; sapor acris, aromaticus, amaricans.*

VIRT. *Stimulans; menagoga; resolvens.*

USUS. Odontalgia: In balneis.

PRÆP. Oleum volatile.

ORIGANUM DICTAMNUS.

Folia.

CL. et O. præced.

Perennis; suffruticosa;
Archipel.

OF. *Dictamnus Creticus*. IT. *Dittamo Cretico*.

G. *Dictarne de Candie*. GE. *Kretischer dictam*. A. *Dittany of Candia*.

QUAL. In oleo volatili residens; odor fragrans debilis; sapor aromaticus, calidus.

VIRT. Stimulans; nervina; menagoga; resolvens.

USUS.

PRÆP. Oleum volatile.

ORIGANUM MAJORANA.

Herba.

CL. et O. præced.

Annua; hortensis, Europ.
austr.

OF. *Majorana*. IT. *Amaraco*, *Erba persa*,

Magiorana. G. *Marjolaine*. GE. *Majoran*.

A. *Sweet or knotted marjoram*. H. *Alnoradux*.

QUAL. In oleo volatili copioso residens: odor fragrans, gratus; sapor aromaticus.

VIRT. Stimulans; nervina; stomachica; menagoga; errhina; resolvens.

USUS. Anosmia; coryza.

PRÆP. Oleum volatile.

ORIGANUM SYRIACUM.

Herba.

A. *Syrian herb mastich*.

QUAL. Aromatica.

VIRT. Stimulans.

USUS.

ORIGANUM VULGARE.

Herba.

CL. *et* O. *præced.* Perennis; in locis montanis, nemorosis, siccis.

OF. *Origanum vulgare.* IT. *Origano comune.*

G. *Origan.* GE. *Dosten*; *wohlgemuth.* A.

Common marjoram. H. *Origano sylvestre.*

QUAL. In oleo volatili copioso residens: odor fragrans, gratus; sapor aromaticus, amaricans, subacris: tinctoria.

VIRT. Stimulans; nervina; resolvens.

USUS. Tussis; tabes pulmonalis pituitosa; chlorosis; œdema: In balneis frequens.

N. B. Theæ succedaneum.

PRÆP. Oleum volatile.

ORYZA SATIVA.

Semen.

CL. *Hexandr.* O. *Digyn.*

Annua.

OE. *Grana oryzæ* IT. *Riso.* G. *Riz.* GE. *Reis.*

A. *Common rice.* H. *Arroz.*

QUAL. Mucilaginoso; farinosa; dulcis.

VIRT. Nutriens; involvens.

USUS *Cibarius*: Diarrhœa; dysenteria.

OSMUNDA REGALIS.

CL. *Cryptog.* O. *Filices.*

IT. *Osmunda reale.* A. *Royal or flowering osmunda.*

QUAL. Styptica.

VIRT. Adstringens.

OXALIS ACETOSELLA. Herba recens; Folia.
CL. *Decand. O. Pentag.* Perennis; Europ.
OF. *Acetosella s. lujula.* IT. *Alleluja, Pancu-*
cula, Acetosella, sale, o acido Ossalico.
G. *Oseille des bucherons.* GE. *Sauerklee.* A.
Common wood-sorrel. H. *Oxalide. acederilla;*
aleluja.

QUAL. In acido peculiari residens; sapor in-
tense acidus, gratus.

VIRT. Refrigerans.

USUS. Febres. *Externus fol. recent. contuser.*
forma cataplasmatitis: ulcera glandularum
scrophulosa.

PRÆP. Oxalas acidulus potassæ vulgo sal ace-
tosellæ. (G. Oxalate acidule de potasse:)
Acidum oxalicum; conserva; syrupus.

OXALIS CERNUA.

QUAL. et VIRT. Præced.

OXALIS CORNICULATA.

CL. et O. præced.

Europ. austr.

A. *Yellow wood-sorrel.*

QUAL. et VIRT. præcedentis.

P.

PAEONIA ANOMALA.

Radix.

MEDICA.

181

CL. *Polyand.* O. *Digyn.* *Perennis; alpina.*

QUAL.

VIRT.

USUS. *Intermittentes.*

PAEONIA OFFICINALIS. Radix; flores;
semen.

CL. *et O. præced.*

OF *Paeonia.* IT. *Peonia.* G. *Pivoine.* GE. *Pa-*
eonien; gichtrosen; pfingstrosen. A. *Common*
paeony.

QUAL. *Radicis recentis:* Odor teter, foetidus.

Siccatae: sapor farinaceus, substypticus.

VIRT. *Narcotica; antispasmodica; subastrin-*
gens.

USUS. *Epilepsia; Intermittentes. (PALLAS).*

N. B. *Succus radicis recentis paeoniae foliis*
bifidis expressus majori dosi in epilepsia
tentari meretur.

PANAX QUINQUEFOLIUM. Radix.

CL. *Polyg.* O. *Diœc.* *Perennis; Tartariae;*
Amer. septentr.

OF. *Radix ginseng.* IT. *Ginseg.* A. *Ginseng.*

QUAL. Sapor gratus, leniter aromaticus.

VIRT. *Leniter stimulans. — Aphrodisiaca?*

USUS. *Anaphrodisia? asthenia? marasmus?*

DOS. *Scrup. j-drachm j.*

PANICUM DACTYLUM. Radix.

CL. *Diand.* O. *Digyn.* *Europ. austr.*

IT. *Panico silvestre.*

QUAL.

VIRT.

USUS. Substituitor radici tritici repentis in Italia.

PANICUM ITALICUM.

Semen.

CL. *et O. præced.*

Annua.

OF. *Milii semen.* IT. *Miglio.* G. *Millet.* A. *Italian panic-grass.*

QUAL. Farinacea.

VIRT. Nutriens; involvens.

USUS.

PAPAVER RHÆAS.

Flores.

CL. *Polyand. O. Polyg. superfl.*

Annua.

OF. *Papaver rhæas*, seu erraticum. IT. *Papavero salvatico*, o *Rosolacci.* G. *Pavot coquelicot.* GE. *Klatschrosen.* A. *Common red poppy.* H. *Adormidera sylvestris amapola.*

QUAL. Subamara.

VIRT. Subnarcotica.

USUS.

PRÆP. Syrupus lacte ruber.

PAPAVER SOMNIFERUM.

Capsulæ seminales:

Succus gummi-resinosus incisione vel expressione capsularum seminalium immaturarum obtentus, vulgo *Opium dictus.*

CL. et O. præcel. *Annua; Aegypti. et Asiae meridion.; Europ. hortensis.*

OF. *Capita papaveris albi: Opium.* IT. *Papavero domestico; Oppio.* G. *Pavot somnifere: Opium.* GE. *Weisser mohn: Mohnsaft.* A. *Common white poppy: Opium.*

QUAL. *Heroica: in principio narcotico cum gummi-resinoso volatili juncto residens; odor teter, virosus; sapor nauseosus, aëris, amarus.*

VIRT. *Narcotica; sudorifica; obstipans: majori dosi stimulans; cardiaca.*

USUS *internus: Dolor ex irritatione au spasmō; dolor phlegmasiarum post evacuationes debitas; intermittentes ante paroxysmum vel finito stadio frigoris; dysenteria atonica; diarrhœa; Cholera; tussis ex acri tenui; lochia dolorifica et hæmorrhagiæ ab irritatione locali aut spasmō; menstruatio dolorifica; podagra atonica (magna dosi); rheumatismus post v. s. necessarias; asthma; hysteria; nephralgia; cardialgia; colica pictonum; tetanus; convulsio; blennorrhagia; tumor epididymidis vel testiculi syphilitica; ulcera syphilitica rebellia; ulcera phagedænica; gangræna senilis. Externus forma enematis, fots, linimenti.*

DOSIS. Gr. i-xv de die.

PRÆP. *Solutio opii in vino vel alcohole diluto; extractum aquosum; syrupus; decoctum capsularum; linimenta varia.*

N. B. Semina nulla qualitate, nisi oleosa demulcente, gaudent.

PARIETARIA OFFICINALIS. Herba; radix.
CL. Polyg. O. Monæc. Perennis.
OF. Parietaria. IT. Vetriolo, Parietaria. G. Pariétaire. GE. Glaskraut; mauerkraut. A. Wall pellitory.

QUAL. Aquoso-insipida.

VIRT. Refrigerans; diuretica.

USUS. Stranguria; tabes?

PARIS QUADRIFOLIA. Herba; baccæ.
CL. Octand. O. Tetrag. Perennis.
IT. Erba Paris, Uva Lupina. A. Herb paris; true love or one berry.

QUAL. Odor teter; sapor dulcescens.

VIRT. Antispasmodica; narcotica.

USUS. Convulsio; mania; bubo; ophthalmia.

PARNASSIA PALUSTRIS. Herba; flores.
CL. Pentand. O. Tetrag. Perennis.
OF. Hepatica alba. A. Grass of Parnassus.
QUAL. Amaricans.

VIRT. Subadstringens.

USUS.

PASTINACA OPOPANAX. Succus gummi-resinosus concretus, incisione plantæ et radicis, obtentus.

CL. Pentand. O. Digyn. Perennis; Europ. austr.

OF. *Gummi opopanax*. IT. *Opopanaco*. A.
Rough parsnep.

QUAL. In oleo volatili et principio resinoso
 residens; odor graveolens; sapor acris, ama-
 ricans.

VIRT. Nervina; eccoprotica; carminativa; me-
 nagoga.

USUS. Tussis; asthma pituitosum.

PASTINACA SATIVA.

Semen.

CL. et O. *præced.*

Biennis.

OF. *Pastinaca*. IT. *Pastinaca domestica*. A.
Garden Parsnep.

QUAL.

VIRT?

USUS. Intermittentes?

DOS. *pulveris*: Drach j-Unc. semis.

PEDICULARIS PALUSTRIS.)

Aliæque SPECIES.)

Herba recens.

CL. *Didyn*. O. *Gymnosp.*

IT. *Stafusaria*, *Pituitaria*, *Pedicularia*. A.
Lousewort.

QUAL. Ingrata.

VIRT.?

USUS. Fistula; ulcus callosum.

PENAEA SARCOCOLLA.)

————— MUCRONATA.)

Gummi-rseina.

CL. *Tetrand*. O. *Monog.* *Fruticosa*; *Æthio-*
pica.

N. B. *Gummi sarcocollæ offic.* ex his plantis
provenire creditur.

IT. *Sarcocolla*.

QUAL. Inodora ; sapor amaricans , acris , nau-
seosus.

VIRT. Stimulans ; cathartica.

USUS.

FENTAPETES MUHUCUNDA ? Flores.

CL. *Monadelph. O. Dodec.* Ind. orient.

Muhucunda BENGALIS.

QUAL. Mucilaginoso.

VIRT.

USUS *infusi flor. recent.* *Blennorrhagia. Pulv.*
flor. siccato. naribus attracti : Cephalæa ner-
vosa.

PETIVERA ALLIACEA.

Herba.

CL. *Hexand. O. Trigyn.*

Fruticosa ; Ind.
occident.

OF. *Scorodoniæ herba.* A. *Common guinea*
heu-weed.

QUAL. et VIRT. *allium æmulans.*

USUS. *Intermittentes.*

PEUCEDANUM OFFICINALE.

Radix.

CL. *Pentand. O. Digyn.*

Perennis.

OF. *Peucedanum.* IT. *Peucedano.* A. *Common*
sulphur-wort.

QUAL. *Lactescens ; odor nauseosus ; sapor*
dulcescens.

VIRT. Diuretica? Expectorans?

USUS. Ulcera; odontalgia.

PEZIZA AURICULA.

CL. Cryptog. O. Fungi.

OF. *Auricula Judæ*; fungus sambuci. IT.

Fungo di Sambuco, Orecchio di Giuda.

QUAL.

VIRT. Adstringens.

USUS externus forma gargarismatis: Angina?

Collyrii: Ophthalmia?

PHALARIS CANARIENSIS.

Semen.

CL. Diand. O. Monog.

OF. *Semen canariense*. IT. *Falari*. A. *Manured canary grass*.

QUAL. Farinacea.

VIRT.

USUS.

PHASEOLUS VULGARIS.

Semen.

CL. Diadelph. O. Decand.

IT. *Fagiuolo*. A. *Kidney-bean*.

QUAL. Farinacea.

VIRT. Nutriens; cosmetica.

USUS.

PELLANDRIUM AQUATICUM.

Semen.

CL. Pentand. O. Digyn. *Biennis; in locis paludosis.*

OF. *Phellandrium s. fœniculum aquaticum*.

IT. *Finocchio palustre*. G. *Phellandrie*. GB.
Wasser-fenchel. A. *Water phellandrium*. H.
Milenrama aquatico.

QUAL. Odor et sapor aromaticus, acris.

VIRT. Stimulans; narcotica?

USUS *pulv. vel decocti*: Dyspepsia; intermittentes; hypochondriasis? Ulcera scrophulosa, atonica; tabes pulmonalis pituitosa.

DOS. Pulveris unc. semis-; cum lacte omni mane; pro decocto unc. ; ad libram unam aquæ vel aquæ calcis.

PHŒNIX DACTYLIFERA.

Fructus.

Palma; Asiæ et Africæ.

OF. *Dactyli*. IT. *Datteri*, o *Dattili*. G. *Dattes*. A. *Date Palm-tree*.

QUAL. Sapor dulcis, mucilaginosus.

VIRT. Nutriens; expectorans.

USUS. Tussis; raucedo; stranguria.

PHYLLANTHUS EMBLICA.

Fructus sicca-

tus cum nuce.

CL. *Monœc*. O. *Triand*.

Arborea; Ind. orient.

OF. *Myrobalani emblicæ*. IT. *Mirobalani emblici*. A. *Shrubby philanthus*.

QUAL. Sapor acidulus, austerus, subacris.

VIRT. Adstringens. *Infusi*: Cathartica.

USUS. Stomacacæ; dysenteria.

PHYSALIS ALKEKENGİ.

Baccæ; semina.

CL. *Pentand.* O. *Monog.*

OF. *Solanum vesicarium* ; *baccæ alkekengi.*

IT. *Alchechengi.* G. *Coqueret* ; *alkékenge.* GE.

Judenkirschen. A. *Wintercherry.* H. *Vegiga de perro.*

QUAL. *fructus* : Sapor grate acidulus. *Corticis fructus* : Sapor intense amarus.

VIRT. *fructus* : Diuretica ; eccoprotica.

USUS. Nephritis ; Dysuria ; hydrops.

PHYTOLACCA DECANDRA. Succus foliorum expressus.

CL. *Decand.* O. *Decagyn.* Perennis ; *Virginianæ* ; *passim hortensis.*

OF. *Phytolacca.* IT. *Fitolacca comune* , *Pianta lacca* , *Solano racemoso.* G. *Phytolaque* ; *raisin d'Amérique.* GE. *Amerikanische kermesbeeren* ; *Amerikanischer nachtschatten.*

A. *Branching phytolac or virginiam.* poke.

H. *Yerba carmin.*

QUAL. *Tenellæ* : Aquosa. *AJultæ* : Acris.

VIRT. Corrodens ; anticancrosa ?

USUS. Succu guttatim instillati : Ulcera can-
crosa.

PIMPINELLA ANISUM.

Semen.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.*

Annua ; *Ægyptiaca.*

OF. *Semen anisi.* IT. *Anice.* G. *Anis.* GE. *Anics.*

A. *Anise.*

QUAL. In oleo volatili non acri residens ;

sapor dulcescens, aromaticus; odor virosus, fragrans.

VIRT. Stimulans; carminativa; lactifera; res-
solvens.

USUS pulveris: Flatulentia. **Olei:** Rheuma-
tismus.

DOSIS pulveris: Scrup. j-drach. semis. In in-
fuso: Unc. semis ad libram j aquæ.

PRÆP. Oleum volatile. Gutt. x-drachm ij pro
dosi.

PIMPINELLA MAGNA.

Radix.

CL. et O. præced.

Perennis.

OF. *Pimpinella nigra*. IT. *Pimpinella*. G. *Grand
boucage*. GE. *Schwarze bibernellwurzel*. A.
Great burnet saxifrage.

QUAL. In oleo volatili cæruleo residens; odor
et sapor aromaticus.

PIMPINELLA SAXIFRAGA.

Radix.

CL. et O. præced.

Perennis.

N. B. VARIETAS. A. Alba. B. nigra.

OF. *Pimpinella alba* s. *nostras*. IT. *Sassifra-
ga*. G. *Petit boucage; saxifrage*. GE. *We-
isse Bibernellwurzel*. A. *Small burnet saxi-
frage*.

QUAL. Præstans: In principio resinoso acri
residens: Odor hircinus; sapor acris, cali-
dus.

VIRT. Stimulans; diuretica; menagoga; resol-
vens.

PRÆP. Tinctura.

CL. Monæc. O. Monadelph. Arborea.

QUAL. *Summitatum seu foliorum teneriorum acerosorum*: Resinosa; sapor acescens, resinosis. — *Resinæ*: Sapor gratus, amarus; odor fragrans.

usus decocti summitatum: Morbi cutis. *Resinæ fusæ cum sebo externus*: Lepra ichthyosis CULLEN.

PINUS BALSAMEA.)	Resina liquida, inci-
— CANADENSIS.)	sione aut perforatione
)	arborea obtenta.

CL. et O. præced. Arborea; Amer. septent.

OF. *Balsamum Canadense*. IT. *Balsamo del Canada*. GE. *Kanadischer balsam*. A. *Canada balsam*.

QUAL. Resinosa; odor fragrans, grātus; sapor subaromaticus, leviter pungens, amaricans.

VIRT. Stimulans; diuretica; diaphoretica.

USUS. Blennorrhœa; morbi cutis; acre herpeticum in corpore vagum; morbi viscerum pituitosi.

DOSIS. Gutt. XL-LX.

PINUS CEMBRA.

Resina liquida.

CL. et O. præced.

Arborea; alpina.

OF. *Balsamus carpathicus*; *balsamus Libani*.

A. *Sibirian stone pine-tree*.

QUAL. Resinosa.

VIRT. Diuretica; stimulans.

USUS. Blennorrhœa; ulcera.

PINUS LARIX.

Resina liquida.

CL. et O. præced.

Arborea; alpina.

OF. *Terebinthina Veneta seu larigna*. IT. *Larico*, e *Trementina di Venezia*. G. *Tèrébinthine*: *Melese*. GE. *Terpentin*: *Lerchenbaum*.

A. *Venitian turpentin*: *common white larch-tree*.

QUAL. Resinosa.

VIRT. Diuretica; stimulans; urinam violaceo-odore imbuens.

USUS. Idem ac præced.

PINUS MUNGHOS. (SCOPOLI.) Oleum destillatione obtentum.

CL. et O. præced.

Arborea; German. *Hungar. alpina*.

OF. *Oleum templinum*. A. *Krummholz-oel*.

PINUS PINEA: Nuclei.

CL. et O. præced. Arborea; Europ. austr.

OF. *Pinsi*. IT. *Pino domestico*; *Pignoli*. G.

Pin-pignier. A. *Stone pine-tree*.

QUAL. Dulcis; oleosa.

VIRT. Nutriens.

USUS. Tabes; stranguria.

PINUS PICEA. Resina liquida, incisione
arboris obtenta.

CL. et O. præced. Arborea.

OF. *Terebenthina Argentoratensis*: *resina alba*.

IT. *Pece*, *Pece Greca*. A. *Silver fir-tree*.

PINUS SYLVESTRIS. Turiones; resina alba
liquida, perforatione aut incisione arbo-
ris obtenta.

CL. et O. præced. Arborea.

OF. *Terebinthina communis*: *Pix alba* IT.

Pino salvatico; *Resina liquida*, e solida.

G. *Terebenthine*: *résine blanche*; *galipot*.

GE. *Gemeiner terpentim*; *weisses peck*. A.

Common turpentin; *white rosin*: *scors fir or pine-tree*.

QUAL. Resinosa; acris; amara.

VIRT. Stimulans; diuretica; diaphoretica; de-
pilatoria.

USUS internus: *Arthrodynia*; *blennorrhœa*; *asthma puitosum*; *scorbutus*. *Decocti tu-*

tionum vel resinæ liquidæ : Mosbi cutis ; herpes. *Externus resinæ liquidæ* forma enematis : Obstipatio. *Forma unguenti vel emplatri* : Ulcera atonica.

DOS. *Turionum* : Unc. semis- $\frac{1}{2}$ ad libras ij aquæ vel seri lactis coct: de die sumendum. *Resinæ liquidæ* : Unc. semis- $\frac{1}{2}$ vitello ovi subacta cum aqua mixta pro enemate. *Intern* : Gran. v-x vitello ovi vel saccharo subacta.

PRÆP. Resina alba liquida calore ignis exsiccata vulgo *colophonium*. Resina nigra destillatione per descensum obtenta , fumo inquinata , liquida vulgo *pix nigra liquida* ; resina solida vulgo *pix navalis*. **IT.** *Catrame*. **G.** *Goudron* ; *poix*. **GE.** *Theer* ; *schiffspeck*. **A.** *Tar* ; *pitch*. — *Oleum volatile terebinthinæ* ; *aqua picea*.

PIPER BETEL.

PIPER CUBEBA.

Fructus siccatus.

CL. *Diandr.* **O.** *Trigyn.*

Sarmentosa ; *Ind. orient.*

OF. *Cubebæ*. **IT.** *Cubebe*. **G.** *Cubebes*. **GE.** *Kubeben* ; *schwindelkærner*. **A.** *Cubebs*. **H.** *Pimenta cubeba*.

QUAL. *Acris* ; *aromatica* ; *fervida*.

VIRT. *Stimulans* ; *calefaciens* ; *carminativa* ; *sialagoga*.

USUS. *Vertigo* ; *morosis*?

PIPER LONGUM.

Fructus.

CL. *et O. præced.*

Sarmentosa ; *Ind. orient.*

OF. *Piper longum*. IT. *Pepe lungo*. G. *Poivre long*. GE. *Langer pfeffer*. A. *Long pepper*.
QUAL. et VIRT. *Sequentis*.

PIPER NIGRUM.

Fructus.

CL. et O. *præced.* *Sarmentosa*; *Ind. orient.*

N. B. *Piper album* est fructus maturus cortice privatus.

OF. *Piper nigrum*, *album*. IT. *Pepe tondo*. G. *Poivre*. GE. *Gemeiner pfeffer*. A. *Black*, or *white common pepper*.

QUAL. In principio resinoso residens; acris; aromatica; fervida.

VIRT. Stimulans; calefaciens; stomachica; er-
rhina; phthyriaca.

USUS *internus*: Intermittentes; dyspepsia;
singultus. *Externus*: Uvulæ relaxatio; pe-
diculi.

PISTACIA CHIO. (TOURNEFORT.). Resina
liquida.

CL. *Diæc.* O. *Pentandr.* *Arborea*; *Ins. Chio*.

N. B. Sub hoc nomine in horto botanico Pa-
risino existit arbor à Tournefort ex insula
Chio allata, ex qua incolæ hujus insulæ
terebinthinam e Chio veram depromunt. Hæc
arbor longe minor est pistacia terebintho,
foliola pauciora et folia undulata, glauca
habet. Terebinthinam e Chio in commercio
vulgo obviam ex hac et pistacia terebintho
promiscue depromi probabile est.

PISTACIA LENTISCUS. Resina alba, incisione arboris exudans, concreta.

CL. et O. præced. Arborea; Europ. austr.

OF. Mastiche; gummi mastiche. IT. Resina di Lentisco; Mastice G. Mastic. GE. Mastix.

A Mastiche: common mastick-tree. H. Almastiga; almaciga.

QUAL. Resinosa; aromatica.

VIRT.

USUS. Masticatorius; item suffimigia.

PISTACIA TEREBINTHUS. Resina liquida.

CL. et O. præced. Arborea; Asiæ, Afric. et Europ. austr.

OF. Terebinthina de Chio seu Cyprina. IT. Trementina di Cipro, o di Chio. GE. Zypresscher tespentin. A. Common turpentin-tree.

QUAL. Resinosa; odor fragrans; sapor gratus, amarus, subacris; urinam violaceo odore imbuens.

VIRT. Stimulans; diuretica; eccoprotica; resolvers.

USUS. Tussis; tabes; ulcus; blennorrhœa.

PISTACIA VERA. Nuces.

CL. et O. præced. Arborea; Asiæ et Europ. austr.

OF. Pistaciæ. IT. Pistacchi. G. Pistaches. GE. Pistazien.

QUAL. Oleosa.

VIRT. Nutriens.

USUS.

PISUM SATIVUM.

Semen.

CL. *Diadelph. O. Decand.*

Hortensis.

IT. *Pisello*, v. *Erbione.*

QUAL. Farinacea.

VIRT. Nutriens.

USUS.

PLANTAGO MAJOR.

———— MEDIA.

———— LANCEOLATA.

) Herba ; radix ;
) semen.

CL. *Tetrand. O. Monog.* In viis passim.

OF. *Plantago.* IT. *Piantaggine maggiore.* G.

Plantain. GE. *Wegwart.* A. *Great, hoary,*
et rib-wort plantain.

QUAL. Insipida ; substyptica.

VIRT. Adstringens.

USUS. *Tertiana* ; *ulcus.*

PLANTAGO PSYLLIUM.

Semen.

CL. *et O. præced.* *Annua ; Europ. austr. ;*
in Campis arenosis.

OF. *Semen psyllii.* IT. *Semi di Psilio.* G. *Herbe*
aux puces. GE. *Flohsaamen.* A. *Flea-wort*
or clammy plantain.

QUAL. Mucilaginoso.

VIRT. Involvens.

USUS. *Raucedo* ; *ophthalmia.*

PLUMBAGO EUROPÆA.

Radix.

CL. Pentand. O. Monog.

Perennis; Europ.
austr.OF. *Dentellaria*; *dentaria*. IT. *Dentaria*, *Tri-*
polio, *Crepanella*. GE. *Zahnwurz*. A. Eu-
ropean leadwort.QUAL. In principio acri residens; sapor acris,
urens.

VIRT. Caustica.

USUS. Odontalgia.

PLUMERIA ALBA.

Radix.

CL. Pentand. O. Monog.

Arborea; Ind.
occident.A. *White plumeria*.

QUAL. Lactescens.

VIRT.

USUS decocti: syphilis?

POINCIANA PULCHERRIMA.

VIRT. Menagoga.

POLYGALA AMARA.

Radix; folia.

CL. Diadelph. O. Octand.

Subperennis; in
montibus nemorosis.OF. *Polygala amara*. IT. *Polygala amara*. G.
Polygale amère. GE. *Bittere kreutzblume*.
A. *Bitter milkwort*.QUAL. Radicis: subdulcis, amaricans. Folio-
rum: Sapor intense amarus.

VIRT. Foliorum et radicis: Stomachica.

USUS *Radicis*: Morbi pectoris atonici; per-
tussis; tabes pulmonalis.

DOS. *Pulveris radicis*: Drach. semis. bis terve
de die. *Decocti radic.* unc. ij ad libram ij
aquæ reductæ ad libram unam de die su-
mend.

POLYGALA SENEGA. Radix; cortex radicis.
CL. et O. præced. Perennis; *Virgin. Pennsylv.*
OF. *Senega*; *seneka*; *polygala Virginiana.* IT.
Poligala di Virginia. GE. *Senekawurzel.* A.
Rattlesnake-root or officinal milkwort.

QUAL. Heroica: In principio resinoso resi-
dens; sapor acido-acris, subaromaticus, ad
finem intense amarus, urens.

VIRT. Subemetica; cathartica; sudorifica; diu-
retica; expectorans; sialagoga; deobstruens.

USUS. Hydrops; arthrodynia; arthritis; morbi
pulmonum atonici, pituitosi. Morsura ser-
pentum? Tabes; pleuritis?

DOSIS *pulveris*: Gran. x—xxx. — *In decocto*:
Scrup. j-drach. semis ad libram-j aquæ
sumend. unc. semis-j omni hora, donec
alvum movere incipiat.

PRÆP. Decoctum; infusum vinosum; tinctura.

POLYGALA VULGARIS.

Radix.

CL. et O. præced.

Subperennis.

IT. *Poligala comune.*

QUAL.

VIRT.

USUS.

POLYGONUM AVICULARE.

Herba.

CL. et O. præced.

Annua.

OF. *Centumnodium* ; *sanguinaria* ; *herba sanguinalis*. IT. *Lingua di passera*. A. Common knot.grass.

QUAL. Substyptica.

VIRT.

USUS.

POLYGONUM BISTORTA.

Radix.

CL. *Octand*. O. *Trigyn*. Perennis ; in pratis humidis.OF. *Bistorta*. IT. *Bistorta*. G. *Bistort*. GE. *Natterwurz*. A. *Great bistort* or *snakeweed*.

QUAL. In copioso principio adstringente residens ; sapor stypticus.

VIRT. Roborans ; adstringens.

USUS. Cum gentiana forma pulveris, decocti, infusi : Intermittentes ; profluvia ; leucorrhœa.

DOS. Drach. iij de die.

POLYGONUM FAGOPYRUM.

Semen.

IT. *Fromento Saracinesco*, o *nero* ; v. *Fraina*.

QUAL. Farinacea.

VIRT. Nutriens.

USUS.

POLYGONUM HYDROPIPER.

Herba.

CL. et O. præced. Annua ; in fossis humidis.

OF. *Hydropiper* ; *persicaria*. IT. *Persicaria*

urente. G. *Poire d'eau*. GE. *Wasserpfeffer*; *flähkraut*; *pfersichkraut*. A. *Waterpolygonum*; *water-pepper* or *arsmart*.

QUAL. Lutea; acris; urens.

VIRT. Diuretica; corrodens; rubefaciens.

USUS.

POLYGONUM PERSICARIA.

OF. *Persicaria*. IT. *Persicaria mite*; *Maculata*. A. *Spotted polygonum* or *persicaria*.

QUAL.

VIRT.

USUS.

POLYPODIUM FILIX MAS.

Radix.

CL. Cryptog. O. *Filices*.

In umbrosis nemorosis.

N. B. Planta 6 ad 7 pedum altitudinis: Frondibus bipinnatis; pinnis obtusis crenulatis; stipite paleaceo.

OF. *Filix mas*. IT. *Felce maschio*. G. *Fougère mâle*. GE. *Johanniswurzel*. A. *Male fern* or *male polypody*. H. *Polypodio helecho masculino*.

QUAL. Sapor ingratus, mucilaginoso-dulcis, stypticus, sub finem amaricans.

VIRT. Anthelminthica. Lactifera? Menagoga?

USUS. Tænia; lumbrici; rhachitis?

DOSIS pulveris: Gran. xxx-drach. j infantibus: drach. ij. iij adultis, subjuncto cathartico.

POLYPODIUM FRAGRANS. Herba.

QUAL. Odor fragrans; sapor aromaticus.

VIRT. Stimulans.

USUS.

POLYPODIUM VULGARE. Radix mollis.

CL. et O. *præced.* Perennis; in rimis petrarum.

OF. *Polypodium*. IT. *Polipodio*, *Fillicola*. G. *Polypode ordinaire*; *polypode de chêne des anciens*. GE. *Engelsiüss*. A. *Common polypody*.

QUAL. Sapor dulcis, subnauseosus, tandem amarus.

VIRT. Expectorans; eccoprotica.

USUS.

POLYTRICHUM COMMUNE. Herba.

CL. *Cryptog.* O. *Musci*.

OF. *Adiantum aureum*. IT. *Adianto aureo*.

QUAL.

VIRT.

USUS.

POPULUS BALSAMIFERA. Resina.

An balsamum?

CL. *Diæc.* O. *Octand.* Amer. septentr.

N. B. JACQUIN *tacamahacam* ex *Fagara octandra* derivat.

OF. *Gummi tacamahaca*. IT. *Tacamacea*. A. *Common tacamahac poplar tree*.

QUAL. Præstans : Odor ambrosiacus.

VIRT.

USUS. Cophosis ; vomitus ; hysteria.

POPULUS NIGRA. Gemmæ.

IT. *Pioppo*. A. *Black poplar tree*.

QUAL.

VIRT. Obtundens ; emolliens ; soporifera.

USUS. Diarrhoea ; ambustura ?

FORTULACA OLERACEA. Semen.

CL. *Dodecand*. O. *Monog*.

IT. *Porcellana* ; *Portalaca* , *Porcaccia*. A. *Garden purslane*.

QUAL. *Aquosa*.

VIRT. Refrigerans ; lac coagulans.

USUS. Stranguria ?

POTENTILLA ANSERINA. Radix ; herba.

CL. *Icosand*. O. *Polygyn*. *In fossis et pratis humidis*.

OF. *Folia argentinæ s. anserinæ*. IT. *Argentina*. A. *Silver cinquefoil or wild tansy*.

QUAL. *Insipida*.

VIRT. ?

USUS.

POTENTILLA REPTANS. Radix ; herba.

CL. *et O. præced.* *Perennis ; in pratis humidis*.

OF. *Quinquefolium ; pentaphyllum*. IT. *Cinquesoglie*. A. *Common cinquefoil*.

QUAL. Styptica.

VIRT. Adstringens.

USUS. Diarrhœa; sub finem dysentericæ.

POTERIUM. SANGUISORBA. Herba.

CL. *Monand.* O. *Polyand.* Perennis; alpina.

OF. *Pimpinella italica rubra.* IT. *Solbastrella*,
Salvastrella. A. *Common burnet.*

QUAL. Odor subfragrans; sapor stypticus.

VIRT. Adstringens.

USUS.

PRIMULA VERIS. Radix; herba; corollæ.

VARIET. A. *Officinalis.*

CL. *Pentand.* O. *Monog.* Perennis; in pratis.

OF. *Flores paralyseos.* IT. *Fior di primavera*,
Paralisi. G. *Primevère.* GE. *Schlüsselblu-*
men. A. *Common cowslip.*

QUAL. *Plantæ recentis:* Odor fragrans. *Ra-*
dicis: Sapor amaricans.

VIRT. Nervina? Narcotica? *Radicis:* Errhina.

USUS.

PRUNELLA VULGARIS. Herba.

CL. *Didyn.* O. *Gymnosp.* Perennis; in pratis.

OF. *Consolida minor.* IT. *Prunella*, *Lauren-*
tina, *Sinfito minore.* A. *Common self-heal.*

QUAL.

VIRT. Subadstringens.

USUS.

PRUNUS AVIUM. Fructus; gummi.

CL. *Icosand. O. Monog.* Arborea.

OF. *Cerasorum nigrorum fructus.* IT. *Ciriegie salvatiche.* G. *Merisier.* A. *Small fruited cherry tree.*

QUAL *nuclei*: Sapor et odor laurocerasum æmulans. *Fructus*: Sapor acidus.

VIRT.

USUS.

PRÆP. Aqua; alcohol, vulgo kirschwasser. (*Italorum marascino*).

PRUNUS CERASUS. Fructus; nuclei; gummi.

CL. et O. præced. Arborea.

OF. *Cerasorum rubrorum fructus.* IT. *Ciriegie, Ciligie, Cerase.* Varietâ: *Visciola, Marchiane, Agriotte, Amarine, Grassioni, ec. ec. Gomma del Ciriegio.* G. *Cerisier CE. Kirschen-baum.* A. *Cultivated cherry tree.*

QUAL: *fructus*: Sapor acidulo-dulcis.

VIRT. Refrigerans.

USUS *nucleorum*: Ad aquam stillatitiam parandam. *Gummi*: Idem ac gummi *Mimosæ niloticæ.*

PRUNUS DOMESTICA. Fructus; pulpa.

CL. et O. præced. Arborea.

OF. *Pruna damascena s. gallica.* IT. *Prugne, Susine.* G. *Prunes de damas.* CE. *Pflaumen; zwetschigen.* A. *Common plum tree.*

QUAL. Sapor mucilaginoso-dulcis, acidulus.

VIRT. Eccoprotica.

USUS. Febres; obstipatio.

PRUNUS LAURO CERASUS.

Folia.

CL. et O. præced.

Hortensis; arborea.

OF. *Lauro-cerasus*. IT. *Lauro-ceraso*. G. *Laurier-cerise*. GE. *Kirsch-lorbeerbaum*. A. *Common laurel*. H. *Lauro real*.

QUAL. Venenata: In oleo volatili et principio narcotico residens; sapor amarus.

VIRT. Narcotica; antispasmodica; deobstruens.

USUS *aquæ*: Scirrhus; cancer? Obstructio hepatis? dysuria; Syphilis? Phthisis?

PRÆP. Aqua stillatitia. Dosi gutt. XXX-XL.

PRUNUS PADUS.

Cortex.

CL. et O. præced.

Arborea.

A. *Common bird-cherry tree*.

QUAL. corticis: Sapor amarus, substypticus.

VIRT.

USUS *decocti vel extracti*: Intermittentes; syphilis?

DOS. In decocto unc. j ad libram j *aquæ*, omni mane sumend.

PRUNUS SPINOSA.

Baccæ; flores; succus baccarum inspissatus.

CL. et O. præced.

Fruticosa.

OF: *Prunus sylvestris*; *acacia nostras* s. *germanica*; succus *acaciæ* inspissatus. IT. Sa-

sino salvatico, Prugnolo. G. Prunellier. GE. Schlehendorn. A. Sloe tree. H. Endrino.

QUAL. *Baccarum*: Sapor stypticus, acidulus.
Florum: Odor fragrans; sapor amaricans.

VIRT. *Baccarum*: Antiseptica; roborans; adstringens. *Florum*: Eccoprotica.

USUS *fructus*: Febres biliosæ, putridæ; diarrhœa.

PRÆP. Aqua *florum*; succus *baccarum* inspissatus.

PSYCHOTRIA EMETICA.

Radix.

CL. *Pentand. O. Monog-*

Perennis; Mexicana.

Nota. Incertum est, an ad idem genus pertineat radix *ipecacuanhæ fuscæ* ex Brasilia allata.

⊙F. *Ipecacuanha vulgaris s. vera s. cinerea s. grisea. IT. Ipecacuana. GE. Grane Brechwurzel. A. Ipecacuanha.*

QUAL. In principio resinoso residens: Odor nauseosus; sapor amaricans, leviter pungens.

VIRT. Emetica.

USUS. Asthma spasmodicum; spasmi; ad præveniendam febrem puerperalem mox initio gr. 154-153 omni quadrihorio (*Doulcet*) Menorrhagia; hæmoptysis; dysenteria; diarrhœa; pertussis.

DOS. *pulveris* gran j-iiij. scopo emetico: gran. xv-xx.

PRÆP. Pulvis sudorificus Doveri; vinum ipacacuanhæ; trochisci.

PTERIS AQUILINA.

Radix.

CL. Cryptog. O. Filic.

Perennis.

OF. Filix fœmina. IT. Felce femmina. A.

Common brake, or female fern.

QUAL.

VIRT. Anthelminthica: Quibusdam eadem æstimatur ac Polypod. filicis maris.

DOSIS pulveris: Drach. semis; mane et vespere cum melle.

PTEROCARPUS DRACO.

Resina.

CL. Diadelph. O. Decand. Arborea; Amer.

meridion. et Ind. orient.

N. B. Resina promiscue ex hac planta et ex dracæna dracone et calamo rotang desumitur.

OF. Sanguis draconis. IT. Sangue di Drago.

G. Sang. dragon.

QUAL. Rubra; inodora; styptica.

VIRT. Adstringens.

USUS. Profluvia; diarrhœa; hæmorrhagiæ.

PTEROCARPUS SANTALINUS.

Lignum.

CL. et O. precæl.

Arborea; Ind. orient.

OF. Santalum rubrum. IT. Santalo rosso. G.

Santale rouge.

QUAL. Saturate rubra; tinctoria.

VIRT.

USUS.

MEDICA.

209

PULMONARIA OFFICINALIS.

Herba.

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Perennis*; in *sylvis*.

OF. *Pulmonaria maculosa*. IT. *Polmonaria*.

A. *Common lungwort*.

QUAL. Sapor subsalsus, mucilaginosus, amaricans.

VIRT.

USUS.

PUNICA GRANATUM.

Floris petala; cortex fructus; semen.

CL. *Icosand.* O. *Monog.* *Arborea*; *Europ. austr.*

OF. *Flores balaustiorum*: *Cortex Granatorum* s. *psydii* s. *malicorii*. IT. *Melegranate*. *Fiori*, e *corteccie di Melograno*, o *Malicorio*. G. *Le grenadier*. A. *Common pomme granate tree*.

QUAL. *rubra*: Sapor stypticus.

VIRT. *Adstringens*; *diuretica*; *anthelminthica*.

USUS *decocti vel infusi aquosi seu rinosi florum aut corticis externus* forma *fotus*, *injectio*nis, *gargarismatis*: *Prolapsus*; *laxitas uvulae*; *blennorrhœa*. — *Internus*: *Diarrhœa*.

DOSIS *flor. vel corticis*: *Unc. j ad libram j aquæ vel vini rubri*.

PYROLA ROTUNDIFOLIA.

Herba.

CL. *Decand.* O. *Monog.*

Perennis.

OF. *Pyrola*. IT. *Pirola*. A. *Round leaved winter green*.

QUAL. Sapor stypticus, amaricans.

VIRT. Adstringens.

USUS.

PYRUS COMMUNIS.

Fructus.

CL. *Icosand.* O. *Pentag.*

Arborea.

OF. *Pyrus.* IT. *Pera.* G. *Poire.* GE. *Birnen.*

A. *Common pear tree.* H. *Peral commun.*

QUAL. Sapor dulcis, substypticus.

VIRT. Nutriens.

USUS.

PYRUS CYDONIA. Fructus recens; semen;
cortex.

CL. et O. præced.

Arborea.

OF. *Cydonia.* IT. *Mele-cotogne.* Semi e cor-
teccia del cotogno. G. *Coins.* GE. *Quitten.*

A. *Common quince tree.* H. *Pecal membril-
lero.*

QUAL. fructus: Odor gratus; sapor acido-sty-
pticus: *Seminis:* Mucilaginosi.

VIRT. Adstringens; refrigerans. *Semin.* invol-
vens. *Cort.* menagoga?

USUS.

PRÆP. Rob ex succo expresso cum saccharo
inspissatus; mucilago seminum.

PYRUS MALUS.

Fructus.

CL. et O. præced.

Arborea.

OF. *Poma borstorflensia.* IT. *Mele dolci,* *Mele*
appie, *Appiuole,* ec. G. *Pomme.* GE. *Apfel.*

A. *Common apple tree.* H. *Peral menzeno*

QUAL. Sapor acido-dulcis.

VIRT. Eccoprotica; refrigerans.

USUS *forma cataplasmatidis*: Ophthalmia; ulcera putrida. *Decocti*: Febres.

N. B. Succus ex pomis communibus, immaturis, (*Anglis crabs dictis*) expressus, in Anglia sub nomine *verjus* venditur.

Q.

QUASSIA AMARA.

Lignum.

CL. *Decand.* O. *Monog.*

Arborea; *Cayen.*

Surinam.

OF. *Quassia*. IT. *Quassia*, *legno Quassio*. G.

Quassia. GE. *Quassienholz*. A. *Quassy*. H.

Quasia amarga.

QUAL. Eximia: Inodora; sapor intense et pure amarus.

VIRT. Stomachica; antacida; antiseptica.

USUS decocti (melius infusi) trititando cum aqua vel vino: Dyspepsia; intermittentes; arthritis; leucorrhœa.

DOS. Drach. ij. unc. semis infus. in libra j. aquæ vel vini, cochleatim sumend. - Pulv. gr. x.

PRÆP. Extractum.

QUASSIA SIMARUBA.

Cortex.

CL. et O. *præced.*

Arborea; *Ind. occident.*

OF. *Simaruba*. IT. *Simaruba*. G. *Simarouba*.

GE. *Ruhrrinde*. A. *Winged leaved quassia*.

N. B. Quidam corticem simarubæ ex *Bursera gummifera* derivant. Alii ex *quassia dioica* derivant.

QUAL. Inodora; sapor pure amarus.

VIRT. Stomachica; subadstringens; diuretica.

USUS. Dyspepsia; diarrhœa; dysenteria atonica; intermittentes.

DOSES pulveris: Drach. semis.-j. *Decocti* drach. ij-unc. semis ad libram jß aquæ, ad colat. libra j.—Unc. semis-j sumenda omni bihorio vel trihorio.

QUERCUS CERRIS. Excrescentiæ a punctura insecti (*cynips quercus* dicti) ejusque nidum constituentes, vulgo Gallæ.

CL. *Monæc.* O. *Polyand.*

OF. Gallæ turcicæ: *IT.* Galle d'Istria, e di Turchia. *G.* Noix de Galles. *GE.* Gallaepfel. *A.* Galls: Turkey oak-tree.

QUAL. Præstans: Styptica.

VIRT. Roborans; adstringens.

USUS pulveris, decocti, unguenti: Varix ani; prolapsus; blennorrhœa.

QUERCUS ROBUR. Fructus seu glandes cortex; folia; cupola glandis;

CL. et O. præced. *Arborea.*

OF. *Quercus.* *IT.* Ghiande; corteccia, e foglie di Quercia, o di Rovere. *G.* Chêne ordinaire. *GE.* Eiche. *A.* Common oak tree.

QUAL. Sapor stypticus.

VIRT. Roborans; adstringens; obstipans.

USUS decocti glandium assatarum: Tabes mesenterica infantum? Morbi cutis? — *Externus foliorum, corticis et cupolæ glandis decoct. in vino rubro vel aqua* forma fots, injectionis, gargarismatis: Prolapsus vaginæ, recti; relaxatio uvulæ; cynanche atonica; hæmorrhœæ, leucorrhœa, blennorrhœa. *Internus* in pulvere, infuso vinoso, vel decocto aquoso, præcipue cum amaris: intermittentes; blennorrhœa; diarrhœa.

DOSIS: Unc. j ad libram j vini rubri vel aquæ, cochleatim sumend. — *Pulveris cupolæ glandis:* Drach. semis.

PRÆP. Unguentum ex unc. vij axungiæ porcine cum drachm j pulveris gallarum. — Tinctora et infusum aquosum præcipue pro examine aquarum mineralium; acidum gallicum.

QUERCUS SUBER.

Cortex.

CL. et O. præced. Annua; Europ. austr.

OF. Cortex suberis. IT. Sovero. G. Liège. A.

Cork-barked oak, or cork-tree.

QUAL. Styptica.

VIRT. Adstringens.

USUS corticis combusti mixti cum oleo fixo:
Hæmorrhoids.

stanza. Ogni vegetabile, per esempio, è esaminato sotto i seguenti titoli 1. Nome sistematico. 2. Parte della pianta usata in Medicina. 3. Classe ed ordine Linneano, 4. Durata e luogo nativo della pianta. 5. Nomi, Farmaceutico, Italiano (nella presente edizione aggiunto), Francese, Tedesco, Inglese, e Spagnuolo. 6. Qualità fisiche, principio attivo e parte della pianta nella quale risiede. 7. Virtù medica. 8. Uso esterno ed interno, e maniera di servirsene. 9. Dose. 10. Preparazioni.

Li nomi ch'egli adopera per significare le diverse maniere d'agire de' medicamenti sono pochi; essi esprimono chiaramente le virtù ch'egli loro attribuisce. Queste però non sono dipendenze necessarie di spesso inetti sistemi, ma derivate dalla considerazione delle più avverate cognizioni Fisiologiche e Patologiche, non che dell'esatte notizie chimiche, appoggiate alla costante e ben interpretata esperienza.

Chiude l'opera un Elenco de' medicamenti secondo il sistema di Zoonomia di Darwin. E' questo un supplemento interessante, giacchè soddisfa in parte alla curiosità colla quale si aspetta particolarmente in Italia questo sistema originale.

Interessa quest'opera ogni ceto di persone che coltiva le scienze naturali. Il medico dotto la trova non che utile per l'esercizio dell'arte, vantaggiosa poi, perchè gli agevola moltissimo la lettura delle produzioni in tutte le lingue colte. Lo studente, il farmacauta hanno in essa un'opera elementare, che loro facilita di molto l'istruzione, e li dispensa dall'acquisto di molti altri libri necessarij. L'amatore delle diverse parti dell'istoria naturale la rinviene comodissima e ben sufficiente a dargli delle idee nette di questa parte di Medicina, che pur tutti dovrebbero un poco conoscere.

Si vende in Milano al prezzo di lire sei nella Libreria *Nobile e Tosi in contrada nuova*, e presso *Pietro Agnelli* ed altri libraj.